

Acalypha

Mexicana

1. virginica A. involucri foemineis cordatis incis, foliis ovato-lanceolatis petiolo longioribus.
2. rugata A. species foemineis involucri cordatis serratis: masculis distinctis aphyllis; foliis lanceolato-ovatis
3. pauciflora A. foliis lanceolato-oblongis serratis, involucri foemineis cordatis subdentatis
4. indica A. involucri foemineis cordatis subserratis, foliis ovatis petiolo brevioribus.
5. hirta A. involucri foemineis cordatis dentatis, foliis ovatis obtusis petiolum aequantibus pilosis, caule fruticoso.
6. australis A. involucri foemineis integerrimis, foliis lanceolatis obtusis
7. ciliata A. involucri foemineis ^{unifloris} uniceolatis ciliatis, species brevifloris, foliis ovatis serratis acuminatis, ^{pilosis} petiolum aequantibus petioli ~~in~~ ⁱⁿ ~~malis~~ ^{malis} ~~que~~ ^{que} ~~hatis~~
8. utricifolia A. foliis ovatis serratis glaberrimis, petioli tomentosis
9. betulina A. fruticosa, involucri foemineis cordatis crenatis, foliis ovatis acutis serratis.

10. villosa A. involucri foemineis, minimis dentatis villosis firmis, spicis elongatis
foliis ovatis acuminatis serratis petiolo longioribus
11. tenuiflora A. foliis ellipticis acuminatis serratis glabris, spicis capillanibus
ramosis
12. Hernandezifolia A. spicis foemineis longissimis, involucri cordatis serratis, masculi
distinctis aphyllis, foliis subcordatis serratis, petiolo longis firmis
13. ^{longata} ~~coarctata~~ A. spicis foemineis involucri
13. Decumbens A. involucri foemineis cordatis incisus latis, foliis ovatis crenatis, petiolo
longioribus cauleque decumbente pilosis
14. reptans A. spicis terminalibus erectis, floribus mixtis foemineis inferioribus, involucri
cordatis serratis, masculis aphyllis, foliis ovatis serratis caule repente
15. longata A. spicis foemineis involucri multipartitis, spicis masculis laxis aphyllis
foliis cuneato-ovatis acuminatis serratis glaberrimis
16. elliptica A. spicis foemineis, involucri germinibus brevioribus ovatis dentatis
hirsutis, masculis aphyllis laxis, foliis ellipticis acuminatis dentatis
17. corensis A. floribus foemineis terminalibus distinctis, involucri triphyllis, spicis
masculis axillaribus involucriatis, foliis ovatis serratis
18. tomentosa A. spicis foemineis terminalibus solitariis, involucri multipartitis, masculis
erectis, foliis ovato-lanceolatis serratis scabris subtus villosis tomentosis

pauciflor *Acalypha* foliis lanceolatis oblongis ^{ternatis} glabris, involucri foemineo cordatis
subdentatis.

Habitat *Acalypha* virgata Humb. fl. jap.

Habitat in India orientali Japonia, China

Caulis herbaceus erectus basi ramosus: rami ascendentes angulati subrotundi
Cosi folia petiolata pollicaria, glabra excepta costa subtus
et vena velis raris adpressis ~~et~~ panem attenuata. Spica
axillaris foliis brevior foemineis ^{2:3} inflores masculi terminalis filiformis
mes

forte australis Lin

fimbriata Acalypha ⁶ foliis ⁷ pedicatis ⁷ ovatis ⁸ glabris ⁹ serratis ¹⁰ petiolo ¹¹ brevioribus
floribus ⁴ spicatis ^{is} ⁵ confertis, involucri ¹ setae ² multidentatis ³

Habitat in Guinea Pert

Caulis herbaceus, angulatus, angulis villosis. Folia pollicari vel paucis
ultra, valde attenuata, acumine integerrimo, anguste equaliternque
serrata, venosa. petioli folio duplo longiores. Spica solitaria, in
ferne geminata, sessilis subhirsuta, vix pollicares, crassitie fere
digiti minoris. Flores confertissimi. Involucrum subreniforme,
marginem multifido: laciniis angustissimis.

corensis Clealypsa floribus femineis terminalibus involucri triphyllis, pappi masculi
lis axillaribus involucri, foliis ovatis serratis Sw. prodr. pag. 99
Clealypsa corensis involucri femineis triphyllis, foliis lanceolatis Farqu
Amer. pag. 254. Tab. 161.

Habitat in Martinique An v. Rohr in Montserrat An Ryau.

Rami teretes, glabri.

Folia subsessilia, bipollicaria, elliptica, basi apiceque acuta, ^{interdum obtusa} ^{sui sequenti} utrinque serrata, utrinque glabra.

Pappi masculo axillari, saepe 2. 3. interdum solitarii, sesquipollicares
erecta. Rachis flexuosa. Flores distantes. Involucrium tripartitum.

Capitula sessilis in apice vel in bifurcatura ramorum, magnitudine pipi

almifolia Allypha foliis oblongo-lanceolatis basi subcordatis serratis glabris scabriusculis,
pilis foemineis axillaribus, involucrio dentatis.

Habitat in America meridionali ad v. Rohr &
Rami teretes, glabri: ramuli angulati, patentes.

Folia petiolata, alterna, quadri pollicaria, oblongo-lanceolata, basi obtusa,
pinnae submarginato subcordata, acuminata, serrata, basi integerrima, venosa
scabriuscula, supra glabra, subtus pilis raris in costa densis.

Petioluli angulares, villosiusculi. Stipula subulata, petiolo dimidio brevior

^{res.}
Spicae foemineae axillares, sesqui pollicares, flexuosae. Flores parvi, distan-
tes. Involucra concava, dentata.

Germinum vicinarum

(An didica vel monica? mares non vidi)

corchorifolia. Acalypha spici imbricatis verticibus, foemineis distinctis terminalibus
involucris subrotundis, foliis lanceolatis serratis villosis
Habitat in insula St. Crucis An. v. Roth
Facies Betulae Rami vertices, glabri, cortice cineriscente: ramuli alter
ni, remoti, breves, foliosi et floriferi, villosi, canescentes.
Folia petiolata, alterna, pollicaria, lanceolata, basi subrotunda subovata,
apice acuta, serrata: serraturis obtusiusculis, supra vinctis, oculo ar
mato villosiuscula, subtus molliter villosa, nervi canescentes.
Petioles canescentes. Stipula petiolaris, glabra.
Spica masculo axillares, solitaria, breviter pedunculata, undique flori
bus minutis tecta, sesquipedales vertices, sesquipollicares, compressis fili
empositis, obtusa. Foemineae terminalis ramulorum, unguicula
res, circiter 10-11 floris: flores approximati parvi. Involucrum
germine longior subrotundum, concavum, dentibus quatuor incisum
subfistulatum, oculo armato villosum
Germe minutum, cinereum. Stylus involucro longior, purpureus

Cameria

Acalypha ^{sp. n.} *flores* foemineis in dichotomia sep. plibus involuvis
masculis spicatis, foliis oblongis serratis
Habitat in Martinica.

ulmi folia *Acalypha*

Habitat in Cantibus H. Thomae vel Puerto Nuevo herb. 4us.

herbacus. Rami teretes, villosi, incani. Folia petiolata, alterna, 4-5 pollicaria,
distantia, ovata, basi inaequali, sub cordata, attenuata, sub quinque nervia, venosa.
pendula, costa et nervi incani, supra scabru scula, aequaliter serrata. Stipulae
subulatae. Petioli teretes, incani, folio breviores. Spica masculina axillari, solita
no, bipollicares, tener. Flores minutissimi, congesti. Semina non vidi.

Cyrtandra *Allypha* foliis lanceolato-oblongis subserratis glabris.

Habitat in Madagascar herb. Commerf. herb. Mus.

Rami raminei, teretes, glabri. Folia petiolata, sparsa, pollicaria vel ultra,
extremum serraturae non nulla, obscura, remotissima, venosa, utraque
acuta. ^{triplopleurae} piceo filiformes, solitariae, sespites, axillares. Flos foemineus
ad basin piceo; involucrium reniforme, paucidentatum.

arborescens Acalypha involucri foeminei veni formibus integerrimis, foliis ovatis
crenatis obtusis

Habitat in insula francica *Pommerf. Herb. Gusf. 3*

Caulis fruticosus, erectus, ramosus, ^{Rami} glaber, ^{veretis} Rami ^{uli} parvi, superne ovulo
armato leviter villosi. Folia in ramulis, petiolata, sparsa, pollicaria
vel sesquipollicaria, venosa, glabra, subtus pallidiora. Petiolus folio
triplo brevior. Flores masculi in specie pedunculatis, axillaribus, tripol-
licaribus, per intervalla pedum glomerati: foeminei solitarii in axillis
distincti, pedunculis capillaribus, semipollicaribus. Involucrium femi-
nucum alare, glabrum, interdum ³ ^{spale} ⁶ basin specis masculae.

B² foliis villosis.

V. glaber crene foliorum ^{extrosum} juvenis majoribus foliis basi attenuatis integerrimis

acuminata Acalypha foliis ovatis lanceolatisq; oblongis attenuatis remote
serratis, involucri foemineis reniformibus dentatis.

Habitat in Madagascaria *Cochinina*. herb. Fus.

Caulis suffruticosus. Rami teretes, glabri: ramuli herbacei, angulati, striati.
Folia petiolata, bis 3 pollicaria, tenera, utrinque glabra, tenuissima ve
nosa basi versus sensim attenuata, integerrima, ~~extrema~~ ^{remote} ~~extrema~~ ^{remote} attenuata,
serrata, acumine obtuso vel acutiusculo. Stipulae petiolae. Petioli semi
pollicares. Pedunculi axillares, 3-6 pollicares. Flores foeminei inferae,
2-3. raro quinque, remoti. Involucrum unguiculare vel semipolli
care, glabrum, inaequaliter remote dentatum vel subintegerrimum.
Flores masculi minuti, remoti. Capsula mucronata, magnitudine fere
Piperis.

conhori folia *Acalypha* foliis oblongis crenatis petiolo longioribus subtus pilosiuscu-
lis, involucriis remiformibus dentatis

Habitat ad Pondulheny herb. Guoj.

Caulis herbaceus, striatus, teres, superne canescens. Folia semipolliconia, ala-
ta, subrenata, subtus oculo armato punctis numerosis elevatis pilis raris
adpressa. Stipulae setaceae, deciduae. Pedunculi axillares, solitarii, folio lon-
giores. Flores feminei inferne, saepe 12. alterni, involucria persistentia, parva,
villosa, aequaliter dentata: masculi superne in amento unguiculari, incani
minuti.

Prope fructum Forsk. vel repentem Sw: collocatur.

Hippodula Calypha foliis ovatis acutis serratis, spicis foemineis unibracteis cylindricis, caule herb.

Habitat in insula Francis Commerson herb. Musc.

Caulis herbaceus, simplex, erectus, striatus, teres, superne angulatus. Folia petiolata, pollicaria, ovato-subrhombica, basi integerrima, sursum obtusiuscule serrata, subtus pilis raris adpressis. Stipulae setaeae. Pediculi foliorum breviores. Spicis axillares, solitariae. Amenta breviter pedunculata infusa, unguicularia, plenumque e floribus pluribus foemineis confecta unibracteis composita, raro flos unus foemineus ad basin amenti masculi. Amenta masculinum a foemineo non distinctum, fere filiforme, breve, glabrum. Involucra reniformia, parva, dentato-subincisa. Styli longi. Capsula superne pilis raris fimbriata.

Affeni Cal. septanti. ✓
B. e Gava amentis villosis parum majoribus.

*Frui-flora Acalypha foliis elliptico-lanceolatis, remote dentatis, fultis, petiolis
sculis, amentis incanis*

Acalypha frui-flora Burm. ind. Tab. 61. fig. 2. ?

Habitat in India herb. Guss. 4

Text. Rami crassitie penna anserina, bicaricati, apice incani. Folia
3-4 pollicaria, petiolata, subtus tenuiter venosa, juniora subtus villosa, sta
ta nudiuscula. Petiolus vix pollicari. Spica axillares, solitane, 3-4
pollicares, geminibus florum distantibus, canescentes.

rotundifolia *Cicelypha* foliis ovato subrotundis petiolo longioribus crenatis glabris
fuculis, involucriis reniformibus trifidis

Habitat in Penn herb. Fusf.

Caulis herbari cui, adscendens, inferne teres, glaber, superne angulatus villosus, ca-
nescens, ramosus. Folia pollicaria basi versus integerrima, subtus in costa
pilis nonnullis raris. Petioli canescentes, petiolo plerumque duplo brevis-
simo, raro subaequantes. Spicae foeminae axillares, solitariae, raro geminae.
primae sessiles dein pedunculatae, pollicares. Flores conferti. Involucria
trifida: lacinae oblongae, obtusae, nervosae.

Flores masculi non vidi, an divisi?

si monaco prope indicium collocatus.

Cicalypha

Habitat in Cap. b. prae herb. Royenii

Flor. foemineae axillares, solitarii, dentati; a fructu in mapulis distinctis

glabrata *Alcalypha* foliis lanceolatis subincisi formibus integerrimis obtusis lobatis
rigatis.

Habitat in Madagascaria Commerf. herb. Insul. 3.

an Guaiac? Ramis teretes, glabris - folia petiolata, 6-7 pollicaria, subarenaria,
basin versus per se attenuata, emarginata, subtus parum pallidiora. Petioli
lanceolatis. Stipulae minutae oratae. Spicae axillares geminae, pedun-
culatae, cylindricae, bipollicares, erectae. Bractea perspicuae, minutae. Flo-
res approximati: foliacei racemosi parum dispersi. Pedunculis tripartitis
pollicari. Stylis bifidis.

Carpini-folia Acalypha foliis lanceolato-oblongis profunde serratis glabris nervosis

Habitat in Domingo herb. Guj. 5

Frutex. Rami glabri, proxi, angulati. Folia petiolata, pollicaria, venosa, nervi obliqui exstantes, basi obtusa, acuminata, acuta. Stipulae setaceae. Petiolus via semiunguicularis. Amenta masculula pedunculata, bipollicaria, venosa

Sesilis *Acalypha* foliis lanceolatis crenatis, involucri reniformibus dentatis

his

Habitat herb. Guaf.

Frutic. Rami sparsi, teretes, villosi. Stipula petiolata, pollicaria vel panum
ultra, extorsum obsolete crenata, acuta vel obtusiuscula, obscure venosa,
subtus in costa et nervis majoribus pilis aliquot adspersa. Petiolus foliorum
guicularis. Spica axillares, petiolo panum longiores. Flos unicus foemineus
sesilis ad basin fructus masculi: masculi panum supra foemineo, conferti

Siabra Acalypha foliis lanceolato-oblongis subuncatis extorsum subferratis
fiabris, racemis foliis brevi orbis

Habitat in Anpula Borbonica Comerson her. b. Fus. 7

Rami teretes, glabri. Folio frequentia, sparsa, petiolata, 3-4 pollicaria, sub
arenia, basi obtusissima et sinu parum attenuata, extorsum caespitan
tia, apice obtusa vel acuta in sicula, subtus laniosa, in ferne versus integerr
nima, sursum obsolete ferrata. Petiolus unguicularis. Flori subpneati
vel breviter pedicellati, per intervalla glomerati. Spica interdum 3. ex
axilla singula superne, petolo parum longiore. an Diocia?

Dentata *Acalypha* folio lanceolato-oblongi dentato-serrati glabri, floribus
remoti racemosi

Habitat in insula Bobonuo insulis Borio casant Dentale' dicta Com meson herb

Guss. 5

Indext. Rami alterni, glabri, teretes. Folia petiolata, 2-3 pollicaria, utrinque gla-
bra, obscure venosa, basi obtusa, acuta, inaequaliter dentato-serrata, pallide
viridia, sicatru' sicula. Petiolus unguicularis. Pedunculi axillares, solita-
rii, glabri, folio longiores, filiformes. Flores pedicellati, sparsi, interdum
2-3. aggregati. Calyx 3fidus: laciniis ovatis. Stamina copiosa, calyce non
longiora. Flores foeminei non vidi
an huius generis.

Si flores pedicellati in Burm. *acalypha* speciosa, huc potius Yun pertinet
Synonym: ex horto malab. ad speciosam allatum minime illuc spectat

betulifolia A floribus foemineis axillaribus sessilibus, involucri corda-
tis crenatis, masculis spicatis, foliis subrotundis crenatis glabris su-
perioribus. pag 100.

Habitatio Jamaicae

Rami teretes glabri ramuli alterni. Folia petiolata unguiculata, venosa
foemineis pedunculatis amentum masculinum in axilla distincta
brevifolia brevior

Tomentosa A. species foemineis Terminalibus solitariis, involucri multipar
viti, masculis erectis, foliis ovato-lanceolatis serratis scabris subtus
velloso tomentosis in prodr. pag. 99.
Habitat in H. Spaniola 5.

~~novae~~

inter Americanas descriptas sub nomine Acal. cortusifolia

multifida Ai.

Habitat in monte vides dadi Thouin
Planta vix palmaris ramosa

1000 fl. 1000

4 rej Ed a Japonana inermis foliis pennatis: foliolis ovato-oblongis; rachis simplicis
fructibus glabris Hort. Kew. 2. p. 36.

Nucifera arbor americana, fructu Japonensis orbiculato monocotyledoneo

3 rachis glabra
1. foliolis ellipticis
Nucifera
negro Pluk. alm. 259. t. 217. fig. 7.

Sapindus rigida Mill. Dict.

Habitat in India occidentali

Rami glabri cortice cinereo.

Folia alterna, petiolo ^{4 quoniam} ~~ultima~~ ^{pub} ~~duo~~ ~~oppo~~ ~~posito~~ ~~religiosa~~ ~~alterna~~, ~~albenua~~
petiolo breviter petiolata, ~~ultima~~ ^{pub} ~~duo~~ ~~oppo~~ ~~posito~~, ~~religiosa~~ ~~alterna~~, ~~albenua~~
integerrima, albescens latere angustior, nigra venosa, subtus pubescenti
bi-³ tripollicaria. Rachis ~~ternata~~ pubescenti. Pinnulae ~~ternatae~~
pedalis patens pedunculis pedicellisque tomentosis. Ternatus
nitidus ~~ternatus~~

virginica a involucri foemineo cordatis in ipsi folio ovato lanceolatis, &
trilo longioribus Lin. flor. Zeyl. 342. * L.V.
Mercurialis virginica hermaphroditica Pluk. phyt. 99. fig. 4. Herm.
Lugd. 686. t. 687.

Habitat in Zeylon, Virginia O

Caulis ascendens striatus angulatus, superne pubescens. Folia
petiolata ~~oblonga~~ ovato lanceolata, trinervia, petio
transversis adpressa, grossa ^{opposita} ~~strata~~ obtusa bipollicaria
petiolo longiora. Spica axillares longitudinae
petioli flores 2-3 foemineo inferne mascula
terminati transversa

planta herb. Royenii longe diversa a reliquis quae sub hoc nomine
vidi. Caulis sine pilis. Folia subhombes oblique oblonga, polli
caria obtuse pinnata, venosa glabra, basi acuta in virginiam
Petioli folio longiora capitula 2 axillares simplicia unguiculata, oblon
ga pilosa. Flores confluentissimi

Dod. et Pichard

provisi noni figura non huius pertinet

non videtur quae in Lin. fl. Zeyl. describitur: diversa forte est ab virginica allata
relata dubia

illa e

virgata a specie foemineis involucri cordatis serratis: masculis distinctis
aphyllis, foliis lanceolato-ovatis Lin. Am. Acad. 5. p. 410
~~Calypha humilior, foliis cordatis crenatis specie masculis alaribus et hermi-
nalibus Brown. jam. 346. t. 36. fig. 1.~~

Habitat in Jamaica

Caulis erectus paucis ramosus. Folia breviter petiolata, lato-lanceolata
acuminata, obtuse serrata. Specie axillari solitaria: masculi filii
formis aphyllis. Femineo distincto secundum totam longitudinem. Bra-
ctea alterna, cordatis, inciso-serratis. a virginea differt caule altis-
simo, specie foemineis in se. Specie foeminea a masculis distincto
habet her: ut figura Browni quo est. Tab. 36. fig. 1. in eadem
specie gerunt.

australis A. ^{Lin. 1. 1. 1.} involucris foemineis integerrimis, foliis lanceolatis obtusis
Habitat in China fide herbarii ipsushinnoi

indica a

involucris foemineis cordatis subrenatis, foliis ovatis petiolo
brevioribus Len. Fl. reyl. 347 *

Cupamoni Rheed malab. 10. p. 167. Tab. 81.

Mertensialis Reylanica Tricoccos Cam acetabulis Herm. Lugd. b. 686.

Tab. 607.

Habitat in India O

Paulis exsertis pedalis, angulatis. Folia alterna longe petiolata
ovato subhombroidea, serrata, acuminate, basi integerrima, utraque
acuta, pollicaria. Petiolus folio duplo longior. Spica axilla
res longitudine petioli laxe foemineis inferioribus, remoti alterni supra
ei terminales femiunguiculares minutis conferti. Involucris
foemineis cordata serrata glabra

glabra. Spica folio brevior herb Herm.

Jacquini indica et Wallia Cupamoni ^{Rheed} diversa Len.

herba. *Alcalypha involucri foemineis cordatis dentatis foliis ovatis petiolum equantibus*
pilosus, caule suffruticoso herba ^{obtusis}

Habitat in India Orientali Konij

Caulis basi fruticosus ^{secco} ramosus, rami alterni patentes simplicis pini striati
pulis mollibus herba, ramulopi

Folia petiolata remota, pollicaria, obtusa serrata utraque pilosa

Petioles filiformes longitudine foliorum ^{obtusis}

Spica axillaris solitaria pedunculata teretes longitudine foliorum ^{pollicaria}

Floris foeminei inferne conferti. Inapuli ~~terminales~~ involucri cordati mi
parvi longitudine florum denticulatum pilosum.

Inapuli terminales in spica bilocari filiformi

Perispermata femine Inapuli parum major hispida

variat foliis rotundis vel magis ovatis vel obtusis
ad Ac: indica differt caule foliis involucrique nudo involucri Inapulo
majoribus

3-4 ciliata Alcalypha involucris foemineis unicoloris ciliatis, fructis brevissimis, foliis
ovatis acuminatis petiolum squarantibus Tab. 77
Alcalypha ciliata, involucris foemineis ciliis filiformibus connatis.
Boiss. descr. pag. 162.

Habitat in Arabia et India Orientali.

Caulis herbaceus, inferne ramosus. Rami simplices inferne glabri vespi
summitatem pilosi; ramuli in axillis folio breviores, pubescenti
Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, obtuse serrata, sesquipollicia
na, utraque pilosa, subtus pallidiora.

Petioli plani, striati longitudine folii.

Stipula utraque minuta, setacea: ternata, gemina

Fructus axillares, sessiles, inferne ^{gemina} ~~gemina~~ ~~ternata~~, superne solitarii,
amentibus masculinis terminata

Flores foeminei imbricati 8-10. Involucra unicolora, striata, glabra
multifida: laciniis setaceis, numerosis, inaequalibus.

Stylus multifidus

cordifolia Cl. foliis ovatis serratis glabris, petiolis subtomentosis

Habitat in India orientali hinc

Talis A. ulnato diversa petiolis, caule superne fere canescente subtoman-
toso, foliis glabris nec pilosis vel petiolis ramulisque hirsutis.

Caulis herbaceus foliis bipinnatis

decidua A. involucri foeminei cucullati fenatis deciduis foliis
lanceolato-ovatis petiolo sesquialongioribus Forst. descr. pug.
161.

mibi haud satis nota

fricata A involucri foeminei caucullati fenati, folis lancicollatis. Forst. M.
940. pag. 161.

multi laudate

3-4. Betulina Acalypha fruticosa, involucri foemineis cordatis crenatis, foliis ovatis acutis serratis
Pet: 2. off: Bot: pag. 141: 5^{ta} pag. 30. ubi desicr.

Acalypha fruticosa Dorffn. desicr. pag. 161.

Habitat in India Orientali et Arabia

Caulis fruticosus ramis raris alternis simplicibus superne
villosis inanis. Colea petiolata pollicaria vel parum ultra glabra
acuminata serrata. Petiolus folio brevior inanis. Spica ^{unguiculata} axilla-
ris pedunculata pedunculo petiolo brevior, uti spica inanis tonentis
foemineis inferius 2. 3 in eodem spica ac mapuli qui superne

prostrata coccinea caule prostrato, foliis subangulatis subpetiolatis Linn. Sp. 778.
micretium totale. Forst. Dep. pag. 152.
Caulis deproxi

alvifolia Acalypha foliis subrotundis serratis subtus pilosiusculis spicis
mapulis axillaribus, floribus foemineis terminalibus sessilibus
Habitat in India orientali Rottler 5

axillari O racemis axillaribus, foliis diffusis ovatis aduminatis nitidis petioli
brevissimis, stipulis mucronatis, caule fruticeo Sw. prodr. pag. 95.
Habitat in Jamaica

non vidi

villosa a involucri foemineis minutis dentatis villosissimis, plicis elongatis
foliis ovatis acuminatis serratis petiolo longioribus Lin. Suppl. p. 422.
P. V. pag. 863.

Acalypha villosa Jacq. Am. p. 284. Hort. Vind. v. 3. p. 26. 7. 97

Habitat in Carthagensi sylvis

Spica elongata, filiformis, apparet quasi e bractea. Lin.

Stipes erectus debilis, ramis teretibus junioribus glabris lignosis, juniores
villosi. folia subtus pubescentia 3-4 pollicari. flores masculi axilla
res cylindricae densae, aucto 80 quae pollicari. foeminei axillares, latiusci
ni in ramulis a mare diversis tamen in eadem planta. Jacq.

tenuiflora A. foliis ellipticis acuminatis serratis glabris, fructu capitulo
ribus ramosis

Habitat in India occidentali &

Rami teretes glabri. Folia petiolata, palmaria nervosa venosa
utrinque glabra, obtuse ~~sinuata~~ profundeque serrata in acumen
longum integerrimum protracta basi emarginata. Petiolus
folio dimidio brevior. Spica axillari folio brevioribus ~~inferioribus~~
compositi tenuis pini

Si non fallor inter Jacquinii habetur

an hujus generis an ^{an ~~alio~~} *Traya* forte species

Hernandi folia a spicis foemineis longissimis, involucri cordatis serratis,
masculis distinctis aphyllis; foliis ^{sub}cordatis serratis, petiolis longis
simis Sw. prodr. pag. 99.

Habitat in Jamaica

Folia palmata et ultra attenuata, lata nervo-venosa nervis
costalis uti petiolus vellos subtomentosus. Petiolus striatus. Spica
longa. Rachis angulatus pubescens. Involucrum unguiculana attenu-
ta nervosa, serratis subulatis

caroliniana A. fructus femineis involucrio villosis subcordatis crenatis:
fructus masculi basi involucrio inflexo, foliis ovatis serratis Walt fl
Carol. pag. 230.
Habitat in Carolina West Richard

Hand

decumbens Alalypha involucri formineis cordato incisivatis, foliis ovatis crenatis ^{pubescentibus}
caule decumbente petiolis longioribus cauleque decumbente pilosis

Ex Capsula pt. Onis misit Dr. Pflug

Caulis basi gynophorus ramosus. Rami teretes simplicissimi pilosi prope stemm

superne unguiculatis, vel rarius longiora
folia petiolata, ovata obtusa crenata, utraque vel pilosa

Petiolus folio triplo brevior

Spica ex aliis ~~foliis~~ superiorum supremis solitarii longitudine
foliorum.

Floris formineis inferne in 5-6 alterni involucri obcordatis dentata
fo. incisivi hirsuti masculi terminaliter in apice spicae cylindrici longitudi
ne dimidio spici

Capsula hirta.

ab Alalypha reptante Sw. forte non diversa

reptans a fructibus terminalibus erectis, floribus mixtis foemineis inferioribus, involvens cordatis serratis, masculis aphyllis, foliis ovatis serratis
caule repente Sw. prodr: pag. 99

Urtica minor ceras fricata Sloan bot. 1. p. 125. Tab. 82. fig. 3.
Habitat in Jamaica, Hispaniola

hinc valde affinis Plum. c. 172. fig. 2. herb. Guss.

forte eadem cum decumbente

levigata A. Spicis foemineis involucribus multipartitis, spicis masculis laxis
aphyllis, foliis cuneato-oratis acuminatis serrulatis glaberrimis
Sw. prodr. pag. 99.
Habitat in Jamaica &

non vidi

elliptica A specis foemineis involucri germinibus brevioribus ovatis dentatis
hispidis; masculis aphyllis laxis; foliis ellipticis acuminatis dentatis
In prodr. pag. 99.
Habitat in Jamaica;

non vidi

Corenfis A. floribus foemineis terminalibus distinctis, involucri tri-
phyllis, specie masculis axillaribus involucriatis, foliis ovatis
femineis Sw. prodr. pag. 99.

Acalypha corensis Jacq. Amer. 254. t. 161.

Habitat in Cordia occidentali;

~~non~~

de Desfer. inter ameri-

angustifolia A. floribus foemineis subsessilibus terminalibus, involucri
seriatis, masculis fructatis, foliis linearibus serratis Sw. prod.

p. 99

Habitat in Hispaniola,

alopeuroidea Alalyppha

alalyppha alopeuroidea Jacq. coll. 3. pag. 196
Habitat in America meridionali. ☉

Caulis sesquipedalis, ramosus, hirsutus, superne obsoletus
angulatus. Rami ascendentes. Folia alterna, petiolata, cordato-
ovata, acuta, serrata, rugosa, utraque hirsuta, bipollicari petiol.
bipollicari. Spica mascula ^{laxior} ~~valde~~ mascula valde gracilis, ut polli-
cari solitana frequenter ~~foliorum~~ ^{laxior} ~~minuta~~ ^{laxior} ~~spica~~. Gemmae termina-
les solitanae, cylindricae, bipollicares, crassitie digiti, apice saepe
terminatae corpusculo obovato hirsuto et horizontali 1. 2. 3. flore-
numerosi minuti involucri fetoso bipartito lacinae ovatis setis
longe serratis. Cal. 4 tetraphyllus foliolis ovatis filamentab.
♀ Cal. 3 phyllis: foliolis ovatis germen 3quetrum. Styli 3. Stigmata
simplicia appula 3 coria glabra Jacq.

cordata A. ? foliis cordato oblongis obtuse serratis subtus subtomentosis, spicis
filiformibus

Habitat in Cap. b. sp. Thunberg

Rami lignosi filiformes, apice villosifiduli. Folia petiolata sequi
pollicaria, obtuse serrata, supra glabra, subtus vix armata villosa
tomentosa. Petioli foliis breviores. Spicis axillares filiformes
foliis longiores. ad Nova.

scabroja A. plicis foemineis involucri cordatis nris, foliis oblongo-lanceola
tis serratis scabris. Sw. prodr. pag. 99.
Habitat in Jamaica.

Polygonum Ci. foliis ovato-oblongis serratis, spicis foemineis axillaribus oblongis, involucri no ~~mat.~~
spicis laciniis setaceis pilosis

Habitat ad fl. mathiam. O In v. Rohr ex herb. de Lund.

Caulis simplicissimus erectus pedalis, teres inferne glaber, superne villosus
subtomentosus. Folia petiolata bipollicaria ovata, obtusiuscula
nervi ^{marginibus} adpressis, simpliciter venosa nervis et venis subtus incanis
versus basin integerrima. Petioli filiformes foliis breviores incanis
scapula setacea parva. Spica in axillis superioribus pedunculata
sa, unguiculari dimidio coarctior quam longa, hirsuta. Pedunculus
longitudine spicae. Involucrum foemineum obovatum subrotundum - obovatum s. fide
laciniis elongatis setatis. Styli germinis villosum stylis 3. longi apice bifido
flos masculi non vidi an dioica

an eodem ac ulmifolia

Distachya Acalypha foliis ovato lanceolatis serratis, floribus sub villosis; floribus foemineis terminalibus
axillaribus solitariis involucri incisi; masculis speciosis
Habitat in Rupula et Cuneis ex herb. de Linn.
Rami teretes glabri, cortice cinereo. Folia in ramulis petiolata alterna pollicari
venosa subtus villosa petiolo prope nervi obtuse serrata, minima scabra
cuneata masculina gemma brevissime pedunculata, bractea pollicaria, floris foemineis axi-
laribus brevissime pedunculatis involucri serratis incisi. Rupula pubulata

eadem ac Tomentosa

19. angustifolia A. floribus foemineis subsessilibus terminalibus, involucri serratis, ma-
sculis spicatis, foliis linearibus serratis
20. cuneata A. foliis cuneiformi-lanceolatis integerrimis glabris (Protin V)
27. Dioica.

21. cordata A. foliis cordatis oblongis obtuse serratis subtus subtomentosis, spicis
filiformibus
22. scabra A. spicis foemineis involucri cordatis incisivi, foliis oblongo-lan-
ceolatis serratis scabris
23. betulifolia A. floribus foemineis axillaribus sessilibus, involucri cordatis
crenatis, masculis spicatis, foliis subrotundis crenatis glabris
21-22. setigera A. foliis ovato-oblongis serratis, spicis foemineis axillaribus oblongis,
involucri quinquesidis laciniis setosis pelosis

19-20. distachya A. foliis ovato-lanceolatis serratis subtus villosis, floribus foemineis axillaribus
solitariis ^{involucri} incisivi, spicis masculis geminis (eadem ac tamen A. sp.)
1. leguminosa (Auct. det.)
2. e montibus Gaf. Botones. herb. mus.
folia ovato-oblonga crenata. Dioica videtur

Adalyptha pendula Banks
nyda