

Achillea

Corollis radio flavis

1. agrarium A. foliis lanceolatis ^{oblongis} obtuse acute serratis
2. santolina A. foliis ^{glabris} serratis ^{tomentosis} denticulatis denticulis subintegris subulatis reflexis
3. foliata A. foliis linearibus ^{glabris} quadrifariam dentatis ^{tomentosis} pappi umbriatis dentatis
4. pubescens A. foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis ^{acutis} uniserratis subtus
5. ~~pubescens~~ ^{Campana} A. foliis ^{glabris} hirsutis ^{tomentosis}: caulibus pennatis pinnis linearibus dentatis ^{glabris} bipinnatis
6. aegyptiaca A. ^{glabris} tomentosa, foliis pennatis: pinnis oblongis serrato-dentatis, ^{obtusis}
7. ~~bipinnata~~ ^{composita} A. foliis ^{glabris} bipinnatis ^{multifloris} tomentosis: foliolis oblongis subintegris ^{obtusis}
8. abrotanifolia A. foliis pennatis ^{glabris} suprae compositis ^{glabris}: caulibus linearibus ^{glabris} serratis

9. *capitata* A. foliis linearibus serratis, serraturis transversis cristatis, caule ramoso

^{dabli} ^{glabris}

10. *Pharmica* A. foliis lanceolatis acuminatis argute serratis serraturis serrulatis

^{transverse petiolatis} ^{glabris}

12. *Alpina* A. foliis lanceolatis ~~dentatis~~ serratis, ^{verticalibus} tenuissime serratis

14. *herba rotta* A. foliis cuneiformibus serratis glabris

12. *Clavenna* A. foliis lobatis planis obtusis tomentoso-penicis

14. *macrophylla* A. foliis pinnatis planis incis. serratis: ^{extimis} majoribus

^{loddunatis}

15. *impatens* A. foliis pinnatis: pennis dissectis linearibus lanceolatis

^{integerrimis basi sursum unidentatis}
~~linearibus pinnatis serratis serrato subpinnatis~~

11. *cretica* A. foliis linearibus: pennis ^{subobtusis} retrosum imbricatis, caule

^{tomentoso}

17. *moschata* A. foliis pinnatis punctatis: pennis remotis linearibus subulatis

^{subintegris, rodio longitudine calycis}

18. *Sycanosa* A. foliis lanceolatis linearibus: pennis ovato-cuneiformibus

^{verticalibus, caule villosis pilis}

19. *atrata* A. pennulis pectinatis subintegris calycibusque glabris, pedunculis

^{cauleque villosis}

Achillea fidentis ad caulem basi per Boer. maj. 1. 1796. tab. 102.

Habitat in Canada test. maj.

Caulis fr. natus, albus. folia bipinnata. foliola alterna, linearia, remota, serrata, in inferioribus ternata, in superioribus caulini infima bifida. Flores axillares solitarii sessiles cum folio pinnato

compacta *Elchillea*

Habitat herb. ha. Martii.

Tacet. A. millefolia, ~~Ha~~ Tomentosa incana. Folia rad. alia bipinnatipennata incisa-pinnatifida: caulina sessilia bipinnatifida. Compositi
Decompositi. Calycis foliola lanceolata

Achillea

Achillea cretica frutescens fruticosa facie herb. Tournef.

Habitat in Creta herb. Tournef.

Caules plures, pedales, inani, puberuli. Folia linearia, tomentosa, caeco
no, pollicaria, obtuse confertim denticata: rudemista ramulosa in omni
bus axillis. Corymbis terminalis, compositus. Flores duplo vel triplo majores
quam in millefolio. Squama calycis oblonga. Radius albus

aurea Achillen

Habitat

herb. ha Martii

ramosa, tomentosa. Folia bipinnata: pinnae breves, lacinae una alterave in
cune. Flores magnitudine fere Anth. ten. stans. Calycis foliola interna
parva, tomentosa. Radix brevis

est Chrysanth. bipinnatum

argentea Achillea

Ptarmica orientalis foliis argenteis conjugatis Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Turc.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, striatus, villosus, subantherus. Colia radicali, pedicelata; caulina sessilia, pennata, sericeo argentea: pinna linear lanceolata, unguiculata vel pinnis ~~ultra~~ ^{quasi} minoribus acutis, alternis, integerrimis vel versis apicem dente uno alterove. Corymbus terminalis, decompositus. Calycis villosi majoris ^{quam} in tomentosa: foliola ovata, margine nigricantia, lobis luteis. Specer distinctissima.

Achillea

2
Millefolium erectum orientale, luteum Temnes. Cir.
Habitat in ^{Cappadocia} Oriente herb. Turc.

Caulis herbaceus, erectus, villosus tomentosus, uti. Folia folia inferiora petiolata, superiora
sessilia pennata: pinnis pennatis, seminequivalaris, pilosis, canescentibus, folia
superiora auriculata. Corymbis dactylocephalus. Calyces tomentosi villosi, incani
flore lutei
an tomentosa cui affinis

Achillea

Poma aurea memphitica aegerati folio Lippi

Habitat in Aegypto Lib. Musci

inter Diosc. carentes

Achillea

Helichrysum montanum sive *corollino marino folio* Desfonti Bouillon
mus. append. 1

Habitat herb. mus.

Planta per animum vel per animum ultra. Caulis inanis, simplex. Folia crassa, petio-
lata, frequentia, sex pollicaria, glabra, pennata: pinnis vix in spicula,
acuta, integerrime. Corymbus terminalis, simplex. Calyx flavescent, flores
albi

Acthullea

Pharmacia orientalis, folus pinnatis, semi flosculis vix confutui
Tournef. Cor

Habitat in Armenia herb. 4 us.

Caules plures, erecti, simplicis, teretes, pedales, super ne subaercentes.
Folia infima petiolata, superiora sessilia, bipinnata, in lobo sub
conna, pinnulae lineares obtusa, in inferioribus pinnatifidae, in superioribus
in aequalibus. Corymbi terminalis, compositi. Calycis oblongi.
iniani
aa varietas Acth. pubescentis

Achillea

Achillea orientalis altissima, lutea obtusifolia. Tournef

Habitat in oriente herb. Desfont.

Caulis ^{superius} pentagonus, glaber, ramosus. Folia radicalia petiolata, pedunculata
4 pinnata: pinnae pinnatifidae lineares, acutae, parvae, glabrae, mucronae
albido terminatae: caulium minus composita. Corymbi terminalis, par-
vi, glabri ramorum subsimplici: Calycis foliola ovata, carinata, gla-
bra.

Achillea

Pharmacia orientalis foliis Tanacetii incanis flore aureo Tournef. Cor-
pag.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis plures, sulcati, proplexi

Achillea

Thermis orientalis incana foliis pennatis, semi-floresculis florum in con-
spicuis Parnes. Cor. pag.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis plures, angulati.

habes no 4

Achillea

Pharmica orientalis foliis cristatis longioribus et capitulis majoribus Tournef.
Cor. pag

Habitat in oriente herb. mus.

Caulis plures, suffruticosi, erecti, simpliciter, angulati, semipedales; inani.
Folia petiolata, sesqui polliciana, pennata: pinna remota, lineari, obtusa, gla-
bro, apice albedo callosa, integerrima, saepe dente incisa. Compositus.
Calycis nulli. Flores lutei

Alchillea

Pharmacia orientalis, foliis santolino, incanis, flore pallido Borel.

Fr: 430

Habitat in Oriente herb. Musci

Caulis ramosi, incani. Stipula linearia, cristata

habeo no 1

Uchillea

Pharmica alpina altissima corymbis e luteo albicante Tournef.

47. fig. 1.

Habita

Herb. musci

Folia caulina sessilia, bracteata, utroque pennatifida. penna serrata,
crisp. Corymbus supraconiophtus

habes no 6

Urtica

Urtica orientalis foliis cristatis Tournef. Cor.

Habitata in oriente

Caulis canescentes, erecti, superne ramosi, angulati. Folia sessilia, linea
nervi, glabra, obtuse dentata, dentibus apice albidis. Corymbis termi-
nalis simpliciter. Flores magni, lutei.

habeo no 7

Achillea

Achillea foliis cristatis profunda laciniatis flore albo Vaell.

Habitat herb. Musc.

Caulis sesquipedalis, erectus, villosus subtomentosus, ramosus: rami alterni
simplices. Folia caulina bipinnata, tripinnata, pennata: pinnis lineari-
bus glabris, subpinnatifidis: laciniis acutis, apice villosis albidis. Pedun-
culi tomentosi, unicati. Corymbi terminales ramorum

Achillea

Achillea humilis ramosissima incana santolino folio flore albidis moyora
hispanica

Habitat in hispania herb. Marti

Caulis ramosus

habeo no 2

Filipendula Achillea

*Pharmica orientalis Tanacetifolia et facie flore minus Tournef. Cor.
pag.*

Habitat in Iberia herb. Tus.

*Caule herbaceo, striato, puberulo, villosulo. Folia inferiora petiolata, superiora sessilia, pennata, villosa canescentia: pinna lanceolata, serrata, decurren-
tes; basi puberula, alternis. Pedunculi terminaliter, elongati. Corymbi decem-
positi, villosi. Calyx ut in Ach. nobis, oblongus: foliola lanceolata, lobes
lutei*

Achillea

Pharmacia orientalis foliis cristatis Tournef. Cor. pag

Boccon. tab. 3.

Habitat in Oriente herb. Musf.

Caulis plures

habes no ①

Chamomeli folia Cibulka

Habitat

Herb. Rusf.

Caulis glaber, teres. Folia bipinnata, linearia, angustissima: pinnulae indivisae
loca. Racemi erecti. Flores nidantes. Calycis foliola oblonga.

Sanacetifolia Achillea

Habitat

Herb. Tusf.

Caulis teres, vellosus. Folia pinnata, pilosa: junno infimo mucrono, lanata
40, sesqui pollicares in se; lacinis serrato.

pauciflora Cichillea

Habitat herb. la. Montis

Solca radice tripennata. Semina striata, calyculo coronata. Pappus nullus
radix brevis. Calyx tomentosus. Flores magnitudine l. aurea

1 *Ageratum Achillea* foliis lanceolatis obtusis acute serratis Lin. l. V. p. 777.

Eupatorium meso-*Tray.*

Balsamita minor Dodon. pempt. 295. Monf. h. 3. p. 30. f. 6. tab. 92.

Habitat in Hispania, Gallia Narbonensi, Aetna &

Caules plures ex eodem radice, pedales, stricti simplicissimi glabri uti tota
planta. Folia pollicaria sessilia basi laciniata, ceterum perofunde dentata
dentibus minute acute serratis. Corymbus hemisphaericus multiflorus.

Achillea ageratum foliis integris oblongis obtusis serratis fasciculatis
Walden. Ach. pag. 7

vocat foliis in se pennatis herb. Hartmunt

2 Santolina Achillea foliis petalis dentatis: articulis subintegris subulatis reflexis L.

^{L.V. p 777}
Pharmacia orientalis, Santolino folio, Flora major Tournef. Cor. 37.

Achillea lutea tomentosa, Santolino folio Vaucl. Act. 1720. p. 417.

Habitat in oriente. 4

Achillea Santolina foliis pinnatis pinnatifidis glabris: pinnis obtusis tridentatis
Welden: Act. pag. 247 ^{rami variet.}

Caules plures, adscendentes, basi subramosi, simplices, pyramidei, tomentosa in
ni. Folia ^{crepida} linearia, subteretia, semipollicaria, tomentosa in cana. Corymbus
terminalis compositus. Calycis tomentosi lobis Tournef

foliolo calycis trifida in specimine Guss

Desf Guss.

~~non ed.~~

lobata. A folus linearius villosis subdentatis apice lobatis

Eosphi. Despr. pag. 210

Habitat in Aegypto

mihi haud nota

Leonopifolia A. foliis pennatifidis dentatis glabris Willd. Act. bot. pag. 100

Habitat in oriente &

floris luteis

non vidi

quadripartita ~~umbellata~~ ^{dent} ^{hirsutum}
3 falcata Achillea foliis linearibus ~~pinnatis~~ ^{pinnatis} dentatis: dentibus imbricatis denticulatis

Achillea iniana, Santolina foliis plerumque falcatis oppositis, flore sulphureo

Vaill. act. 417.
Ach. falcata foliis ^{dentatis} linearibus obtusis planis: denticulo crenatis

B. Bormia orientalis, Santolina folio flore minore, Peron. Cor. 37.

Achillea lutea humilis, Santolina folio, radice repente. Vaill. act. 1720 p. 417.

Habitat in Oriente 4

Caulis erectus spontanea palmanis, cu basi ramosus, lignosus. Rami simpliciter
mitomentosi, culta major, ramosior. Folia fere Santolina imbricata
& folioli subrotundi, dentatis, nidimenta ramulorum in omnibus fere axillis
Corymbi terminales: Calycis tomentosi iniani. in culta folia fere
plana pinnata pennis in dentato crenatis

Achillea falcata foliis pinnatis alternis tomentosis: pennis falcatis
hi argute crenatis Walden: Ach. p. 75

Santolina Gronov. fl. Orient p. 109. no 256
minime Santolina chamaecyparissifolia herb. Ravn

an Achillea Santolina diversis est.

micrantha A. foliis pennatis pubescentibus: pennis laciniatis; radice minime
Wied. Arch. pag 33.

Achillea foliis lineari-bus pennatis-fidis, pubescentibus petiolatis,
foliis incispi, calycibus oblongis Gmel. Sib. 2. p. 190. tab. 03.

Fig. 2.

Habitat in Sibiria 4.

Floris lutei

non vidi

pelosa A. foliis pinnatis subtus pelosis: pinis nris integris ~~pinnatis~~ bifidis que Wild.

Ach. pag. 31.

Habitat

7

flores lutei

non vidi

4 pubescens Achillea foliis bipinnatis: foliolo lanceolatis incisio serratis subtus lanuginis
Lin. S. V. pag. 777.

Narmica orientalis, foliis Tanacetii incanis, semiglobois florum pallide luteis
Tournef. Corol. 371

Madriniana tomentosa et incana, achillea folio, flore aureo Vaill. act. 1722. p. 286.

Mitte folium orientale, foliis Tanacetii incanis, radiis pallide luteis Boerk.
Lyd. 1. p. 112.

Habitat in Oriente

Dignoscitur ab A. tomentosa foliis majoribus latioribus, pinnis lanceolatis
dentato incisio sequa fere Tanacetii vulgari. Receptaculum omnino
paleaceum. Caulis ramosus fructus

achillea pubescens: foliis subbipinnatis pubescentibus: pinnis pinnatis
defidis: laciniis inaequalibus Wild. Act. p. 35

4 Tomentosa Achillea ^{cauliculis} foliis ^{integris} pinnatis hispido tomentosiss: ^{caulis pennatis} pinnis linearibus ^{bas} setaceis subpennatis ^{dentatis} dentatis.

Astratiotes vel militaris millefolia Dod.

Astratiotes millefolia, flavo flore Clus.: h. 1. p. 330.

Millefolium tomentosum luteum Bauh. Pin. 140.

Achillea tomentosa foliis pinnatis hispitis: pinnis linearibus: hispidis Lin. S. V. 777.

Habitat in G. Narbonne, Valeria, Tartaria &

Planta spontanea palmarum ~~et~~ ramosa tota tomento hispitis summa, culta
major partemque hispitis deponit. Folia radicalia et infima bipinnata
pinnis linearibus setaceis, caulibus pennatis pinnis dentatis, ^{franco} ~~sepro~~ ^{compositis} ~~pennatis~~ ^{sepro} ~~pennatis~~
laciniis linearibus integris: Corymbis terminalibus caulis et ramulorum ~~et~~ ^{et}
cum simpliciter. flores congesti.

Achillea tomentosa foliis subbipinnatis tomentosiss: pinnulis densis
bincatis integerrimis acutis Wild. Ach. pag. 44

6 *Aegyptiaca* *Achillea tomentosa* foliis pinnatis: ^{oblongis} pinnis subrotundis serrato dentatis floribus
congestis

Abinthium serpyllum Aegyptium Lued.

Abinthium aegyptiacum God. pempt. 25.

Abinthium Santonicum aegyptiacum Bauh. Pin. 139.

Pharmica incana, pinnatis cistatis Tournef. Carol. 37. d. 1. p. 228. v. 87.

Achillea aegyptiaca foliis pinnatis: foliolis obtuse lanceolatis, serrato denta-
tis Len. S. V. p. 7177.

Habitat in Aegypto septentrionali

Tota tomentosa incana. Caulis erectus sesu simplex, pinnis foliorum catroisum
majora, alterna dent profunde dentata. Flores in Corymbis globosis congesti.

Achillea aegyptiaca foliis pinnatis tomentosi: pinnis subrotundis dentatis
Walden: Ach. veg. 23

abrotanifolia Achillea foliis pennatis supradecompositis glabris: laciniis linearibus ^{retais} ~~linearibus~~ di
stantibus Len. S. V. pag. 77.

Millefolium orientale altissimum Tournef Corol. 37.

Habitat in Oriente 4

Tota planta glabra. Solia inferiora ^{petiolata} sessipedalia, ^{caulina amplexualia} ~~Solia per~~ ^{tripinnata}
ca. Pinnula angustifolia. Corymbus compositus. Calycina squama cornea
et fere unicoloris.

Achillea abrotanifolia foliis bipinnatis pubescentibus: pinnulis
tenuissimis linearibus ^{na teyemmis} Wild. Arch. pag. 464

9 *enflata* Achillea foliis linearibus serratis, serraturis transversis enflatis, caule ramoso debili.
Act. off. Jacq. 2. p. 25. *

Pharmica Linaria folio angustissimo cum margine peculiariter dentato et veluti
squamoso, floribus albis Michel. Hort. flor. p. 77. n. 5.

Achillea incana, cretica, Santolino folio, flore albo Vaill. act. 1720 p. 416.

Pharmica cretica frutescens, Santolino facie G. R. H. 497.

Habitat. 7

Caulis debilis canescens paniculatus. Folia sessilia. Flores terminaliter caulis
et ramulorum pauci 3-5. Calyx canescens squamoso absque margine fuso
varietas secundum Vaill. flore lacteo herb. Vaill.

18 ptarmica Achillea foliis lanceolatis acuminatis argute serratis Lin. S. V. p. 777 Cl. Dan.
Pyrethrum Brunfels. 7c.

Ptarmica vulgaris Clus. h. 2. p. 12.

Dracunculus potanensis serrato folio Bauh. h. 98.

13. Ptarmica vulgaris flore pleno Clus. h. 2. p. 12.

Habitat in Europa temperata 7

Caulis pedalis, simplicissimus, erectus. Folia amplexicaulia sesquipollicaria
glabra, ~~avenia~~ ^{minuta}. Serraturae frequentes retrosum evidentiores. Peduncululi et
calycis villosi subnervi.

Achillea ptarmica foliis integris lanceolatis acuminatis amplexi-
caulibus serrulatis Willden: Bot. pag. 10

Serrata Q. foliis linearibus lanceolatis sessilibus tomentosis, profunde serratis
basi laciniatis Retz. off. 2. pag. 25

Pharmica alpina incanis serratis foliis Herm. Lugob. 694

Stemunculus alpinus ageratis foliis incanis Rup. p. 344

Habitata in Helvetia &

Caulis subtruncatus superne sulcatus folia basi ^{repe sensu} angustiora
fere auriculata frequentia serraturis subserratis

folia interdum glabra herb. Desford

Singulari est quod Linnæus hanc speciem non
memorasset, cum tamen in herbo Upsalensi ad eam
unde specimen habeo

11 alpina Achillea foliis lanceolatis dentato-ferratis; denticulis tenuissimis ferratis
Lin. S. V. pag. 777.

Pharmica alpina, foliis profunde incisissimis Tournef. G. R. H. 497.

Pharmica alpina, incisissimis ferratis foliis Herm. Lugd. 694.

~~Habitat in Alpibus Sibiria~~

Achillea serrata foliis linear-lanceolatis sessilibus tomentosis; profunde
serratis basi laciniatis Retzii fasc. 2. p. 25 *

Habitat in Alpibus Sibiria

Caulis ascendens pubescens. Folia semiamplexicaulia basi laciniata
Corymbis terminalibus compositis. Palyris squamo margine
superiore dente foliorum interdum integerrimo

Achillea alpina foliis lanceolatis dentato brevissimis petiolatis
ferratis: ferratis ferrulatis Willd. Ach. pag. 12.
Folia glabra Willd.

~~alpina~~ Achillea alpina Retzii

aliam ex horto amstelod. foliis nudis viridibus floribus minoribus corymbis
diffuso an satis diversa, est Achillea humilis, foliis pennatis late viridibus, pen-
nulis acutissime serratis Vaill. p. 416. Pharmica foliis profunde serratis, late viridi humilior Willd.

13 clavenno Achillea foliis laciniatis ^{planis} incisissimis tomentosis ferrugineis. L. H. p. 777. Jacq. fl. Illyr. t. 26.

Absinthium album Lobel. Ic.

Absinthium alpinum umbelliferum Clus. h. 1. p. 340.

Absinthium alpinum umbelliferum trifolium Bauh. Pin. 139

Dracunculæ argenteæ Morf. h. 3. p. 46. f. 6. Tab. 10. fig. 5.

Achillea foliis pinnatis-laciniatis planis villosis nitida Hort. Cliff. 452.

Habitat in Alpibus Austria, Pannonia, Carinthia apens 4

Planta perennis tota ferrugineo nitida. Caulis ascendens simplex, striatus subaphyllus. Folia inferiora aggregata digitalia, extorsum latiora. Laciniis lanceolata vis obtusi extorsum dentatis. Corymbi versus summitatem caulis, tres pluresque.

Achillea clavenno foliis obovatis incisissimis tomentosis Welden Ach.
nos. 13

capitata A. foliis profunde pinnatifidis tomentosi: pinnis dentatis, floribus
umbellato capitatis Wild. Ach. pag. 13
Habitat in pyrenæis inque Helvetia
Flores albi

helvetica A. foliis hirsutis pinnatis pinnis acutis dentatis latepennatis

Hall. hist. pl. pag. 110

Habitat in Valleja 4

flores albi

- 14 *macrophylla* *Achillea* foliis pennatis planis inciso serratis: cithonis majoribus coordinatis
L. Spei. pag. 1265* S.V. pag. 777
Draconculus alpinus; foliis scabris Bauh. Pin. 39. Pin. 98.
Parnassia alpina matricariae foliis Triumf. obs. 83. t. 23. Bord. mus. 2. p.
150. t. 110. Barrel. 4. 99.
Corymbifera mellefolii umbella, folio alato et laciniato Raii h. 345.

Habitat in alpidibus Helvetiae Italiae.

Folia magnitudine Tanacetii. Caulis subperpetuus tripedalis. Flores Parnassiae: Calycis squama margine nigro

Achillea macrophylla foliis pennatifidis pinnis lanceolatis inciso serratis inflores. dissectis Wild. Ach. p. 20

lucida Ach. foliis pinnatifidis glaberrimis laciniis linearibus
inæqualiter serratis obtusis

Habitat

in pt Bellardi.

Caulis erectus herbaceus pubescentibus glaberrimus
foliis oppositis remotis. Flores Achilleæ millefolii
purpureo

15 impatiens *Achillea* foliis pennatis: pinnis distantibus lineari lanceolatis integerrimis: basi sur-
^{unidentatis}
sum ~~acutis~~. Len. l. V. p. 777.

Achillea foliis pennatis, pinnis longis acutis; inferioribus sursum deinde acutis
glaberrimis

Achillea impatiens foliis pennatis: pinnis distantibus lineari lanceolatis integerrimis basi sursum acutis Len. l. V. pag. 777.

Habitat in Sibiria

glabra. Caulis erectus simplicis summi. Tolia amplexicaulia. Dysprobitus facile a
reliquis pinnis remotioribus quam in ulla alia specie, basi lobo acuto acuto per
inprimis inferiore. Flores corymbosi.

Achillea impatiens foliis pennatis: pinnis lanceolatis geminatis
Wilden. act. pag. 31

16 Cretica Achillea foliis linearibus: pennis subrotundis retrosum imbricatis, caule
tomentoso Lin. Spec. pl. pag. 126 & F. V. pag. 778.

Mellefolium creticum Bauh. prodr. 72. Pin. 140.

Mellefolium creticum Bauh. h. 3. p. 139.

Habitat in Creta & ^{seplicia}

Natura mellefolii. Folia linearia subtomentosa: pennis subrotundis ^{profund} dentatis
^{aristata} ^{pinatis} ^{lobatis} bifariam imbricata. Corymbis pediculis compressis. Calycis villosi.

Achillea cretica foliis pinnatis tomentosis: pennis quadrifidis imbricatis
L. Wild. Ach. pag. 26.

Squarrosa A. foliis lanceolato linearibus: pinnis ovato-cuneiformibus inciso-crenatis: verti-
calibus, caule villosifido Hort. Kew. 3. p. 242.

Habitat - - - 4

8 folia sparsa angusta lineana glabra. pennula parva integra
bi fis. dentato inciso. flores parum majores quam in millefolio

angustifolia Ach. canescens foliis lineari-bus dentatis pinnatis pinnis
lineari-bus integerrimis

Habitat in Austria

Caules prostrati ramosi. Rami superne ramulosi
Folia angustissima, pinnis brevibus dentatis. Flores par-
vi calycibus villosis subtomentosi

Lucia A.

20 *moschata* *Achillea* foliis pennatis. pennulis simplicibus ^{punctatis glabris} floribus umbellatis Lin. S. V.
pag. 770. Haerqu. flor. Austr. vol. 5: app. tab. 33. all. fl. Ped. 1. p. 102

Achillea moschata Rhodis, Tanacetis cognata herbula J. J. Hoffm.

Tanacetum alpinum Baub. Pin 132.

Achillea pennata, pinnis simplicibus glabris punctatis Hall. h. 112.

Habitat in alpebus Austriae, Helvetiae, Graefoni 7.

Folia minus divisa quam in atrata. Flores triplo minores. Planta digitalis caule
sulcato et glabro varians.

Achillea moschata foliis pennatis punctatis: pinnis remotis linearibus subulatis subnatis,
radix longitudine calycis Hoffm. h. 3. p. 240

Achillea levid Scop. Delic. 1. p. 6. t. 3

Achillea moschata foliis pennatis glabris: pinnis linearibus lanceolatis ciliatis
geminis punctatis Wild. Ach. pag. 20

17 *Atrata* Achillea pennulis pectinatis subintegris calycibusque glabris, pedunculis ^{caulisque} villosis
Parthenium alpinum Clus. l. 1. p. 336.
Matricaria alpina chamomelifolia Bauh. Pin. 134.
Achillea foliis pennatis pedis acutis trifidis Hall. Act. 6. p. 114. n. 89.

~~Achillea atrata~~
Achillea atrata pennulis pectinatis integripulis, pedunculis villosis L. S. V.
p. 777. Faecu-fl. Aust. t. 77

Habitat in alpebus Valispe, Helvetia, Austria: locis asperis humidis &
multa habet communia cum nana. Differt vero quod tota glabra pedun-
culis exceptis. Foliis pennis linearibus lanceolatis longioribus integris, vel
dente uno alterove laciniatis, ^{non trifidis} & sola interdum bipinnata. Caulis
sternam villosis. Paleo sphaerulato calycibus marginata lato fusis. Flores um-
bellati

Achillea atrata foliis subbipinnatis glabris pectinatis, caule
veloso Willd. Act. pag. 33

149ana Achillea hirsutissima foliis pennatis dentatis. Len. S. V. pag. 70 778.

Millefolium alpinum inaequanum, flore specioso Bauh. hist. 3. p. 138. Mon. hist. 3. p. 39.
f. 6. t. 11. fig. 11. Raii h. 347.

Millefolium alpinum tomentosum odoratum nanum Boerh. mus. 2. p. 166. tab. 120.

Achillea foliis pennatis lanugine obductis, floribus albis umbellatis All. pedem.
v. t. 2. fig. 3.

Achillea nana foliis pennatis dentatis hirsutissimis, floribus glomerato umbellatis Len. S. V. p. 778.

Habitat in Alpibus Valais, Helvetiis.

Planta digitalis vel palmaris velli densissimis hirsutissimis hirsutis. Caulis simplicius primus. ^{sequi polliciana} folio infima petiolata, caulina 4 5: sessilia minoro, omnia pennata: pinna ^{acuta} dentata. Flores ^{maiores quam in reliquis} axillares terminales in umbella, ut edum flor. unice ut caulem terminat. Calycis hirsuti uti reliqua squamis margine lato fuso. Palea apice sphaicelata

Achillea nana foliis pennatis villosis: pinnis linearibus integerrimis foliorum inferiorum dentatis Willd. Ach. pag. 29

Sanicula folia Ait. foliis pinnatis pinnatis pinnatis pinnatis pinnatis
laciniis integris utrisque Allen. fl. Pedem. no 666
Müll. hort. Ang. tab. 9.
Hall. hort. no 100

Sanicula folia Ait. altera pinnatis laciniis
laevis
no 21
Hall. hort. no 100
Müll. hort. Ang. tab. 9.
Allen. fl. Pedem. no 666

pratensis Vandellia foliis petiolatis oblongis ^{acutis} inferioribus serratis
Martiana pratensis Aubl. fl. Gu. pag. 642. Tab. 257.
In Cayenna legit Lh. v. Prokr. ☉

Lacini fere majorano.

oppositi
Rami bracteati.

Caulis herbaceus, erectus, tetragonus, angulis acutangulis, ramisque,

Folia opposita, petiolata, unguiculata, oblonga, utraque acuta,
uti caulis ad centem velo pericula, viridi canescentia, margine
parum reflexo, infera ^{venosa} serrata, ^{rema} superiora integerrima.

Petiolus brevissimus

basin versus integerrima

Floris axillares, sessiles, parvi, bryati foliis aliquot parvis, ovato-
subrotundis.

Calyx quoad partitur: laciniis linear-lanceolatis, corolla brevioribus

Capsula uniloculari, bivalvi. Semina copiosa minutissima
(Ufus in gonorrhoea, uti adstringens Lh. v. Prokr)

20 millefolium Achillea foliis bipinnatis nudis: Caecis linearibus dentatis, caulibus superne
filiatis Lin. S. V. pag. 778. Et. Lan. 737

Millefolium album Brunfels.

Millefolium f. Achillea Dod.

Millefolium vulgare album Bauh. pin. 140

Achillea foliis pinnatis, pinnis longe aequalibus pinnatis pinnulis trifidis et quinquefidis Hall
β. Millefolium rubro flore Clus. hist. 331 h. n. 107.

Millefolium purpureum majus Bauh. Pin. 140

γ. Tharmica alpina, Tanacetifolia, flore purpureo Tournef. Inf. R. H. p. 497.

Achillea foliis pinnatis, pinnis semipinnatis incis, et integris Hall. hist. h. 100

Achillea tanacetifolia All. Fl. Pedem. 666

Habitatio Europa paucis et pratis

Caulis ^{et folia} ~~in parte~~ pilosus ramosus: folia minore nuda raris pilosa uti caulis. Bala
superiore pinnata pinnis pinnatifidis. Corymbus compositus. Calycis ovati
squama margine tenui fuso

Achillea millefolium Willd. Proch. pag. 39

magna Achillei fol.

polyphylla Aeth. foliis bipinnatis subbipinnatis cauleque glabro
pinnis acutis

Habitat.

Caulis erectus simplex. Folia coriacea firma sesqui-
pollicaria pinnis simplicibus lineantibus floribus
parvis glabris

~~Achillea glabra~~ foliis pinnatis pinnis dentato incisè corymbis confertissimis
hemisphaerici
simili nobili

anonyma

compacta Cist. pubescenti tomentosa foliis subbipinnatis pinnis
invisis Calycibus tomentosis

Hab. in Pyrenaea alpina altissima, conymbis & luteo
albicantibus Tournef. infr. 497?

Achillea compacta ha Marti Encycl.

Habitat in Gallia australi

Caulis erectus simplicis, basi lanato tomentosa

Folia petiolo ^{basi aurata} alterna ovata pinnatis trif. trif.

88. Conymbis terminalis densis

innotuit Achillea ²⁴⁰
glabris planis linearibus
Caule ^{pubescente} ~~pubescente~~ foliis ^{pub} pennatis ~~pub~~ laciniis linearibus oppositis, dentatis. Flores ut in millefolio
cui maxime similis ad diversa cultura est horto Upsalensi

24 nobilis Achillea foliis bipinnatis: inferi oribus nudis planis, superiori oribus obtusis tomentosis,
Corymbis convexis confertissimis Læ. Sp. p. 1268 * L.V. 778.
Mellefolium nobile et Habitat vera Tray. h. 476.
Tanacetum minus album, Geora Camphora Bauh. Pin. 132.

Habitat in Helvetia Myria, Bohæmia, G. Na: bonensi, Tataria &

Caulis altior quam in insequente, folia magis expansa nec ex ovuli lanceolata
Calyces minores subpelosi.

Folia bipinnata, obtusa, tomentosa, (sunt nec in specimen culta nec fronte nec
tomentositatem observo) folia vero in summis floribus simplicia bipinnata,
integerrima, tomentosa obtusa. Corymbi densi conferti. Caules teretes non sulca-
ti. Florem radiis denum reflectatur ut non apparet. Lin. l.

Achillea nobilis foliis subbipinnatis pubescentibus: pennis oblongis
pinnatifidis incisi squalibus valid. Ach. pag. 36

Differentia et descriptio minus sufficiens

25 odorata Achillea foliis bipinnatis ovali ^{bus} lanceolatis nudiusculis; corymbis fastigiatis confertis
Len. Spec. plant. pag. 116. V. pag. 770.

Mellefolium odoratum minus monspeliensium Mon. J. H. f. Magnol. Monsp.

1777
Mellefolium minimum crispum, flore albo hispanicum Barrel. rar. 116. t. 92.
Achillea.

Achillea odorata foliis bipinnatis, pinnulis integerrimis lineariibus acumi-
natis, calycibus pubescentibus; corymbis fastigiatis Galen. Coll. l. p. 254. t. 21. *

Habitat in Helvetia, Narbona, Hispania &

Agre distinguitur ab ante cedente nisi odore et forte nil nisi sanctorum ut suspicio
sit Gerardus.

Caulis palmaris simplex, pubescens. Folia bipinnata pinnulis ~~integerrimis~~ serratis ~~integerrimis~~
~~nitentibus~~, acutis. Peduncululi et Calyces villosi

Achillea odorata foliis bipinnatis pelosis: pinnulis lanceolatis integerrimis mucronatis Wild. Ach. pag. 42

an Specimen monspeliense communicata vere odorata cum flores flavescentes videntur
et folia hyeme simplicia et bipinnata minus serrata

23 Sophiofolia Achillea folus radicalibus pennatis supradecompositis caulinis bipennatis pennis
ferratis.

Habitat.

Caulis erectus simplex pubescens, superne striatus. Folia ^{plana} ~~radicalia~~ ^{non villosa} ~~tripennata~~
pennis subincisis linearibus tenuibus. Superiora bipennata, suprema penna
ta pennis linearibus ferratis. Corymbi terminalis Ach: nobilis floeopari
Calycis subcylindrici parvi villosi absque margine fuso

20. nana A. *resutiformis*, foliis pennatis fidis: pinnis dentatis
21. millefolium A. foliis bipennatis nudis: lobis linearibus dentatis, caulibus
perme sulcatis
22. magna A. foliis bipennatis subpilis: lobis linearibus dentato-incisi-
cuneatis decussatis
23. leucosticta A. foliis pennatis planis glabris: pinnis subdentato-incisi-
24. Sophis folium A. foliis radicalibus profundecompositis: caulibus bipennatis
pinnis serratis
25. nobilis A. foliis bipennatis: inferioribus nudis planis, superioribus obtusis
tomentosis, corymbis compositis confertis pinnis
26. odorata A. foliis bipennatis ovalibus nudis pinnis, corymbis fastigiatis confertis
- 10-11. serrata A. foliis linear-lanceolatis fere pinnatis tomentosis, profundecompositis
si basi laciniatis