

Clethymus

♂ Cal. 4phyllus. Corol. 0.

♀ Cal. 4phyllus

Jem. solitana.

~~Cor.~~ cernuens perflans. Cor. 0 styli 2. Intra lobis utans

Scaber
capite

Athyrium

pag. 30

Tropici & praesens foliis ovatis, inaequaliter serratis, apicis. Ret 2 obt. pap. 5.
Habitat in India orientali. Nonij;

rami teretes vel obovati striati, pubescentes, albescens.

Folia breviter petiolata, alterna obovata bi s. tripolliciana
acuminata basi obtusa serrata inferne versus integerrima venosa

supra nitida utrinque scabra stipula pedunculata, articulo. semi
unguiculari, petiolo longiore flori masculi in ^{globosa} capitulo magnitudine

ovae parvis collecti foemineis solitariis. Stylis longissimis bifidis

Tithymalus flore globoso serratifolius Her. m. herb.

Impatiens ~~Convolvulus~~ foliis grandaeiformibus integrisve emarginatis basi cordatis, pedun-
culis unifloris, caule repente.

cordatus. Strubli. foliis cordatis serratis nervosis Lour fl. Coch. pag 615:

Et abit ad prope Cantonem Sinanum

Arbor mediocrius. Folia acuta, alterna. racemi masculi simplicis, laterales.
racemi multi. Stamina 4 Antheris cochleato

non vidi. Achymus

apert. Heblus. foliis ovatis apertis, floribus parvis Lour. fl. Coch. pag 614
Habitat in Cochinchina.

Aster magna. Rami valde tortuosi. folia integerrima alterna, opposita.
flores in capitulis parvis multis, pedunculatis parvis. foeminei pedun-
culi, flori solitarii parvi filamenta flexuosa. Stigmata simplicia
Mucosa biloba.

Achymus

comparatur cum apertis