

Aerophorus

Cal. umbicatis: Semina fusiformia, striata, scabra. Pappus stri-
pilosus, plumosus: radus filiformibus

radicatus 1. A.

maculatus 2. A.

velociter 3. A.

~~Cathyphora~~
australis

Cathyphorus Gauth.

pilosus

Cathyphorus foliis sessilibus lanceolatis, inferioribus ex trorsum
dentato sinuatis, superioribus integerrimis.

Habitat in monte video Brasiliae, Commerson. Ex herbario Gussonei
et Musaei Parisini.

Radix longa, descendens. Caulis plures, herbariae, adscendentes,
& pithamisi, simpliciter vel subramosi, striati, pilosi. Folia
bi- & quadrifollicaria, ^{acuta} radicalia, ^{plurimum} et inferiora ~~exteriora~~ ^{exteriora} den-
tato sinuata; ^{paucis} caulina paucis, superiora minus et angustiora,
omnia acuta, utrinque pilosa, proaequaliter costata. Peduncululi ter-
minales, solitarii, simplices, uniflori. Calyx imbricatus: foliola
lanceolata, interiora radio parum breviora, margine parum sca-
riosa, raris pilosa. Semina oculo armata rugulosa. Pappus stipi-
tatus, plumosus. Pales lanceolata

Senecio

Clethropsygnus - *hispidus* Cuchoni folio Vaille

Hypochoni orientalis annua, folio Cuchoni sylvestris Boeckh. Ind. alt. 2. p. 264.

Habitat in oriente Herb. Mus.

Caulis ramosus, hispidus, scaber. Stipulae caulinae sessiles, 2-3 pollicariae, infernae ren-
cratae, subpinnatifidae: laciniis lanceolatis, integerrimis vel dente unico inferna
terminalis ovata, acuta, dente uno alterove, pilis raris hispidis, superiora lan-
ceolata, basi auriculis laciniatis. Pediculi glabri, uniflori, striati, superne
versus sensim crassiores, squama una alterave subulata. Calyx calyculatus: foliis
linearibus lanceolatis, hispidus. Pappus stipitatus. Paleae subulatae. Semina stri-
o-crenulata

glabrotus *Athyrophorus* foliis lanceolatis glaberrimis, radicalibus dentatis, caulinis
integerrimis.

Habitat in Brasilia Commerson. Ex herbario Gussone

Caulis plures, recti, subdivisi, striati, glabri: Rami uniflori. Folia
radicalia bi-tripollicana, in petiolum attenuata, dente uno attenuate
notata: caulina angustiora breviora; pedunculorum setacea, remotissimi-
ma. Calyx imbricatus: foliola lanceolata, margine villosa, superne
membranacea. Pappus stipitatus, plumosus. Semina lacinis transversim
elevato-lineata. Palea hyalina, longa.

~~Hypochaeris~~

~~Habitat in Brasilia herb. Guspei~~

~~Caulis erectus, frutuosus, glaber, superne ramosus. Folia semianplexicaulia,
lanceolata, attenuata, inferna latiora est, supra laciniis 2-3 linearibus
angustis integerrimis, coetanea integra. Pedunculorum folia pubescentia
angustifolia. Calyx imbricatus, villosus. Folioleae pinnatae. Pappus stipi-
tatus plumosus, uniformis. Paleae ut in Hypochaeride~~

Hypochaeris

Helvetica H. caule simplici solofo uniflora, foliis lanceolatis dentatis. Paerq. Insp.
v. 2. p. 25. Ic. var. 4. S. V. p. 72

Heracium alpinum foliis dentatis flore magno Bank. bot. prodr. 65. Hall
Hypochaeris uniflora All. fl. Pedem. n. 550. Tab. 32. fig. 1. ^{her. Tab. 1.}

Habitat in pratis alpium Helvetiae et Austriae

Caulis erectus, simplicissimus striatus, sub flore valde incrassatus, pilis
longis rariis adpressis. Folia ^{inferiora} ^{superiora} ^{inferiora} ^{superiora}
superiora sessilibus paucis remota sensim minor, ^{inferiora} ^{superiora}
parva, interdum deorsum linearia integerrima, ^{interius} ^{exteriora} ^{interius} ^{exteriora}
in extus parum sensim latiora, ^{interius} ^{exteriora} ^{interius} ^{exteriora}
terminalis magnus. Calyce hirsutissimo profertim margine
hirsutis quasi lacunata. Pappus plumosus

radicata H. foliis multinatis obtusis patris, caule ramis nudo gla-
bro, pedunculis squamosis Lin. Sp. V. pag. 721. Fl. Dan. 7. 150

Heracium vestrum Dod. pempt. 639.

Heracium longius raduatum Lobel. 40.

Heracium dentis Leonis folio bulbosum Bauh. pin. ad v.
p. 63. pin. 127.

Heracium dentis Leonis folio rectius, majus Bauh.
pin. 127. Monf. hist. 3. p. 66. f. 7. Tab. 4. fig. 27.

Habitat in Europa orientis profemi 2

Solia radicalia basi attenuataulis raris adpressis lacinis
oblongo inaequalis obtusa. Scapi pedales ramis
ramis alternis elongatis uniflori basi squama
narrow lanceolata nuda. uniflori squamis ovatis
attenuatis adpressis superius versus perispermum
sati. Calyx glaber squamis lanceolatis

maculata H. caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis
S.V. pag. 721. Fl. Dan. tab. 149. All. p. Ped. n. 149. t. 14. fig. 3.

Theriacum latifolium L. Claf. hist. 2. p. 139

Theriacum alpinum latifolium hirsutie incanum, flore magno Bauh. pin.

¹²⁰
Theriacum alpinum, foliis dentatis, flore magno Bauh. Pin. prodr 65
pin. 120

Habitat in Europa frigida in pratis asperis &

Caules pedalis et ultra simplicissimus vel ramo solitario, apice
tunc nisi foliolatum lanceolatum ad basin rami hinc profertur
inferne, stratus. Folia radicalia oblonga pilosa indivisa
dentes remotiusculi parvi, plerumque faucibus flexis in foliorum
pagina superior. Flores terminalis solitarius. Calyx basi sub
ventricosus folioli lanceolatis dorso pilosissimis