

Alconidum

* Incapsular

1. septentrionale A. foliis subpeltatis multifidis villosis
2. lycodorum A. foliis palmatis multifidis glabris
3. pyrenaeum A. foliis multipartitis: laciniis linearibus lanceolatis mucronatis.
4. japonicum A. foliis trifidis palmatis: laciniis incisis obtusis
5. napellus A. foliis tripartitis laciniatis: laciniis linearibus lanceolatis pedicellis simplicibus corollis glabris

** quinquecapsular

6. anthora A. foliis multipartitis, laciniis linearibus.
7. variegatum A. foliis tripartitis laciniatis, pedicellis ramosis corollisque villosis
8. cammarum A. foliis subquinquepartitis: laciniis linearibus lanceolatis
9. ^{album} uncinatum A. foliis glabris tripartitis: laciniis acutis incisis, petalis supremis quinque lateralibus longioribus

10 uncinatus A. foliis multilobis, corollam galea longius extensa

volubile A. caule volubi Pall-hort DemEd.

Septentrionale
1 villosum A.

foliis subpeltatis multifidis villosis

Aconitum coeruleum seu Napellus primus Rudb. Cap. 96.

Aconitum foliis peltatis multifidis hispido, petalo supremo cylindrico
c. l. fl. Lapp. n. 221

Aconitum lycocotonum f. San Sat

Habitat in norvegia

Paulis villosis folia minus profunde scissa ac in Lycocotonum
flores villosi coerulei Nicta cucullo cylindrico.

2 *Lycotomum* A. foliis palmatis multifidis villosis Lin. S. V. med. bot. 4. Tab. 81

Aconitum 12. Camer. epit. 227.

Aconitum Lycotomum flore rubra luteo Best. Eyst. of. 25.
fig. 2.

Aconitum Lycotomum luteum Bauh. pin. 103.

Habitat in alpinis Helvetia austria Italia &

aconitum Lycotomum 2. Dalech. hist. 1739

Lycotomum A. foliis palmatis ~~quibus~~ ^{quibus} multifidis glabris
Caulis bi- sive tripedali- medius glaber superne pubescens
Folia pedicelata 6 fidi laevia inferne integris superne
errato inaequaliter incis. Racemus terminalis pedunculatus
villosus uti floris corolla lutea galea elongata apice
rotundata

3 pyrenaicum a foliis multipartiti: laciniis linearibus imbricatis

Scaroni Hort. Upp. 1524

Aconitum pyrenaicum luteum, foliorum segmentis fibrinam
incumbentibus. Raj. europ. 367.

Habitat in Sibiria, Tartaria, Pyrenaeis &

tota pubescens. Caulis tripedalis ramosus. Folia petiolata
ampla multipartita laciniis multifidis apicibus fibrinam
incumbentibus. Spec. Radicum ante florescen-
tiam nutans. Corolla luteo alba. Cyrtone

herbarii cylindricis

4 japonicum A. foliis trifido-palmatis. Lacinis incisus obtusis. Thunb. jap.
p. 231 & S.V. pag 504

Habitat in Japonia 24

Caules teres glaber. Solca petiolata palm. Lobi laterales
bifidi medius trifidus, omnes obtusi, incisus dentati dentibus
rotundatis cum acuminis. Racemus brevis Thunb.

non vidi

5 napellus A. foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea serratis
L. V. *Fl. austr. Tab. 301.*

napellus venus Lobel. hist. 307.

Aconitum coeruleum f. *napellus* 1. *Bauh. pin. 103.*

Habitat in Helvetia, Bavaria, Gallia &

glabra. folia tripartita vel subternata lobis trifido
multifidis laciniis linearibus lanceolatis.

laciniata
tripartita multifida

linearibus lanceolatis, pedicellis simplicibus
corollis glabris

6 Anthora A. floribus pentagonis, foliorum laciniis lanceatis Lin. l. V
Faeg. fl. austr. tab. 302.

Anthora f. antithora Cam. epit. 837.

Aconitum salutiferum f. Anthora Baub. pin. 104.

Habitat in alpi bus, Pyrenaeis, Helvetiis, Taurinis, Allebrogis,
Tota pubescens villosa. Foliorum laciniis ^{linea exarata} angustissimis
Covolle lutea galea rostrata

Folius multipartiti:

galea rostrata

taurinum. Ac. foliis petiolatis digitato - quinquepartiti: segmentis oblongis
latefimbriatis trifido laciniatis: lacinus remote inciso-dentatis,
dentibus lanceolatis Wulfen coll. Flucq. 2. p. 112.

non videtur appellatum

10

uncinatum A floribus pentagynis, foliis multilobis, involucri galea
longius est longa. Gen. spec. pl. pag 750+

Habitat in Philadelpha 4

Folia triloba s. quinqueloba angulato-dentata, nud a. Cosei
conlci, singularis, apice galea uncinati recto et longius
quam ipse unguis galea, ~~sem~~ extenso lin.

non vidi

19 album A. floribus penta gynis, foliis glabris tripartitis: laciniis acute
incisi, petali supremi ungue lateribus longior. Hort. Kew. 2. p. 246
Aconitum Lycostonum orientale flore magno albo Tournef. corol.

30.
Aconitum orientale Mill. Dict. 2. n. 19
Habitat in oriente 2

non rudi

7 variegatum A. foliis pentagynis, foliorum laciniis semipartitis superne
latis. Len. l. V

Aconitum coeruleum parvum. Dod. pempt. 44. Dalech. hist. 1743.

Aconitum coeruleum minus f. *napellus minor* Bauh pin 103.

Habitat in Italia, Bohemia montibus &

~~Staber~~ folia tripartita laciniata pedunculi villosi
uti corolla. corolla coerulea

corollae villosi

pedicellis ramosis

8. *Cummaria* A. floribus subpentagonis, foliorum laciniis subpentagonis in
nervis incisi adatis her. t. p. 504 Freyqu. fl. austr.
7. 424

Aconitum lycoctonum tauricum Clus. hist. 2. p. 95.

Aconitum violaceum f. *napellus* 2. Bauh. pin. 103.

β. *Aconitum lycoctonum neubergense* Clus. hist. 2. p. 96

Aconitum purpureum f. *napellus* 3. Bauh. pin. 103.

γ. *Aconitum lycoctonum pidentbergense* Clus. hist. 2. p. 97.

Aconitum coraleo-purpureum, flore maximo f. *Napellus* 4.
Bauh. pin. 103.

Habitat in Sina, Taurero &

Caulis teres pubescens. Folia petiolata quae tripartita lobis
latera lobis profunde bifidis hinc inferora fere quinquepartita
sa trifida bifida laciniis lanceolatis attenuatis subin-
cisi. Racemus terminalis saepe ramosus. Corolla corolla
villosa calice apice mucronato elongato a napello etiam differt
varietates caule volubili nupt. de Dahl. ^{res unius spatuli} _{bus d. r. p.}

colleis villos

volubile
forte hujus
varietas
vel ~~vulgaris~~
napelli.

Cerneuum A. foliis petiolatis subtus pallidis digitato-quinquepartitis
segmentis divaricatis sempartitis; laciniis in eis dentatis denti-
bus linearis-lanceolatis Noelle De asen. no 4

non vidi

neomontanum A. foliis subpalmatis - quinquepartitis petiolatis; segmen-
tis latifolibus profunde incis. laciniatis: laciniis lato lac-
niolatis dentatis; Dentibus brevibus latiusculis acutis saepe
fl. Aups. 4. t. 301

nihil ignotum