

Achnophyllum

Col. magis superius. Cor. spectata. lacinia 7 loculari calyptrae
nata. loculis 1. spec. mis.

Tandori. 7 spec.

angulatum. Act. cordis angulatis foliis ovatis angustis truncatis

Parm. Desf. bot. pag. 41

Habitat in Penn 5.

arbor quod v. rogyalis. Solum alba ne petiolata. Folio
rad. catag. petiolata 7-11. oblonga acuminata integerrima
conica, pubes pulverulenta. Stipula spatuliformis
lanicolata amplexicaulis. Racemi terminales gemi
nae, pedalis erecti. Flores in capitula globosa sessiles
capitata in pagulo ca. 5-7. g. magnitudine ori gallinacei
Haec in plurimum 5. Stylis 5. 6. 7. Bacis 2 per
virescunt emiciformes 5 gona 5 loculata.

non. v. d. Sirophyllum Brownii hujus generis esse creditur

pedicellata A. corollis hemisphaericis, floribus pedicellatis umbellatis
in Pavia d. esp. bot. pag. 5

Habitat in Pavia

fruticosa scandens radicans, ramis. Folia alterna
longe petiolata. foliis 13. oblonga acuminata
integerrima glabra undulata. Petioli pappi
lanuginosi basi apiceque gemulati. Stipulae
spathiformes lanceolatae, amplexicaules, solitane
petiolo adnatae. Racemi terminales plures, sesqui-
pedales. flores umbellati radii 7-13 involucrum
squamosum, eductis.

Coridium A. laciniatum - corollis unis Par. No. 1. pag.

Habitat. in Per 3

Truncata scandens, radicans, ramosa: ramis apice foliis
si. Folia alterne: foliola petiolata 7. 11. oblonga
acuminata, ~~per~~ brevissima glabra, coriacea, sub
pedalis. Stipula spatulata amplexicauli petiolo
adnata: lacini terminales 2-3. pedales erecti. Flores
conglomerato capite diffinis distincti. Anthera 2
brevis globosa

acuminata At. corollis acuminatis, acumine ^{obliquo} ~~obliquo~~
Par. No. 1. pag. 6.

Habitativa Pen 5

Trilex radicans scandens, ramis: Folia
alterne longe petiolata. foliola 7-11. oblanceolata
acuminata integerrima, glabra coriacea.

Stipulae amplectivaules, lanceolatae.

Pracemi 2-3. 4. vel plures. flores in capit.
to globoso, squamis ovatis intertextis.

Pentandria Act. corollis unius obispo pentandria. Par.

Def. pag. 7.

4 albidu pen 5

*Triter unius ramis. Rami apice globosi. Folia
alterna, longe petiolata foliola 7-11. Oblonga
linearia, acuminate integerrima venosa pinnata
pubes ^{pellucida} pubescentia. Racemi terminalis longi
pini*