

Adelia

1. Bernardia A. foliis oblongis tomentosis serratis
2. Micinella A. foliis obovatis integerrimis
3. acidoton A. ramis flexuosis, spinis gemmatis

Lin. Tra genera continet omnia separando secundum Buch.

1. acidoton
2. adelia
3. reliqua

acuminata *Eldelia*

Habitat in Carolina herb. Arch.

Subarborescens. Rami oppositi. Gemmulae flonae ex foliorum alis protuberanti anai
lesples, aut in ramis nudis ex axilla inferiore ramorum aut in ramulis imbrica
to. Squama minuto suprema multo majoribus, rotundata, basi angustata. Rami
na numerosa, infra squama majores, breviora, filamenta breviuscula. Gem
mulae flonae ut in mare sita, Squama infima majores minores, steriles, inter
reliqua pedicellus 1-2. f 5 florus, flocculis terminalibus ternis, brevissime pe
dicellatis, pedicelli communis et partialis basi squamis deciduis. Calyx 2-4
phyllis, folioli squamis formibus, minores deciduis. Germe ovodeum, in stylen
cras sic. siulum depressum, subincurvum. Stigma obtusum. Trocha oblonga, immo
turi biloculari, maturis uniloculari
D.D. Bosph. ni fallor sub nomine *Plasera*

Leguminosa Aedeia

Habitat in Florida Richard 5

Rami oppositi, glabri. Peduncululi gemini, altior 3-4 floris.

habes

ponulosa Alderici

Habitat in Florida maritima Richard. 5

Rami oppositi

habes

Prumnella A. foliis obovatis integerrimis. Lin Am acad. 5. p. 411. t. 1. v
pug

Bernardia fruticosa, foliis subrotundis nitidis confertis, floribus
associatis Brown Jam. 361.

Habitat in Jamaica ^{et}
Rami ^{et} teretes ^{et} flexuosi alterni cortice ^{pubescente} punctato. Ramuli unguicula
ri in spinam sequentes. Folia petiolo sub spinis vel in ipsi
spinis conjugata integerrima glabra vix semiunguicularia sub
tus subvenosa supra nitida punctata. Pedunculi et eadem
gemmis 2-3. filiformes nudi, uniflori. Calyx pubescens

vel unicus folio brevioribus

Bernardia A. foliis oblongis tomentosis serratis. Kun S. V

Bernardia fruticosa, foliis tomentosis ovatis serratis alternis

Brown. Jam. 361.

Habitat in America

Rami teretes tomentosi. Folio petiolata sesqui pollicaria, ovato lanceolata
ta alterna utraque tomentosa, subtus canescentia, venosa acuta
serrata

non vidi

acidoton A. ramis flexuosis, spinis gemmaevis Lin. Am. acad 5. p. 411 +

P. V

acidoton frutescens aculeatum diffusum, ramulis gracilibus ter-
tibus, folioli confertis, flore unico alterove Brown. Jam. 355.

Habitat in Jamaica +
Rami cortice cinereo. Folia quae cuneiformia glabra, vix unquam ulone
superiora vix petiolata + gemmae saepe est eadem gemma tomentosa
spina rigida e gemma eadem, ramuli junctis. - Pinnuli
solitarii vel gemini e gemma folii filiformes pollicares
uniflori Capsula subrotunda

foliis cuneiformibus, pedunculis foliis
longioribus