

Adiantum

46. clavatum A. foliulis alternis: pennis lanceiformibus integerrimis alternis
unifloris
47. aculeatum A. pennis palmatis multifloris, stipite aculeato
48. venosum A. pennis alternis rhombico cheuci formibus obtusatis incis
fructificationibus interruptis
49. fraxiniforme A. foliulis alternis: pennis rhombicis incis utroque fructifi
cantibus
50. Ethiopianum A. pennis rotundatis integris crenulatis, stipite petiolulis capul
latis

microphyllum Adiantum fronde bipennata: folioli alternis, pennulis oblongis ^{obtusis}
natis infimis pennatifidis.

Adiantum nequiu ramosum minus, ramis fuculis et pennulis raris
minimis subtandis Roan. p. 1. p. 90. Tab. 13. fig. 2. fig. haud optima.

Adiantum microphyllum fronde bipennata: folioli oblongis obtusi
seratis infimis pennatifidis Sw. prodr. pag. 135.

Habitat in Montserrat in Nyca

Stipes infra fronde 5-6 pollucari, teres, glabri, lœvi, nitidi, fœfo.

perparafentes ^{pennata cum impari} 12 puz, fufum verfus
Frondis pithamda ^{12 puz.} Soliola petiolata alterna, ~~inferiora 6 vel~~
~~superiora 6 vel~~ ^{inferiora 6 vel} ~~superiora 6 vel~~ ^{inferiora 6 vel}

Stipula pauciora: inferiora 6. - Stipula verfus bipennata, extra
sem verfus uti Soliola fequentia pennata, fuprema indivifa fim
plicia, pennula alterno ^{ternis} unguiculari extrofum verfus capum
minores, infimo petiolata, fuperiores feptis extrema decurrenter. omnes
oblongo, glabra, crassa, arenia, enervae.

Fructificatio continuata pro Stendem Montrens

fuscatum A. fronde bipinnata: pinnis saepius bipartitis linearibus,
linea fructificationis unica lin. suppl. p. 447. L.V. p. 940
Filiola corniculata Gopulo Helena Plukn. mant. 83. tab. 350

Fig. 4.

Habitat ad Cap. b. p. et Insula Helena

Tronco terete bipedali lavi bipinnata, vel subtripinnata
+ filio tenui glaber

Soleola alterna alternatim pinnata, elongata. Pinna
pleraque bipartita, lineares angustissime unguiculari glabra
integerrima. Fructificationes in laciniis pinnarum
ad marginem ipsum superiorem, in cujus medio membra
na duo lacinae quarum fructificationem
emittit unicam in singula lacinia

fusca Conoptens fronde bipinnata, pinnis linearibus bipartitis

albicans Adiantum frondibus bipinnatis infimis tripartitis, pennulis falcato
oblongis incis; Inificationibus superioribus interruptis; ^{fructe} ~~fructe~~ ^{longissimo}
Adiantum lunulis albicanibus signatum Plum. fil. tab. 96.

Circa St. martham legit Dr. von Rohr. Ex herb. amicis: Dr. Lund
Styriae tertia puli, nigricantes, glaberrime nitidi.

Strom bipinnata: Pinna alterna, remota, infima duo ducta
penni gemini alterni pinnati, reliqua simpliciter pinnata
Pennula alterna petiolata, falcato-lanceolata, ^{tristata, glaberrima}
re convexior, ^{incis: capillis, inificationibus, margine superio}
~~exteriorum, retundata, denticulata, fructu striato~~
glaberrima, Inificationes magna, lunulata.

† terti retundata
tenuis frons denti
culata

Affinis Ad. striato Swartzii

28

4 glaucum Compositum foliis ovatis conarginatis pinnis axillaribus bipedibus
Habitat in India Orientali

Racemi teretes, verticilli, cortice cinereo. Tota petiolata opposita erecta
glaucis viridia venosa, bipetioluaria, pinnis ~~minutis~~ subacuta
subtus pinnis. Pedunculi axillares compositi, saepe plures. Flores
contigui horizontaliter patentes. Calyx unicolatus laciniis lanceo-
latis reflexis fundo pelopsemo. Semina oblonga, unguiculata

villosum Adiantum. frondibus bipinnatis: pinnis rhombeis: est anticae extus, que
fructificantibus, ^{subcontingit} sterilibus femulatis, stipite villosis.

Adiantum nigrum maximum non ramosum, pinnis crebris majori-
bus crispis Loan. hist. 1. pag. 93. t. 5. s. fig. 1.

Adiantum villosum frondibus bipinnatis, pinnis rhombeis anticae
extusque fructificantibus, stipite villosis Len. l. V. pag. 940.

Habitat in Montserrat Dr. Ryan.

Stipes infra frondes 5. 6. pollicares; triquetris, niger, e vellis ferrugineis

Tomentosus, profertur inter foliola.

Fronds pedalis et ultra, bipinnata, 8 juga abique in pari, foliolum
unicum terminale. Foliola petiolata, alterna, remota, 18 juga

~~unicum~~ pennula unica terminalis, fuscum versus superius paucio-
ra: pennula petiolata, alterna, oblonga, intermedia pollicata, ex-

terior et interior minor, intus versus stipitem transversa,
ant. extus et intus recta, anticae oblique fructificantis anticae
oblique, steriles rotundata femulata; infimo duo in foliolo
terminali ovato-rhombeo, attenuata, obtusa majori, aliter
latera besporia inaequali; omnes glabra, nervis obli-
qua radiata.

Fructificationes margini exteriori interseptis, apicem versus:
et anticae continuatae

(Ad canthum ramosum etc. Plum. fol. tab. 97. quod huius refert Sw. in obs. Botan.
pag. 405 mihi videtur Divesim a Sloani.

trunculatum Adiantum fronde tetraphyllo: - foliis pennatis, pennis triangulato-
lanceolatis glabris undique fructificiis antibus, fructificiis aconibus interruptis
Habitat in insula Trinitatis ad Ryan.

Surculi repentes, varietis, caespitici feli emporitici, undique vestiti pilis fuscis.

Stipes erectus, pedalis, tetragonus, niger nitidus, superne uti rachidei folio

lorum fuscis-sillofus.

Frons: foliola quatuor, ^{frutheos} alterna, unicum terminale reliquis longius,

pinnis glabris, pennata cum pinnis 10-13 pinnis: penna ^{ula} alterna
pediolata, ^{animum terminale} sesqui pollicares, basi unguem lata, in foliolo terminali
longiora et latera profertim inferum; extus superius versus sensum
omnia distincta, triangularia, lanceolata, attenuata, acuta, latera
superiora latera, nervosa-striata.

fructificationes ad ~~omnes~~ margines omnes pinnae laterum, lineares,
interruptae

acuminatum Adiantum fronde bipinnata: pinnis foliatis lanceolatis
terminali elongata, fructificationibus superioribus, stipite
^{pubescentibus} ~~semiterenti~~ pubescente.

Habitat in Montserrat in Pyon.

Stipes infra frondes saepe pedalis, niger, nitidus; basi fulvo
tomentosus; sursum nudus sculeus, superne et inter frondes
uti rachides foliolorum ferrugineo-velloso, minime scaber,
albero latere folio profundo.

Frondis decomposita. Foliola 5-6 inferna opposita, reliqua alter
na, unicum terminale: ^{brevissima} pinnula petiolata, omnia distincta
to, circiter 47. alterna, lanceolata-foliata, superne
basi transversa, acutiuscula striata, glabra, inter media
les qui pollicares; superne et inferne breviores, inferna ^{terminalis brevioris} ~~terminalis brevioris~~ ~~terminalis brevioris~~ ~~terminalis brevioris~~
lati. ^{terminalis brevioris} ~~terminalis brevioris~~ ~~terminalis brevioris~~ ~~terminalis brevioris~~
se triangulari. Stipiter extensor et extus inferne pinnu
lato

alternatio incisa
caeduntur apice dentibus
lati.

Fructificationes superne, interrupta

(Semule Plum. fol. tab. 13. sed foliola non opposita nec
pinnulae cohaerentes, a striat. Swartzii differunt pinnis lan
ceolatis, stipite non aperto

no 319

no 5 in Pyon

Difolorum Adiantum frondibus pennatis: pennis alternis ovato-lanceolatis
undique fructificantibus, stipite villosis.

Stipes niger, nitidus, superne versus frondes triangulatus, inter frondes flexuosus, pulverulento-villosus, altero latere longitudinaliter canali-
tatis.

Strobus pennata cum impari, novemjuga. Foliola petiolata, altera remota, bipollicaria, extus sum minora, ovato-lanceolata, acuta, striata e nervis tri vel semel dichotomis, glabra, supra nitida, subtus pallidiora disco ^{gladio} inflexa, basi sursum subgibbosa, ad petiolum acuta, inferne recedens, superne convexiora.

Fructificatio ad conis sublateris nuda pennarum undique conjunctis basi excepto

76

~~Simarouba Quaspa floribus dioicis, foliis abrupte pennatis: foliolis alternis subpetio-
latis, petiolo nudo, floribus paniculatis dioicis~~

~~Quaspa Simarouba: floribus monoicis, foliis abrupte pennatis: foliolis al-
ternis subpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis Lin. S. V. pag
401.~~

~~Habitat in Montserrat & Ryan.~~

~~Rami teretes, glabri, et caespitibus digiti minimi.~~

~~Folia versus apices ramorum, alterna, bipedalia, pennata cum pani-
civides & jugata. Foliola petiolata, alterna, unicum terminale, bif-
ida in polliciana, interiora minoria, oblonga, parum acuminata, obtusa,
^{late acuta,} ~~conacuta,~~ integerrima, utrinque glabra, laevia, supra nitida, nervosa
secundum nervos subtilissime lineata, subtus venosa.~~

~~Petiolus tres.~~

~~Paniculatus terminali, sesquipedalis, crassa, patens.~~

~~Pedunculus per perispermium, inferne tres, superne uti pedunculi parvales
compressi: pedunculi parvales distantes: pedicelli ultimi breves
subumbellati. Foliolum petiolatum, simplex, vix unguiculare, oblon-
gum, obtusum, sub hazulo pedunculo parviali~~

~~flor. masculi in eadem panicula cum faemineis nunquam, quodquoque asperit
In Ryan qui plantam in le vevam in loco natali observavit~~

tetraphyllum Adiantum folioli quaternis alternis pennatis: pinnis lanceolato tra-
peris obtusis, antica et extus, fructificantibus, stipite tetragono.

Habitat in Montserrat Dr. Ryan.

Stipites plures, nigro-purpurei, tetragoni, nitidi, inferne glabri, superne
vellosi.

Stipitis bipennata. Foliola quatuor cum sex menalis, alterna, cum sex
4-5-paga: pinnulo petiolato, alterno, intermedio vix pollicis aesi,
basi transversa, apice obtuso obliquo, extus et intus recto, extimi
et interni triangulari; omnes glabri, striato, ad petiolum acuto
distincto: steriles apice et extus anticae? per inaequaliter serrata.

Petioles vellosi

Fructificationes superne et anticae, interruptae

tenuum Adiantum fronde supra decompota: pennulis alternis rhomboideo-
niformibus obtusatis incis; fructificationibus interruptis Sw. prodr. pag. 135.
Adiantum ramosius pediculis lucidis et nigri Plum in fel. pag. 20 tab

95.
Habitat in Montserrat in Hyon.
Stipes teretiusculus, supra linea exaratus, fusco nigricans, nitidus to-
ris, glaber, infra frondes pedalis

foliola petiolata, alterna, cincta 10 cum terminali. inferiora bipun-
nata; pinnis inferioribus ternatis; quinque superiora pennata, pin-
nula omnes basi acuta, superne incisa, laciniis subdentatis, subtilissi-
me striata, pollicares, interiores minores.

Petioles filiformes, flexuosi, ultimi capillares:
(variet pennulis bipollicaribus)

Traperiforme A. frondibus supra decompositis: foliis alternis
pennis rhombeis incisis utraque fructificantibus.
Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis magnis traperiis
in modum figuratis Moan. herb. 1. p. 90. t. 9. 59
Adiantum fronde alternatim supra decomposita: foliis traperi-
formibus acuminatis, inciso-venatis Hort. Cliff. 4734
Habitat in America.

non vidi

capillus venens frondibus decompositis: foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. Fœque. mif. el. 2.

N. 7.

Adiantum Cam. epist. 924.

Adiantum foliis cordati Bank. pin 356

Habitat in Europa australi, Oriente

Stipes et frons cum stipite pedalis Stipes tenuis niger nitidus
glaber. Foliola petiolata alterna remota, pennata pinnis in
ferioribus bifidis binatis vel ternatis, cuneatis striatis glabris
apice tri vel quadri lobo incisè inaequaliter non sa lobulo sa
gulo apice fructifera veniformi

truncatam a frondibus decomplicatis: folioli pennatis: pennis alternis
cuneatis subfalcatis truncatis intergemmis Burm. ind. 253.
Tab. 66 fig. 4

Habitat in India orientali

Stipes glaber sulcatus angulosus. Coliola alterna transve-
lana, angulo acutior fronsa acicuta, margine inferiori
concava superiori gibber, media truncata, angulis superiori-
bus spinulosis, glaberrima nervo simplici Burm.

Anatum a fronde bipinnata, pinnulis rigidis falcato-oratis striatis, fructificationibus superioribus interruptis, stipite tereti apice 4-5-ped.

109135.

Habitat in Jamaica.

Stipis scaber niger folia alterna petiolata palmata folio
pinna alterna glabra, unguiculari fimbriata superne serrulata

pelosum A. frondibus bipinnatis, pinnis lanceolatis subfalcatis superiore
et et extus fructificationibus interruptis ^{stipit} villosis

Habitat in Cambois

Similis striato at stipitis non fabri sed molliter villosa, pinnis
longioribus, fructificationibus orbiculatis ^{interruptis} non tantum superiore sed et
ad marginem epineis et anticae posticae

nomen triviale haud optimum

Erigeron A. frondibus bipinnatis: folioli infimis bipartitis: pennis luncis
4is superne multifloris

ad eandem ramiferis, ramis simplicibus longis alternis reflexis
bus, foliis traperei formibus angustioribus Brown. pan. 87.

Habitat in America meridionali

Stempe a tropis peruenit glaber ^{stare} nitidus. foliolo petiolo
ta alterna. penna alterna breviter ^{stare} petiolata unguiculata
glabra ^{stare} pinnata in postica integerrima superne dentata
fructi fissura ^{stare} bis pinnis ^{stare} foveolam pro singula fructifi
catione

pulverulentum A. frondibus bipennatis: pinnis ovalibus antice tri-
catis unifloris, stipite hirsuto.

Adiantum nigrum ramosum pulverulentum et falcatum Plum. amer.
32. T. 47. fil. T. 55.

Adiantum mac caule squamoso et pediculo pulverulento Pedw. fil. 84.
T. 9. fig. 7.

Habitat in America.

Stipes nigricans vili farinae ferrugineo testus. Orons sequi
pedalis. Soliola petiolata alterna per pana remota.
rachis ut stipes pilosa ^{parte m. h. m. d. a.} penna ^{obliqua} ^{res ples} alterna glabra basi
intimo ~~in~~ ~~noes~~ fursum transversa apice ~~conserta~~ serrata postice integerrima
ante serratas unguiculares alterno ~~fructificatio~~
incepto in infimis pennis apicem non attingenti

vellosum A. Frondibus biennoti, pinnis rhombis antice extusque fimbriatis,
caulis, stipite velloso Lin. Mant. 505. L.V. p. 940

Adiantum ramosum foliis Traperis dentatis Plum. amer. 31. 4-46.
fol. p. 80. 7. 97.

Adiantum negundum maximum non ramosum, pinnis crebris majoribus
Erasmi Sloan. hist. 1. p. 43. 4. 55. fig. 1.

~~Adiantum Platanifolium Tab. 253. fig. 1.~~

Habitat in Tamaica

Stipes nigricans uti petioli adspicis vellis copiosius densis. Foliole
petiolata alterna remotae. Pinnae pinnules alternae per intermedia
pellebantur et ultra, intima et extrema minores rhombae lanceo
lati striatis versus petiolum transverse postica versus basin inter
germinis, sursum et venis serrata. Fructificationi ad marginem
nem utriusque posticae basin non attingenti primum distincta
demum subconcreta

falcatum A. Frondibus decompositis triangulari ensiformi pinnis falcatis
lanceolatis, stipite villosis fructificationibus laciniosis intercapitis
Habitat in America Dr. Ehrenberg

Stipis nigro purpureo scens villosus. Folia petiolata alterna
Panno inferiori minoribus unguiculatis subtropiciis, obtuso reticulata
superioribus sessilibus pollicariis fuscis majoribus grossis in foliolo
terminali subter convexo, basi truncata fuscis transverse, acuta
retrosum & nervis simulata. fructificationes lanata.

multiflora St. frondibus bipinnatis: pinnis trapezatis superne incisae fructificatione ^{obtusis}
reniformibus ^{inferius ternatis} stipite glabro.

Habitat in Capana an v. Potos

Stipes niger nitidus glaber. Pinna alterna glabra pinnato petiolata,
inferius ternata pinnulis lateralibus rhomboideo subrotundis ^{terminalibus} ~~subrotundis~~ ^{caudatis}
rhomboidibus reliqui trapezii, collucisco fere semper intese stentel
tenues, sime serrulata, fructificatione reniformi in singulis lacinia

no

crispum A. frondibus bipinnatis pennis pinnatifidis involutis
e. l. ex. t. spec.

specimen imperfectum affine *Pteris*

Glabellulatum A frondibus decompositis: pennis alternis rhombis-
rotundatis multifloris: stipitibus supra pubescentibus in sp. pl.

~~Ray~~ 58 +

ad unum chinense per elegans ramosum, foliis glabelli forme
cum rubedine persuso Plukin alm. 11. 7. 4. p. 3.

Habitat in China.

Apex rami et pedicelli supra canaliculati et ferrugineo villosi,
statura arborescens.

pallidum A. ~~frondibus~~ frondibus bipinnatis, pinnis lunulato laciniosis superne et
antice fructificantibus, fructificationibus continuatis

Adiantum quianense fronde pinnata: pinnis oppositis: pinnulis
reniformibus Aubl. fl. Gu. pag. 963. Tab. 365.

Habitat in America meridionali

Stipes pallide flavescens. Folioleae alta infima subopposita superne
et alia alterna spollucana. Pinnis subpetiolata alterna postice
lunulato antice convexo apice rotundato basi transverso.
Vaguetulans, lina pallide viridis linea fructificante integra
pinnam intra intra marginem. Terminalis subhastata

Cestrop ^{lyllum}
A. frondibus bipinnatis pinnis pennatifidis laciniis obtusis oppositis
Habitat in India Orientali

Stipiti palmari near Sabnūkului. foliola inferiora opposita superiora
alterna. Pinnis oblongo ^{inferiores vix} subpinnatis ^{superiora} pinnulis ^{intermediis} oblongis obtu-
sis basi angustatis nervis glabris

Dryopteris campestris Rumph. amb. 6. p. 77. t. 34. fig. 2.

Aerostichum tenue frondibus bipinnatis, pinnulis oblongis pinnatis
fidis, laciniis obovatis apice crenatis. Metz & Hoffm. 6. p. 39

fragrans A. Frondibus bipinnatis: pinnis ovatis sublobatis obtu-
si subtus nervis Lin. Suppl. p. 447. S.V. p. 940.

Polypodium fragrans Frondibus bipinnatis: pinnis ovatis sub-
lobatis obtusis subtus nervis margine reflexis, fructificationibus
nervis marginalibus Lin. Mant. 3074.

Habitat in Gallia Australi et Madaga.

Statua Polyp. fragilis. Scapus a tropis purpureo palmari basi
paleis helvolis. Tronco palmari bipinnata pinnis oppositis
sessilibus apice ultimo confluentibus; ovatis infimo crenato
subpinnatifido, margine reflexo. fructificationis
marginem totum occupantibus, approximatis distinctis.

Coffronum A. frondibus bipinnatis: pennis ovatis inaequalibus, dentibus
subtus paleaceis Len. Suppl. pag. 447. L.V. p. 940

Polypodium coffronum: frondibus bipinnatis: pennis ovatis
inaequalibus denticulatis, subtus paleaceis margine reflexis; fructu
suspensis marginalibus Len. Mant. p. 3074

Habitat ad Cap. b. frei

Stipes nigrescens inferne glabra totus fectus superne
uti frondes subtus paleis ferrugineis fructus Eros peritomeas
foliola ^{alternata} linearia ^{laevia} pinnis inferioribus dissectis superioribus
res decurrentes apice bis trifida fructu fructu
fragrantis

pitensis A. Fronds suprae decomposita: pinnis ovatis integris crenu-
latis, glaucescentibus. Lin. Mant. 130. & S. V. p. 940

Habitat ad Cap. b. p. ^{nigro} ^{nitzdui supra fuleo longitudinali}
Liquor fructu mous purpureo. Pinnis ovatis, integris, crenula-
tis. Margo hic subtus vixtus squamulis albis totidem
quod crenula, fructificationes operentes hic
foliola opposita pinnula ^{trici} infima in foliis infimis
ternata reliqua simpliciter ovata lanceolata, vix polli-
semipollicares, petiolato alterna

ovato lanceolata

Species Pitensis

microphyllum A fronde bipinnata: folioli alternis oblongis obtusis
tis inferioribus pinnatifidis. Sw. prod. pag. 135

Adiantum nigrum ramifera, ramulis

Roan h. 1. p. 90.

q. 13. fig. 2.

Habitat in Jamaica, Inf St. Crucis Dom West

Stipites cum fronde pedales tenues basi villosi ^{state glabr}
nudi atropurpurei. Folia petiolata alterna, bipinnata, ^{superne glabri} ^{loves}
oblonga sessilia. foliola interiora petiolata pinnatifida exteriora sessilia
oblonga integra, ultima confluentia lineae quadriflorae marginem usque
tegeno. Rachis foliorum villosa filiformis

Trichomanes

A. frondibus bipinnatis pinnis inferioribus pinnatifidis laciniis pinnis que
exterioribus cuneatis apice unifloris

Habitat in Insula Francia Commenon Thomis

Stipiti pallide flavo glaber. foliola petiolo alterna suprema simplicia
simplicia pinnatifida summa cuneiformia decurrentia inferiora
v. pinnata, pinnis inferioribus pinnatifidis unguiculares sequentia
margine exteriori incisiva ultima indivisa apice foliola serbata
pinnis superioribus decurrentibus crispulata pallide viride

Chusanum. A. frondibus decompositis: pennis alternis pennatifidis: lobis inaequalibus. Len. Spec. pl. pag. 155. 84

Habitat in China
Frons lanceolata glabra. Soliola alterna, lanceolata, alternatim pennata. Pinna alternatim pennatifida, lobis linearibus cuneiformibus, incisuris

non vidi

arborescens A. foliis bipinnatis, pinnis lanceolatis attenuatis basi pinnatifidis
caerni serratis serraturis, floribus
extrosum incisus laciniis vel quadrifloris

tilix adanthoides arborescens minor Plumf. tab. 7.

Habitat in Domingo. foliola sequipedalia

Rachis glaber floriferis, funno alterno infima subpeltata
inquectis se sepleo superiori semidecurrenti superne ad pinnam
ante cedentem, inferiori apolluato extrosum versus sensim mi
noris basi pinnatifidis est superne incisus apice serratis laciniis
serratis serraturis puncto subnudo fructificante.

fragile A. fronde supra decomposita, superne bipinnata; pinnis obovatis cuneatis integris, fructificationibus interruptis Sw. prod. pag. 135.
Habitat in Jamaica.

non red.

clavatum a. frondibus supra dictis compositis: foliis alternis: pennis
cuneiformibus integerrimis alternis unis floris

Filicula pennulis obtusi Plum. fol. 101. fig. 13.

Adiantum minus, foliis in summitate retusi Plum. am. 34.

t. 50. fig. 13.

Adiantum clavus simplicibus Pet. fol. 95. t. 14. fig. 7.

Habitat in Dominica.

non vidi.

aculeatum a frondibus superdecemcostis: pennis palmatis multi-
floris; stipite aculeato

Adiantum frutescens pinosum et repens Plum. fol. 77. 4. 94.

Adiantum repens pinosum Pet. fol. 70. t. 11. fig. 6.

Habitat in Jamaica, Dominica. &

Stipes laetidus pallide flavescens glaber, a folio ad folium
flexus; aculeatus aculei sparsi frequentes nitidi fusio ferrugi-
nei. Fronds tripinnata inferiores per parva remota superio-
ra determinate aequali distantes. rachis flexuosa aculeata
pinnis triangulari obovato sessile alterni duo ultimi
subconfluentes apice truncati quadridentata

Venenum A. fronde supradico mposita pennulis alternis rhombico-cuneiformi-
bus obtusatis incisè fructificationibus interruptis Sw. prodr. pag. 135.
Adiantum ramosissimum pediculis lucidis Plukh . Tab. 254. fig. 1.

Habitat in Hispania . . . actus

Stipes niger nitidus glaber. Folca alterna foliola inferiora presen-
ta infrequentia triphylla ultima simplicia foliola venosa fructi-
ficatio in pinnula latencia folia penna

trapeziforme A. frondibus supra decompisitis: folioli albescenti: pinnis
rhombicis in se utraque fructificantes hinc S. V. p. 9. 40.

non vidi

Ethiopianum A. frondibus supra decompertis: pinnis rotundatis ante
qui crenulatis fructe, petiolulis capellantibus

Ad eandem fructuosum *Ethiopianum*, pinnulis amplis subrotundis
superne dentatis media pinnarum parte petiolis infidentibus
Pluken. alm. 10. v. 253. fig. 2.

Habitat ad Cap-b-jei Arabia ^{inter folia flexuosa}
Stipes tenuis laxis nitidus. Orons palmari foliosa alterna
remota inferiora bipinnata superiora pinnata ultima simplicia
pinna petiolata alterna basi acuta ap. semunquicilares
apice innato trif. s. que loba tenuis pme nervosa. petioli capil
lari.
aliam e cap-b-jei pinnis integerrimis