

Adiantum

* fronde simplicis

1. reniforme A. frondibus reniformibus stipitatis multifloris
2. philippense A. frondibus reniformibus alternis petiolatis lobatis multifloris
3. repens A. frondibus trapeziformibus, cordatis pennatifidis: laciniis lanceolatis apice serratis floriferis: infimis incis.

x x fronde composita triphylla

4. ~~trifoliatum~~ ^{phyllum} A. fronde triphylla: folioliis s. plebis lanceolatis pennatifidis crenatis
5. trifoliatum A. fronde triphylla: folioliis pennatis: pinnis trapezicis serratis alternis
6. frictum A. fronde triphylla: folioliis pinnatis: pinnis suboppositis triangularibus integris, fructificationibus superioribus continuatis
7. radiatum A. fronde digitata folioliis pinnatis: pinnis unifloris
8. pedatum A. ^{x x x} fronde pedata folioliis pinnatis: pinnis acutis gibbis incis. fructificationibus

9. *pedatum* pubescens A. folioli pennatis: pennis oblongis striatis, fructificationibus planis
 nunc subrotundis extrossura etantia.
10. *rotundifolium* A. folioli pennatis: pennis subrotundis serrulatis rachidibus villosi
11. *fusum* A. folioli pennatis: pennis rhombo-rotundatis subquadri flori
 xvxv frondibus pennatis
12. *cuneatum* A. folioli oppositi subpennatis: pennis cuneiformibus retusis alter-
 nis-
13. *pumilum* A. pennis alternis subrotundis serrulatis, summa majuscula tra-
 perodea, fructificationibus interruptis, stipite capillari
14. *lunulatum* A. pennis alternis petiolatis lunulatis striatis fructificationibus sub-
 interruptis.
15. *serrulatum* A. pennis obtusis obovatis striatis unifloris
16. *caudatum* A. pennis faliatis, ^{incispi} frondibus apice caudatis
17. *lanicum* A. pennis oppositi oblongis: terminali triangulari hastato
18. *hastatum* A. pennis hastatis trilobis rectis
19. *deltoidicum* A. pennis alternis deltoidibus obtusis, summa triangulari, fructi-
 ficationibus superne etantia continuatis.
20. *trilobum* A. pennis tripartitis obtusis: incispi multifloris, caule repente
21. *macrophyllum* A. pennis oppositi rhomboideis acutis, una majori, inferioribus
 hastatis reflexis, fructificationibus alter-

Adiantum

Habitat Cayenne herb. Desfont

Species in quibus, geminae tomentosa, etate nudae: frons bipinnata: filicula alterna, Defantia, circ. Ser 12.

habes

Alouanthum

Plum. felic. Tab. 15. fig. 2.

Habitat

herb. Desfont.

Stipes niger, nitidus, teres. Frons bipinnata: pennula obovata, unguis longis; petiolata
pallida vides, glabra, subtrepida: lacinis emarginatis, multifidationes reniformis; mem-
brana intus versus se aperens

Adiantum

Plin. filic. tab. 4.

Habitat in Comenca herb. mus.

Stipes villosus. Frons bipinnata: foliola et pinnae alternae, inferiores bipin-
nae. Pinnulae 1-2 3 flori.

habes

Dianthum

Habitat in Philippinis herb. Thes.

Stipites filiformes, nigro, glabri, spithamoi. Frons pennata: pinna petiolata
alterno, unguiculari, subtriangulari, margine exteriore fructificantes, convexo,
basi ovato, obtus, terminalis obcordata. Omnes fructificationes indurata

Adiantum
Adiantum frondibus bipinnatis; pinnulis ovatis integris terminalibus elongatis
majoribus ovato-lanceolatis subhastatisve, stipite gl'ovi
Sten viridis Forsk: Deser: pag. 186.

Stipes 5 vel 6 pollicaris, fusco-femiteris, fusco-purpureo-feno, corosimus,
nitidus; basi subvillosus; superne glaber.

Trons pedalis vel parum ultra, inferne bipinnata, superne pinnata, circa
terdecim puga. Stiola ^{parte} alterna, inferiora pinnolata, superiora sei
filia; bipollicaria vel parum ultra, fusca ^{suprema} versus sensim ^{minora}
inferiora pinnata ^{foliola} pinnulis 6-10 - superiora ternata, ^{ultima} ^{sim}
plicia angustiora ^{foliola} hastata, interdum fusca ^{auriculo} auriculo ^{aucta}
vel ultima 4-5: indivisa. ^{lateralis} ^{inter} ^{alternis} ^{sub} ^{stipite} ⁱⁿ ^{unguibus}
lance ^{exterior} ^{parum} ^{minoribus} ^{terminalis} ^{ovata} ^{elongata} ^{polli-}
cari, indivisa, vel hastata; auriculis in pinnulas ^{tandem} ^{ab} ^{eunt} ^{tibus}.

omnes glabra, oblique striata ^{tenues} ^{sive} ^{multi-} ^{striata}, obtusa.
Fructificationes marginem totum ^{marginis} ^{occupantis} ^{sub} ^{longis} ^{ant} ^{evolutionem} ^{squamis}
lis albidis ^{cooperiti}

(Fructificatione simili Pteride, ^{hal} ^{tot} ^{vero} ^{habitus} ^{Adiantum}. Maxime
afferis Adiantum pteroide differt foliis bipinnatis nec supra
decompositis: pinnulis non crenulatis

63 Callifia

~~Asquipedalis simpliciflorus
Caule erecto tereti fruticulis caespitibus pennis columbina
Folia ^{basifolia} pedicellata alterna, basi tripolliciana, elliptica nervis
utrinque acuta parum attenuata integerrima, retis rari-
bus propositum margine adpersa nervosa.
Petiolum unguiculatum e vagina supra campanulata. Cassa
caule amplosse ciliata.
Pedunculis terminalibus erectis quadrupollicianis pub-
erulis apice bifidis, rami tripolliciani et ultra e
caulis pedicellorum dentatis pilosi. Pedicelli alter
ni unguiculati sub flore caespitibus uniflori. bractea
triphyllosa. flores ante floriferentiam nutantes calyce
anthera didyma~~

1845 Ryan Fuchsia

caudatum Adiantum ^{Adiantum} frondibus pennatis falcatis apice caudatis Lin.
P. V. pag. 939.

Adiantum incisum; fronde pennata; pinnis sessilibus, alternis
femioratis, superioribus incisis, inferioribus rectis, integris. ~~Dorsis~~ Desf.
pag. 107. ~~de 14.~~

philippense A. frondibus reniformibus simplicibus alternis petiolati
lobatis multiflori

Acanthum philippense, foliis rotundo calumato Petgar. P. Y. 4

fig. 4.

Habitat in Philippinis

hexagonum A.

Stylus folius hexagonis Plum fil. Tab 37.

Habitat in America herb Tournef.

Stylus sempiternus, erectus, glabrus. Frons bipinnata: pinnae alternae, cuneatae
acuminatae, glabrae unguiculatae. Frons fructu linearis utraque ad mar-
ginem. Membrana intus vespa sepe aperiens
an Lindb.?

Carolus Beckman

nubefiens A. frondibus pedatis foliis pennatis pennis oblongis striatis, fructificationibus
plurimis subrotundis extrosum et antica

Habitat in Insulis maris pacifici. Tabernicus

Stipes niger nitidus glaber altero latere canaliculato, altero convexo.

Rachides villosi. penna altero brevissime petiolato, semper unguiculari
basi transverse apice rotundata superne serrulata. fructificationes
parvae plures

repens
~~palustris~~ A. frondibus simplicibus trapeziformibus cordatis pinna-
tis: laciniis lanceolatis apice serratis. floriferis: inferis unis
Linn. Suppl. pag. 446. * L. V. pag. 939

Habitat in Isle de France

Caulis longi repentes veli squamis lanceolatis ferrugineis imbricatis
superius erecti palmatis vel pithamoi. Distantes altero latere con-
seti, paleacei. Locus bi s. tripollicaris ovata, basi cordata, glaberrima
nuda junnaetifida infero profundius dursa laciniis lanceolata
infero sesquipollicari sursum sensim minor infimo postice
subpinnatifida antice dentata, insequentis dentato serrata. Pumi-
tam fructificans in sigulo dente

triphyllum & fronsa triphylla: foliolis sessilibus lanceolatis perinatis crenatis

Smith. Pl. in. 3. p. 74. tab. 74.

Althæanthum triphyllum La Mart. Encycl. 41.

Habitat in agro Bonanenfi 4

Ripes siliiformis glaber nitidus ^{lavis atropurpureus: Folia tria in apice}
^{sessilibus} ^{polliciana septimale nervum magis}
oblonga lanceolato-oblonga ^{inæsa,} glabra ^{venosa,} laciniis ^{obtusis bif.}
tridentatis. Nervus niger nitidus ^{vepsis} medium folii evanescent.
fructificationes solitaria in apicibus crenatarum, squamula squama
tecta, subrotunda.

Trifoliatum

radicans a-flora triphylla folioli pennatis, pinnis trapezidis simulatis
alternis

Habitat in india orientali

Stipes glaber subtetragonus perfrumescens apice triphyllus. Foliola
palmata lateralibus minoribus. Pinnis alternis subpetiolatis apice
obtusatis sursum simulatis, unguiculatis

Fructum a fronde bipinnata, pinnis tetragonis fastigiatis erectis, pinnu-
lis alternis ~~reticulatis~~ lunatis integris; fructificationibus superioribus
continuatis Sw. prod. pag. 135.

Habitat in Jamaica.

Super purpurei glabra, apice folia triphylla. Frondes spithamei
rasis communis tetragona, pinnulis suboppositis sessilibus postice set
ad rachem recte apice rotundata semper unguiculatae artic. fructifera
fructificatione

fronde triphylla foliis pinnatis: pinnis suboppositis
fructificationibus continuatis superioribus

radicum A. Gonda digitata foliolis pennatis: pennis unifloris

L. V
Adiantum ramosum radiatum Plum. amer. 33. t. 49.

Conchitis radicata Polytrochi folia Plum. fol. 53. t. 100

Adiantum alis radiatis Pol. fol. 93. t. 114. fig. 3.

Adiantum jamaicense, pennulis auriculatis ramosum quibus
ramulis ex eodem caule minuto expansi Pluken. alm
11. t. 253. fig. 3.

Habitat in Jamaica, Domingo.

Strep. atropurpureus glaber teretis. Coris apice foliolis
7. S. palmaribus pennatis. penna fere plicata alterna versus
apicem minuto subhombro lanceolato semunquivalaris

pedatum frondibus pedatis. foliolis pennatis: pennis anticis gibbis in
cisis fructificantibus

Adiantum fruticosum brasiliense Bauh. prodr. 150. pin. 355.

Adiantum americanum Corn. cand. 7. t. 6.

Adiantum fruticosum americanum, summi ramulis reflexis et in
obem expansis Plukh. alm. 10. t. 124. fig. 2. Monf. hist. s. p. 508. f. 14
tab. 5. fig. 12.

Habitat in Canada, Virginia &

Stirps atropurpureus laevi nitidus glaber. Trons bifida
foliola interna longiora. Pinnis petiolato alternis serrulatis
angustulatis postice transverse versus petiolum truncata
super convexa subnatis multifloris pallide virides

foliis ovatis. Grondibus pedatis pennatis pinnis subtundis serrulatis raris
bus villosis
Habitat in Arabia

Stipis atropurpureis foliis formis glaber. pinnis superioribus oblongis termi-
nalis reliquis similis nec triloba utra fuso, semper unguiculata

fusum A. frondibus pedatis: foliis pennatis pennis rhombico rotundatis
subquadrisfloris Reti. obj. 2. pag. 20. Tab. 4

Habitat in China

Stipes compressus, cinereus, teris: pennula antequam fructificante
germino, propter terminalem folii subtrilobam.

in fol. 6. Reti. hunc ad Adiantum flabellatum amandat
nisi ignote

cuneatum A frondibus pennatis: foliis oppositis subpennatis: pinnis cuneiformibus
reclatis alternis Koss. prod. p. 84.
Habitat in Nova Zelandia.

non vidi.

Numelium a fronde pennata, stipite capillari, pinnis alternis subrotundis
pinnatis, summa manuscula trapezoidica, fructificationibus interruptis
Sw. prodr. pag. 34.

Filix parva O. Luch. alm. t. 251. 4.

Oedanthum L. Brown. am. 87.

Habitat in Jamaica.

Stipes digitalis vel sesqui pollicaris. foliola striata basi acuta integer
nna superne serrulata

lunulatum A. fronde pennata, pennis alternis petiolatis. Lunulatis striatis

~~Adanthum~~ lunulatum

• Avenha Rheed. Mal. 12. p. 72. tab. 40.

capellani malabarica non ramosa, folio obtusa, dentato Petri
apocroph. tab. 94. fig. 10

Adanthum lunulatum fronde simplici, pennis alternis petio-
latis lunulatis striatis, margine quinque fido multifloro
Burm. ind. pag. 234

Pteri lunulata fronde pennata. pennis alternis petiolatis
lunulatis striatis Petri obj. 2. pag. 20. tab. 4.

Habitat in Malabar

Super niger nitidus ^{filiformis} penna petiolata remota, postica recta,
intermedia ^{velle aut. lerpum. minores} antica apice utraque rotundata versus apicem
oblique truncata antica rotundata subin cisa linea fructifi-
canti subinterrupta

semelatum A. Frondibus pennatis: pinnis obtusis obovatis serratis uni-

flori

Incomanus major negrom, pennis Carteri dentatis Trajeterii

Figura Sloan hist. 17. p. 35. fig. 2.

Habitat in Jamaica.

Caudatum A. frondibus pennatis falcatis apice caudatis Len. Mant. p 308.
S-V. p. 939.

Adiantum caule reflexo: pennulis alternis striatis in summo coe-
natis et frugiferis Burm. zeapl. P. 1. 5. fig. 1.

Habitat in India orientali et Arabia
^{in Sumatra}

Stipites filiformes nigri uti foliola vellopi. Funno ses files
alterna vix unguiculares inferne et superne unonori versus
apicem minutis remotis rachis bi-squis inciso lobis
fructificantibus rachis infra apicem aphyllis apice ipso
radice ante

Adiantum ^{in summa} caudatum Forst.

ex Capsula Bourbonica de D. Guss.

Canicum A. frondibus pennatis: pinnis oppositis oblongis: Terminalibus
Inangulari-hastatis. Lin. spec. pl. pag. 15577

Ad cartum album maximum americanum Seb. thes. 2. p. 65.

Tab. 64. fig. 7. P

Habitat Sumnami

Stipes teris frons pennata: folioli lateralibus oppositis breviori-
bus, saepe duorum parium: impari longiore. Pinna recurva
ta, oblonga, obtusa: terminales majores cordato f. hastato-
Inangulari oblongo Lin.

non vidi

hastatum A. frondibus pennatis. pinnis hastato-trilobis rectis Lin. suppl. p. 447. * L. V. p. 939
Habitat ad Cap. b. spei

Stipulae glabrae indivisae, atropurpureae, semipedalis. Pinnae subsessiles trilobae: lobis lateralibus brevibus, inferiori opposito, obtuso superioribus acuto, alternis. Margo crenulatus crenulis recurvatis hinc. Venibus pinnis in alii frondibus subrotundis vel ovatis sursum subangulatis integerrimis

Deltodeum a fronde pennata, pennis alternis deltoidibus obtusis, summa
triangulari, quibusque superioribus et anticis continuatis supra prope

134.

Habitat in Jamaica.

Frondes digitales glabre. Stipites filiformes adropurpurei lutes vellopi
estate glabri. Sola petiolata semicirculata infima subtunda fructi-
ficatio ad utraque marginis interrupti. Petioli capillares inferius saepe
diphylli.

Inlobum & frondibus compositis: pennis tripartitis obtusis: in-
feris multifloris caule repente

Adiantum triphyllum repens Pat. Fil. 100. v. 11. fig. 9

Habitat in America.

Stipes palmatis filiformis glaber purpurascens. penna infere
ni opposita superiores alternae seu breviter petiolato ovata ob-
tusis glabra basi utraque lobis incis, seminequeutales
superiores minores

Adiantum humile trifoliatum & repens Plum. Fil. Tab
99. fig. 2

macrophyllum a fronde pennata, pennis oppositis rhomboides acutis, ima
majori, inferioribus subhastatis reflexis fructificationibus antica et inferne
contenuatis Sw. prod. 135.

Trichomanes majus nigrum Sloan hist. . Tab. 81. 34.

Adiantum 2. Brown. Jam. 17. Tab 3^a Fig. 1.

Habitat in Jamaica

Stem nuda nitida glabra. Pinna petiolata 6-7 pollicares et ultra
superius parum minoris terminalis antecedentibus latior, attenuata
for extorsum serrata subnatis fructificationes inferne intempe
to

pinna rhombica ovata, tenuissime striata, acuta

Gen. Sacculatum A. frondibus decompositis: pinnis alternis trapezoides. acu-
minatis crenatis, crenis denticulatis, fructificationibus superioribus internax-
tis. Sw. prodor. pag. 135.

Lonchitis serrata et ~~strepida~~ Plum. fil. V. 52.

Adiantum jamaicense Pluk.

Tab. 252. fig. 5.

Habitat in Jamaica.

in figura Plum et Pluk.
frondes tantum compositi nec decompositi ut habet L.

Trifoliatum a. fronde decomposita: foliis alternis ternatis linearibus unifloris.

Adiantum clavatum Trichyllum Pet. fil. 99. V. 11. fig. 4.

Habitat in America. *trichyllum* & *retusum*

Adiantum humile trifoliatum Dregeri Plum. fil. tab. 99. fig. 13

non vidi

Lupulus inflorum A. frondibus bipinnatis, pinnis cuneato subrotundis subinfloribus
Habitat in Insula Bobonis Commenon Thourin

Caecis A. cap. veneni styis filiformis & laevis, petioli capillares
foliola inferiora pinnata superiora simplicia, basi acuta, apice ^{nigri} ~~vir~~ unguiculata
ca. bis: in lobis fructificationis oblonga in singulis lobis

Capillus veneni ambrosiacus Rumph. herb. 6 pag. 77. tab. 34
fig. 1. huius pertinet videtur

22. denticulatum A. pennis alternis trapezoides acuminatis creatis, crenis denticulatis, fructificationibus superioribus interruptis

*** Frondibus decimpositis

23. trifoliatum A. folioli alternis ternatis: pennis cuneiformibus linearibus floris

24. triflorum A. pennis cuneatis subrotundis trifloris

25. capillus veneni A. folioli alternis pennis cuneiformibus lobatis

26. truncatum A. folioli pinnatis: pennis alternis cuneatis subsalicatis truncatis

27. striatum A. ^{integerrimis} pinnulis rigidis salicatis-ovatis striatis, fructificationibus superioribus interruptis, stipite tereti apertis

28. pelosum A. pennis lanceolatis subsalicatis superne et ~~ex~~ ^{multis} ⁱⁿ ^{con-} ^{spicuis} articulis fructifican-
tibus, stipite villosis fructificationibus interruptis

29. cristatum A. folioli inferioribus bipartitis: pennis lanceolatis superne multifloris

30. pulvulentum A. pennis ovalibus articulis truncatis reniformibus, stipite hirsuto

31. villosum A. pennis rhombeis articulis et extusque fructificantibus subrotundis ^{stipite villosis} truncatis

32. foliatum A. pennis salicatis lanceolatis, fructificationibus superioribus interruptis, stipite villosis

- 33. multiflorum A. pennis tripartitis obtusis superne incisae infimo ternatis fructificationibus reniformibus, stipite glabro
- 34. crispum A. pennis pennatifidis involutis
- 35. flabellulatum A. pennis alternis rhombicis rhombatis multifloris: stipitibus supra pubescentibus
- 36. pallidum A. pennis lunulato tripartitis superne et antica fructificantibus, fructificationibus continuatis
- 37. leptophyllum A. pennis pennatifidis lacinis obtusis oppositis
- 38. fragrans A. pennis ovatis subulatis obtusis subtus nudis
- 39. cafferum A. pennis ovatis incisae dentibus subtus paleatis
- 40. pteroides ~~xxxxx fronde supra decomposita~~
- 41. microphyllum A. foliolis alternis obtusis oblongis crenatis.
- 42. trichomanoides A. pennis inferioribus pennatifidis laciniis pennisque exterioribus cuneatis apice unifloris
- 43. chusanum A. pennis alternis pennatifidis: lobis inaequalibus
- 44. abaciferum A. pennis lanceolatis attenuatis basi pennatifidis extrospun-
incisae laciniis serratis serratis unifloris
xxxxx frondibus supra decompositis
- 45. fragile A. frondibus superne bipinnatis: pennis obovatis cuneatis integris fructificationibus interruptis