

Adonis

1. *officinalis* A. floribus ^{sub} octopetalis, fructibus ovatis
2. *autumnalis* A. floribus octopetalis, fructibus cylindricis, calycibus
3. *flammea* A. floribus octopetalis, calycibus hispatis, fructibus cylindricis
4. *vernalis* A. flore dodecapetalo, fructu ovato, ramis sterilibus foliis pinnatis
multifidis.
5. *apennina* A. floribus pentadecapetalis, fructu ovato, ramis floriferis, foliis pinnatis
pinnis pinnatifidis.
6. *capensis* A. foliis bitermatis: foliolis subcordatis
7. *resicatoris* A. floribus decapetalis: foliolis bitermatis: foliolis serratis
glabris
8. *filix* A. foliis bipinnatis: foliolis linearibus pinnatifidis

o filia Adonis foliis bipinnatis: folioli linearibus pinnatifidis lina sup. naz
278. ✕

Habitat in Cap. p. rei

o folioli inferioribus pinnatis
vel bipinnatis et

folia radicalia vix pilosa pinnata. pinna pinnatifida
in fimo suo laciniis serratis incis. Scapus striatus erectus pilosus
iterum pinnato sesquipedalis involucrium folioli ternis intis et umbellae
pinnatifida ^{ves} tripartita radii laterales triflori intermediis uniflori

7

vesicatoria A. *Flombus decapetalis*, *foliis* ^{ovatis} *biterminali*, *foliolis* serratis glabris
Lin. Suppl. pag. 272. *Fl. L.* pag. 575.

Impatiens ranunculoides africana *conocaphylloides* *Lepidopitidis* *loba*
lis *foliis* rigidis *margine* *junco* *Pluken. alm.* 190. *tab.* 95. *fig.* 2.

Habitat in *Cap.* *b.* *spei* 7

non vidi

^{nee}
differentia *inter* *hanc* *et* *capersem* *haud* *bona* *modo*
nullo *modo* *distinguentur*

6 capensis A floribus ~~deca~~ foliis bitermatis: foliolis subordatis Lin. suppl. p. 272
L. V. pag. 514. Lin. Spec. pag. 772 x

adonis capensis floribus decapetalis, fructibus depressis, foliis duplicatis

ternatis: foliolis serratis cordatis L. V. pag. 514 x

Parnuculus perelegans Franquetille, foliis aculeatis Lobel. illust.

^{135.}
Parnuculus othopiensis, foliis rigidis, floribus ex luteo viridentibus

Com: hort. t. p. 1. tab. 1.

Actaea trifoliata hispida, foliis scabri, flore sulphureo variorum

Burm. afr. 147. t. 56.

radicis pelop. Habitat in Cap. b. p. 2

Folia radicalia: foliola serrata rigida. Petioli herti. Sapi

aphylli deceter, pelosi terminati umbella composita

4 involucria et involucriella hexaphylla lanceolata

radicis umbellae tria extenore; tres interiores stantius

canaliculata. Antheras ovatae in singulis filamentis

diffusa in capitulum congesta Lin.

non vidi

quibus notis
a vesicatorio differt.
nemo me alium aperit
est.

1 affinis Cl. flombus pentapetalo, fructibus ovatis Lin. 1. V

Adonis flore pallido Lam. epit. 640.

Adonis sylvestris, flore phoeniceo, ejuoque foliis longioribus Bauh.
pin. 170.

Habitat inter segetes Europa australi ☉

Caulis erectus pedalis sulcatus simplex, folia petiolata, glabra jun-
nata. pinnis opposita multifida laciniis subulatis. Flor. termi-
nalis erectus. Petala ^{quorundam} octo vel plura (etiam in specimen her-
barii Linnoani) cincta in meo pallida flava basi maie-
la coalescente uti Bauh. pin. dudum observavit
Anthemum Belgae Dod. pempt. 260

minuta Cl. flombro petali, fructibus sed cylindricis corollis minutis & ovum
flor. aust. 4 t. 354

an ab Ad. autumnali diversa
rubiginosa

Polygona angustata V.

2 autumnalis Cl. flombus octopetalis, fructibus subcylindricis Len. N.
L.V. pag. 514

♂ Cor adonis Clus. hist. 1. p. 336.

Adonis flore majori Bauh. pin. 170.

Adonis hortensis, flore minore atro rubente Bauh. pin. 170.

~~Habitat inter segetes Europeae & Italiae~~

13. Adonis mucronata Gaig. fl. austr. vol. 4. tab. 354.

~~Habitat inter segetes Europae australis~~

mea (cultae) differt magnè a præcedente quod omnibus partibus
major, ramosior. Receptaculum fructus sesquipedale. Semi-
na orbata rugosa cuspidata variat Corollæ phoeniceæ
et floris basi rotatis maculatis

Adonis mucronata Gaig. spec. forte non differt fl. austr. tab. 354.

Flammea A floribus octopetalis calycibus hepatis, fructibus cylindricis
— Siqui fl. asp. 4. 7355.

multi 2, etc

4 vernalis A. flore dodecapetalo. fructu ovato ^{caule unifloro ramis ternatis} Lin. S. V.
Jacq. austr. tab 44.

Buphttha Linn. *Sod* *prempit.* 261.

Hellebomus niger *Veneriifolius*, *buphtthalmi* flore *Bauh.* *per.* 106.

Habitat in *Celandis*, *Bonisia*, *Bohemia* *collibus* *apneis* 2

Caules ^{*inferne*} *ramosus*, *sternatus*, *pilis* *vel* *nullis*. *folia* *pinnato* *multifida*.

laciniis *subulatis*. ^{*residuum*} *calycis* *folioli* *oblonga* *extus* *velloso*.

Corolla *flava* *rami* *ternes*. *Petalis* *cuneata*

pinnato multifida

foliis

5 apennina a floribus pentdecapetalis fructu arato Lin. Faicq. fl. austr. tab 44

Helleborus niger fenulaceus, caule geniculato, flore magno Tulipa
minoris inftar mentz. pag. 1. 3. fig. 1.

Habitat in Sibiria, apenninis 2

caulis striatus glaber. Superne ramosis. Folii bipinnati basi acro-
culata, pennatae pinnis pinnatifidis laciniis brevioribus quam
in vernali linearibus mucronatis. Repata oblonga utraque
angustiora

nis pinnatifidis

fero
tam floribus foliis pennatis pin-

conferatur adhuc Faicq. fl. austr. sed differentia nonnulla suspicatur.

7 japonica A erecta foliis oppositis ternatis: folioli ovatis incis.
Thunb. fl. japon. p. 2394 t. V. pag. 511.

Habitat in Japonia

Caulis erectus striato-angulatus, subdichotomus villosus, bipe-
dalis. Foliole petiolatae. Stipulae acutae, tenuissime villo-
sae pollicariae. Flores dichotomici paucis, pedunculati
pedunculi uniflori. Petala ultra vaginae subaequalia
extus albo tomentosa Thunb.