

# Agilops

1. ovata Q. spica aristata, calycibus omnibus manifestis.
2. caudata Q. spica aristata, calycibus omnibus manifestis
3. trinivalis Q. spica aristata, calycibus inferioribus manifestis
4. squarrosa Q. spica subulata aristis longiore

laudata Ozilops

Ozilops nova Ventral

Ozilops cylindrica Vitae

Stabi ut totum gramin  
Culmi plures pedales, gemis teretes simplicibus, geniculis contractis. Soli  
graminea patentis, tri-quadrupollidaria, utraque pulis raris ad sparsa  
marginis subdiata. Vagina longitudine fere internodiorum. Spica teres  
trivel quadrupollidaria: glumis calycis inferioris. Spicula alterna  
rachidi articuli altera latere exteriori <sup>glumae</sup> convexi interiori concavo perbun  
calycis valvula latior. Valvula calycis <sup>interiore</sup> bidentata, dent alter brevior, & obtusiusculus alter  
Habeo flo duplo longior acutus. Calycis terminalis longe aristae pollicaris distinctae  
vescenti straba dente interdum obtusiori. Flosculi tres, sessilei proter unius pedicellatus  
dermaphroditu  
steriles glumis mutis; spicula terminali flexo glumae flosculi forma  
res ansta Calycium longiore altera opposi via longitudine valvula. aristae  
Blabrae



angustus G. | foliis lineariibus glabris, floribus spicatis distantibus; laciniis  
suprema recta, stigmatibus spatulatis adnatis. Hort. New. 1. p. 65.

~~gladiolus angustus, floribus secundis, spatulis acutis, foliis ensiformibus  
Hort. New. G. n. 21~~

Wied.

gladiolus

et polyst.

angustus Jacq. coll. 4

4i. varior. diversa

a la man. tri et affinis  
tri non polystach.

Secund. figura

~~abundulato non diversis~~

Vaccinifera A. spica aristata, calycibus omnibus brevifloris Lin. 1. V  
perz

gramen Præticum, spica gracili in duas antheras longissimas et  
apertas abeunte Tournef. corol. 29.

Habitat in Præta herb. Tournef. et Gussf

Culmi copiosi basi geniculis infimis gracilibus. Folia angusta,  
vellosa. Spica glabra. Valvula <sup>bi</sup>dentata terminata antheris duobus  
in pollicibus

ovata Q.



aromatica de. frica secundo, culmis erectis, glumis quadrifloris  
Walt. fl. car. pag. 249.  
Habitat in Cardena

non vid.

*Lachnaria* sp. secunda, culmis decumbentibus, glumis trifloris Walt  
f. carol. pag 249  
Habitat in Carolina.

non vidi

ovata & spica angulata, calycibus omnibus manifestis Lin. l. v. pag

Aylons Dod. pempt. 73. Cam. epist. 92 or. pag. 2.

Testuca altera capitulis duris Bauh. pin. 10. theat. 151.

Gramen fricatum, durioribus et crassioribus locustis spica brevi  
Scheuchz. gram 11.

Habitat in Europa Australi &

Radix bulbosa Culmus simplex spithameus vel ultravaginatissimus  
Folia utraque pilosa fauce vaginis barbatis. Spica terminalis  
glumis villosis striatis et ante longa vana glumis villosis  
bus anctis saepe quatuor



Truncialis & spica anfrata, calycibus <sup>inferioribus</sup> omnibus manifestis Mant. 501. 1.  
S. S. Schreb. gram. 70. 7. 10

Testula altera, capitulis duri, spica Trunciali Bauh. pin

<sup>10.</sup>  
gramen spicatum, durioribus et crassioribus locustis spica longi-  
ma Scheuchz. gram. 12.

Habitat Mompelia, Masfeld, Smyrnae etc.

*Squarrosa* O. *Spica subulata arifis longiore* An. t. V. pag  
Schreb. *gram.* 2. p. 44. t. 27. fig. 2.  
Habitat in oriente

non. vidi