

Ocipula

777

an *Oxyphala trifida* Swartz.

Non Rohr ~~ex America~~ ^{Carolina} no 112.

Rami cortice ~~caerulo~~ glabro, inferne teretes apice compressi.
Folia opposita petiolata elliptica lanceolata, parum attenuata
^{acuta} utraque glabra supra arena coria subtus venosa 4 pollicetana
stipula brevi acuminata interfolia. Plorenuli terminales
utroque 2. sesquipollicares glabri pedicelli rarisempsi remoti
^{inferior} inflori ^{superior} reliqui uniflori brevis. Tub calycis marginis
^{glabri} superius integer parvis. Tubus corollae glaber unguiculatus filiformis
limbi laciniis rotundatae anthera ⁴ ^{br} albedo longitudine lim-
bi. Stylus limbo parum longior clavatus indivisus.

Coris Aegyptiaca foliis ovatis oblongis acuminatis utraque glabris
conymbris axillaribus
manubia Coris Aubl. fl. Gu. 1. p. 1.

Habitat in America meridionali & Robur
Rami fructi, oblique tetragoni glabri folia petiolata opposita
basi ovata, pithamoa venosa integerrima. Petioli firmius
quovulsaes pedunculati axillares oppositi foliis breviores
partiales oppositi ^{patentes} basi bipollicares semper minores basi bractea
setacea pedicelli plures trichotomi. Conymbris basi late ovato
hemisphaerico subovato

~~Coris Heladoma nobilis, foliis ovatis angustis acuminatis utraque
tandem quinquenerviis: nervis subparallelis cordatis cordatis A. S.
Jac. K. bot. Berol. 1. pag. 109
Habitat in Amer. merid.~~

Forster: Melastoma

~~Melastoma glabrum foliis integerrimis trinerviis ellipticis lanceolatis
basi, calycibus circumscissis Forst. prod. pag. 34~~

~~Habitat in societate insula 5.~~

Oxyphla multiflora foliis oblongis floribus axillaribus congestis fl. Penn.
1. pag. 50 Tab. 76 fig. b.

Habitat in Pennia ad fluviorum margines

Caules fruticosus, triquetris, erectus, pubescenti. Rami bracteati, obtus
tetragoni, granulosis, tenes purpurei hirsuti. Folia opposita, ellipticis,
oblongo-ovatis, vel ovato lanceolatis, acuminatis, pubescenti, lanugine
pubescentia, integerrima. Petioli purpurei. Stipes breviter pedunculati, gemit
ni vel terni utrinque, axillares vel infrafoliacei. Calyx campanulatus
persistens limbo plano quadridentato, pubescenti. Corolla rubro purpurea. Lac
nia limbi ovata reflexa. Germen 4 sulcatum. Stylus contortus. Stigmata duo
revoluta. Baccia tetragona subrotunda, tetrasperma obscure purpurea. Sem
ina obovata ossea trigona

Longata Alziphila

Habitat in ^{India orient} Java herb. tuss. 5

Rami, teretes, glabri, cineres punctati. Folia petiolata, opposita, tripolluciana lanceolato-elliptica, acuminata, supra nitida, subtus subvenosa, axillis nervorum tomentosis. Pedunculi axillares et terminales: pariales oppositi, patentes, bif. trifidi: pedicelli plures, umbellati canescentes, ut calyces

Ogyphila

an *Ogyphila elata* Sw.

an *Rnoxia* Brow. Jam. Tab. 3. fig. 3

Habitat in Domingo herb. Guss.

Stem tetragoni, inermis. Folia petiolata, ovata oblonga, 4-5 pollicaria, acuminate
acuta, integerrima, venosa, utrinque glabra. Thyrsus terminalis, multiflorus. Ca-
lyx subinteger rimis, canescens. Corolla glabra: laciniis linearibus lanceolatis.

4 5

Oxyphela arborescens, foliis ellipticis acuminatis glabris planis, comibus axillaribus
calycibus ramisque inæanis
Marabœa arborecens: foliis ovatis acuminatis, floribus glomeratis albis.

Cubl. fl. Gu: pag 64. Tab 24

Habitat in Caſula Trinitatis Ryan 5.

Arbor medicinis

Rami tetragoni, inæani.

Folia opposita, petiolata, palmata et ultra, acuminata, basi attenuata et per petiolum parum decurrentia, oblique nervosa, obscure venosa, tenera, supra glabra, subtus pallida et villis minutissimis oculo armato conspicendis: tenella utraque et tomento tenui inæana.

Petioli sesqui pollicaris

Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, petiolis longiores. Flores copiosi, in corymbo dichotome diviso, fastigiati, pedicellati uti flos dichotomus.

Bracteæ sub ramificationibus subulata, inæana, parvæ.

Calyx + Perianthium inferum, persistens, quadridentatum, ante expansionem
floris pyriforme, explicatum tuberculatum, fructiferum hemisphaericum.

Corolla monopetalala, infundibuliformis: tubo calyce parum longior. Lobis quadris-
dus: laciniis lanceolatis.

Stamina. Filamenta nulla. Anthera quatuor, parva, in faucibus

Pistillum. Germe superum, semiglobosum. Stylus unicus, capillaris, corolla
duplo longior, profunde bifidus. Stigmata simplicia.

Pericarpium. Bacca magnitudine Pipenis nigra, globoso-depressa, subumbilicata,
corolla duplo longior laevi, calyce cineta, bi- tri- / tetrasperma.

Semina ovata, extus convexa, intus compresso-plana. Testa subnitida.

(Differt ab Ag. ^{inphila} villosa, foliis majoribus, acuminatis, basi attenuatis, subtus non nisi
oculo armato villosis, tomento ramorum albidior, subtus leviter ^{superne in ramis fere} distinctis
senesce, corymbis tantum axillaribus, floribus pluribus dimidiis minoribus

~~villoso~~ Agriophila ^{villoso,} ~~Agriophila~~ ^{elliptico - 5 (6)}
conymbi axillares terminalibusque, foliis oblongo lanceolatis
ellipticis subtus pedunculi calycibusque villosis inanis

Manabian villosa: foliis ovatis, subtus inanis; floribus vix pentibus,
glomeratis Aubl. fl. Gu. pag. 62. tab. 23.

Habitat in Cayenna ~~et~~ non Probr 5

Rami tetragoni, inanis tomentosi: ramuli oppositi, villosi, sordide cin-

rei.
Folia petiolata, opposita, ^{triquadri} ~~tri~~ pollicaria, lato-lanceolata, utrinque obtusa,
integerrima, supra glabra excepto costa; subtus villosa, mollia, ca-

napentia, venosa

Petioles vix unguicularis

Conymbi axillares, oppositi, terminales terni, bis vel ter dichotomi, fa-
scigati. Pedunculi, uti pedicelli et calycis villosi sordide cinerei.

Corolla glabra.

Stylus corolla duplo longior.

flori ~~longo~~ ~~ma~~ ~~post~~ ~~quam~~ ~~in~~ ~~adversum~~

arborescens
~~Cuscuta~~ aegyptiaca, foliis ellipticis acuminatis glabris, ^{planis} cymis axillaribus
calycibus semisque raris

Mannabea arborescens foliis ovatis acuminatis; f. comibus glomeratis
albis Club. fl. Glean. pag. 64. tab. 24

Nº 47 *Oxyphala*

Calyx perianthium inferum tubuliforme, quadridentatum persistens corolla brevior
Corolla monopetala ^{inferioribus} ~~hypogynis~~ ^{rot.} calycis ^{rot.} ~~longior~~ ^{longior} lambris quadrifida
laciniis lanceolatis acutis

Stamina filamenta ut ulla anthera quatuor minute in fauce tubi

Germen superum spiciglobosum. Stylus 1. capillaris longit. corolla duplo longior
Stigmata duo capillaria profunde bifida. Stigmata papillosa

Pencarpium baccis magnitudine Piperis Tetrasperma calycis uncto

semine ovata extus convexa intus ^{utrinque} compresso pilana

Rami tetragoni incani

Folia opposita, petiolata, palmata et ultra, acuminate basi attenuata ^{oblongo ovata} ^{intus}
armato videntur ⁱⁿ nervo, glabra subtus pallida prope nervum in venis et nervis ^{a viliis minutis per nervum} ^{velis} ^{utrin}
que a timento tenui usque.

Petiolis usque pollicari ultra mesum a folio decurrente alatis

Pedunculis axillaribus solitariis oppositis ^{longioribus} ^{longioribus} ^{longioribus} petiolis. Flores ^{longioribus} ^{longioribus} ^{longioribus}
corymbis ramis corymbis 5-6is ^{incompositis} ^{incompositis} ^{incompositis} ^{incompositis}
bracteas tubulatas ad ramificationes ^{incompositis} ^{incompositis} ^{incompositis} ^{incompositis}

Manabea ~~S. dub.~~ ^{S. dub.} arborescens foliis ovatis acuminatis; floribus glomeratis albis
Aubl. pl. Guian. pag. 64. Tab. 24.
1822. Dr. Ryan ex Prof. Tind.

Agiphila

Agiphila martinicensis, foliis lanceolato-ellipticis calycibusque glabris,
racemis axillaribus terminalibusque subcompositis

Agiphila martinicensis Gauche. obf. 2. pag. 3 tab. 27. Lin. S. Veg. 160

Legit in insula Montserrat Ryan & tetradymia, vesp. aperea

Rami ^{inferne} teretes, superne ad folia parum lutes, compressi, fusci, lucidi.
Folia quinq. pollic. ana, superum minora, patentia, utroque glabra.
venosa, lucida

Stipulae pollicares

Racemi axillares, oppositi patentissimi, foliis dimidiis brevior.

Peduncululi pariales oppositi, triflori, inferiores interdum quin-
queflori, pedicelli ramosi. Locis pedicellati. Bractea subulata.
ad basin pedunculo rum paralelum et pedicellorum.

Calycis subrotundi.

Variat. foliis lanceolatis et angustioribus.

Ogiphila

Martiniensis Ogiphila foliis lanceolato ellipticis calycibusque glabris, racemis
axillaribus terminalibusque subsimplicibus

6

martiniensis A. ^{Paniculatus} Cymis axillaribus ^{et} terminalibus Verminalibus foliisque ovatis glabris

Agriphila martiniensis Gaicu. obs. 2. p. 3. 8. 27. Lin. Mart. 178
f. v. pag. 160

Habitat in America Meridionali in Martinica

Stem glaber ramis obscure ^{venato} ^{utrumque glabra} ^{palmaria} ^{integerrima} ^{venato} ^{utrumque glabra} ^{palmaria} ^{integerrima} ^{venato} ^{utrumque glabra} ^{palmaria} ^{integerrima}

utro utrumque
foliis ^{duo} ^{parvis}
lanceolatis ^{un} ^{sub} ^{infimis}
rami ^{fiat} ^{conibus}

Panicula ramis ^{de} ^{totomis} ^{flexuosis}, bractea ^{sub} ^{bulata}
brevi ad singulum pedicellum foliis ^{lanic} ^{colatis} ^{sub} ^{inferior}

ovatis ^{lanic} ^{colatis} ^{ellipticis}
variat foliis ^{latioribus}, et ^{lanic} ^{colatis} ^{staminibus}
imbricatis vel ^{expetis}

Unifida D. foliis ovato lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus trifi-
dis confertis Sw. prodr. p. 32.
Habitat in Jamaica f

non vidi

foetida Q. foliis ovato-lanceolatis, subtus petiolisque hirsutis, pedunculis axillaribus, solitariis Sw. prodr. p. 32.
Habitat in Jamaica &

elata O. foliis ellipticis acuminatis membranaceis, paniculato
terminalibus; calycibus pubescentibus Sw. prodr. p. 31.

Knoxia v. Brown. Fam. 140.

Habitat in India occidentali §

lowe Q

ant.

Canaliculato-^{obtusis}
vellosa *Azophila* foliis ellipticis ^{terminantibusque} subtus ramisque vellosis tomentosis, corymbis axillari
bispiculis uncinatis
Manabea vellosa: foliis ovatis, subtus incanis; floribus virideis glomeratis
Aubl. fl. Gu. pag. 62. tab. 23

Habitat in ~~Peruvia~~ ^{Peruvia}

Rami obscuri & dragoni molliter villosi, incani
Folia petiolata, opposita, remota, tri- & quadri-pollicaria ^{pro}textura, venis
integerrima, supra glabra, subtus molliter villosa, canescentia
acutiora vel obtusa.

Petiolus brevis. glandula tomentosa incana in axillis. Stipula nulla.
Pedunculi axillares et terminales oppositi, foliis ^{brevis} ^{se} ^{qui} ^{pollicari} ^{apice} ^{trifidus} ^{pedunculis} ^{parthalibus}, ^{crucibus} ^{et} ^{flori}. ^{Clori} ^{fastigiati}
Bractea lineari attenuata ^{longe} ^{femina} ⁱⁿ ^{quibus} ^{ad} ^{basin} ^{pedunculorum}
parthalium, parva utrinque ad pedicellos laterales.

Calyx campanulatus tomentosus.

Corolla campanulata glabra lacinis oblongis

filamentis 4. versus basin corollae longitudine corollae

germen subglobosum glabrum, stylis axillaribus corolla duplo longior
bifidis.