

Agopium

1 betulinum Q.

Betulinum Cyopicon Lin. S. V. pag. 840. Smith. plant. in ed. fasci: 2 pag. 42 tab. 42

Maprounea Guianensis Aubl. fl. Gu: pag. 895. tab. 342.

In Capenna legit A. v. Rohr 5

Rami teretes, glabri, cortice cinereo: ramuli fusco purpurascentes.

Folia in ramulis, petiolata, alterna, pollicaria et ultra, elliptica, utrinque
acuta, integerrima, utraque glabra, obscure venosa, supra nitida,
subtus pallide ferruginea.

Assenta ex apice ramorum, 1-2; pedunculata, oblonga, magnitudinis

femini canabii

Betulinum Ogo pector Len. Suppl. pag. 413. L. V. p. 890. Smith. G. p. 42. Tab. 42.
Mayrounea guianensis Aub. fl. gu. 895 t. 342.

Habitat in Surinamo, Guiana &

Arbor ramis alternis flexuosis, apice flexis. Folia alterna
petiolata ovata, acuta, integerrima, myrti similia venosa
Corticis tenera. Aquila nulla. Panicula parva. pedunculi omnes
tuberculati, pariter divaricati. Cori uniflori. Amenta
masculina facie Alni vix magnitudine feminis tritici. Calyx
communis trifidus, foliolis concavis obtusis, flosculis 20-30 con-
tinenti. Foeminei in pedunculis parvialibus solitarii Smith

Descript. vide inter amenta