

Asculus

1. hippocastanum A. folioli septenis
2. flava A. folioli quinis, corolla lamini cordato-subrotundi, unguibus calycis
Duplo longioribus
3. parva A. folioli quinis, corolla lamini obovatis, unguibus longitudine calycis

macrostachys Opuloides

Hab Opulus parviflorus Waltk.

Habitat in Carolina herb Richard

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, quinato-dentata, foliola bipollicaria, oblanceolata, basi obtusa, acuminata, serrulata, supra glabra, subtus venosa tomentosa. Racemus terminalis, fructus, pedalis: pedicelli sparsi, inferiores 4-5 flori, 2 flori superne uniflori. Calyx tubulosus, villosus, unguiculatus. Petala subtus, alba, calyce dimidio longiora, subuncata, inaequalia. Stamina 7, interdum pauciora, longispina. Ovarium transversa, secatum 3-lobulose

3 Paria *Opulus* foliis quinis, corolla lamina obovatis; unguibus longitudine
Lycis. Hort. Kew. 1. p. 494.

Saamouna pisonis s: filiquifera brasiliensis arbor, digitatis foliis
serratis, floribus leucis purpureis Plukh. alm. 326. t. 56. fig. 4.

Paria Boerh. Lugdb. 2. p. 260. t. 268. Hort. Angl. 54. t. 19. Trew. Euret. v. 15.
Mill. Gc. 14. D. Duham. arb. 2. p. 98.

Opulus Paria floribus octandris Lin. Spec. pl. pag. 480. t. V. pag. 352.
^{Sw. off. pag. 140.}
Habitat in Carolina, Brasilia &

Polygama. Fructu glabro, ^{cap. in flavo}

Soliola profundius serrata brevior, petiolata, glabra. Pedunculus pubescenti
in florifera antecidentium. Calyces majores purpurei glabri, dentibus
obtusissimi. Corolla purpurea

2 flava Opulus foliolis quinis, Corolla lacinis cordato-subrotundis; unguibus
calycis duplo longioribus Hort. Kew. 1. p. 494.

Habitat in Carolina ^{septentrionali} boreali ^{et} quam in Hypocistano

Soliola ^{basin vixus integerrima glabra} petiolata glabra, lanceolata, acuminata, venis sine inaequaliter
ferrata, petioluli pubescentis. ^{flor. pubes.} ~~Bas~~ in flor. effluvia ut in antecedente. Pedunculus
communis pubescens. Ca. palmari. Calycis pubescentes subcampanulati.
Petala flava ~~marginibus glabra~~ villosula

1. *Hippocastanum Opibulus foliolis septenis* Hort. Kew. 1. p. 493.

Castanea folio multifido Clus. hist. 1. p. 7. Bauh. Pin. 419.

Hab.

Opibulus hippocastanum floribus heptandris Lin. S. V. p. 352.

Habitat in Asia septentrionaliore, unde in Europam 1550

Rami teretes glabri. Folia alterna, duo ultima opposita ad basim interhas pedunculata. Foliola septem subtus basi pilis femugineis eodem glabra, extorsem latiora, acuminate ^{inæqualiter} serrata, lateralibus minoribus.

Racemus semi-pedalis. Pedicelli alterni, remoti, triflori, unguis petalorum longior. Calycis brevior quam in infrequentibus. Camina petalorum margine subriccloso. Corolla alba