

Agrimonia

1. *Cupatoria* A. fructibus hispida, foliis caulinis pinnatis: foliolis oblongis
terminali pedicellato, petalis calyce duplo longioribus
2. *repens* A. fructibus hispida, foliis caulinis pinnatis: foliolis oblongis
impari sessili, petalis calyce triplo longioribus.
3. *odorata* A. fructibus hispida, foliis caulinis pinnatis: foliolis oblongis
inferioribus diminutis, petalis calyce duplo longioribus
4. *paraxifloa* A. fructibus hispida, foliis caulinis pinnatis: foliolis pluri
mis lanceolatis, petalis calyce sequi longioribus
5. *decumbens* L. foliis pinnatis hirsutis, caule procumbente subaphyllo
fructibus hispido uncinatis.
6. *agrimonioides* fructibus glabris, foliis radicalibus pinnatis. cauli
nis ternatis

Agrostis
Agrostis *Agrostis* foliis interrupte pennatis, pinnis terminali ovatis, pinnis
liberis reflexis

Habitat in Carolina herb. Mich.

Caulis erectus, teres, herbaceus, simplex. Folia petiolata, interrupte pennata,
foliolo oblongo, profunde acuta, obtuseque serrata, supra lineata, glabra,
fittur villosa, subcaescescentia, terminali pollicari lateralibus vix magis
re. Stylis semiorbitatis, aequaliter in se: lacinis ovatis, acutis
pedunculis terminalibus et axillaribus. Flores racemosi, erecti, albi
fructus tuberculatus, profunde sulcatus

an nomen genericum rectum quod in suis pinnis Potent. et Junon

Gymnomia?

an *ancistrum*

Habitat in monte vides *Commes. herb. Tus.*

Caulis inferne petiolis vaginatis, pedalis, erectus, simplex, superne di-Atriphyllus, angulatus, villosus. Folia petiolata, pinnata: pinna oblonga, incisiva, opposita, semi pollicis aeri, subtus villosa-incana, supra glabra. Spica elongata purpurea. Flores inferiores distantes.

Eupatoria Agr. fructibus hispida, foliis caulinis pennatis: foliolis oblongo-ova-
tis, spicis elevatis, petalis calycis duplo longioribus Hort. Kew. 1. p. 119
Eupatorium. Cam. epul. 755. Mill. 12. 15

Eupatorium veterum s. Agrimonia Bauh. pin. 321.

Agrimonia Eupatoria foliis caulinis pennatis: impari petiolato, fructibus
hispidis Lin. S. V.

Habitat in Europa praeae aprici aryllacei &

Caulis angulatus pelosissimus simplex, scaber. folia petiolato
alterna intermixta pennata cum impari, foliola opposita
sessilia, serrato incisae supra secundum nervo lineata, subtus
vellosa mollia, glauci. Stipula ovata basi petioli adnata.
Petiunculus terminalis elongatus, semipedalis. Stems rarioribus
diffantibus. Bracteae setaceae ad basia petiunculi.

fructibus hispida, foliis caulinis pennatis, foliolis oblongis termi-
nali petiolato, petalis calycis duplo longioribus

2 repens A. fructibus hispida, foliis caulinis hispida pinnatis: foliolis oblongis
spicatis subsessilibus, petalis calycis triplo longioribus Hort. Kew. 2. p. 130
Agrimonia orientalis humilis, radice crassissima repente, fructu in hucam
brevem et densam congesto Tournef. cor. 21.

Agrimonia repens foliis caulinis pinnatis: impari sessili, fructibus hispida
Lin. spec. pl. p. 643. 4

Habitat in monte. 4

Similis A. Eupat. sed caulis minor, crassior, ^{ramosiores} hispider. Stipulae
longitudinali interstitionem, reflexa, ut caulem sese obumbrant. foliis
tam impari sessile. Bractea longior, ^{racemi} fructu subsessilibus vel
brevis pedunculata, crassior et floribus confertioribus
bractea longitudine florum ^{denique} omnes partes majores Petala
obtusiora

fructibus hispida, foliis caulinis pinnatis: foliolis oblongis
petalis impari sessili, petalis calycis triplo longioribus

3 odorata Agrimonia fructibus hirsutis, foliis caulicis pennatis: foliolis
oblongis: inferioribus dimidiatis, petalis calycis duplo longioribus

Art. h. v. 2. p. 130

Agrimonia odorata Camer. Hort. 7. Mill. Dict.

Habitat in Italia 4

non vidi differentiam sufficiens

4 parviflora A fructibus hispida, foliis caulibus pinnatis: foliolo plurimos
Cuneolatis, petalis calyce aequilongioribus. Hort. Kew. 1. p. 130
Habitat in America septentrionali 4

non vidi

Det Boeck

5 Decumbens a foliis pinnatis hirsutis, caule procumbente, fructibus undique
hispido uncinatis. Len. Suppl. p. 251 & L. V. p. 440.
Habitat ad Cap. b. p. 4

Folia radicalia Potentilla anserina, pinnata. Foliola basi
terviginti, aequalia, serrata, ovata, villosissima. Caulis pedu-
losus prostratus subaphyllus, simplicisporus in racemum depresso.
Fructus ovati, tomentosi. Len.

an inter Anitra mea conferatur.

6 *Agrimonioides* A foliis caulinis ternatis, fructibus glabris Linn. S. V.

Gaede coll. 2. p. 208.

Agrimonioides Bar. Ic. 612. Col. Lymph. 1. p. 145. t. 145

Agrimonia fœmela Bauh. pin. 321.

Habitat in Italia nemoribus umbrosi humantibus.

Caulis erectus scilicet pilosus, foliis tantum ad radicem et
superne, pithamoi simplicis formi. Folia radicalia per inter
rupte pennata, foliola inferiora alterna per ultimam
opposita ovalia obtuse serrata incisae sesquipollicaria
utrinque villosiuscula exteriora majora omnia breviter
petiolata. caulina ternata vel quinquata pennata. foliola
fœmilibus sesquipedibus. Sepala ovata incisae. Pediculi
aliquot superne uniflori alterni. Petala obovata