

Agrostis

Agrosti

West

Agrostis latifolia

mantima Agrostis panicula ~~puberula~~ panicata ramulis brevissimis
foliis calycibus mutis Corabui de Mark T. Eni. pag. 164

~~Habitat in arenosis mantimis circa Nathonam.~~
Agrostis littoralis panicula spicata squale, foliis fasciatis
lati radice repente Gouan. ill. pag. 3.

Habitat in arenosis mantimis circa Nathonam.

Radix scaberrima. Culmi plures semipedales vaginis
setis. ligula membranacea. Folia involuta sesqui pollicia
na. Panicula bipolliciana. peduncululi brevis floris lineari
oblongis. Valvula calycina squales flavido purpureascentes

purpurascens A. panicula contracta elongata, rami adpressi erecti,
flosculis inaequalibus acuminatis. Sw. prodr. pag. 25.

Græm præterse panicula et foliis angustis pinnis Sloan herb. 1.

p. 115

Habitat in Jamaica.

Culmus erectus sesquipedalis. vagina foenata adnatis brevis
res. folia convoluta. internodius breviora. Panicula
tenax palmari. pedunculis brevis remoti, capillares
simplices, brevis verticillati. flosculi tubulati purpurei
nitentes. Valvula altera calycina brevior tubulata

simpliciter calycibus inaequalibus

mutica

Minutata
pubescens

Agrostis panicula contracta ^{valvula} calycis ^{apice} bidentati ^{altura} aristata
corollis mutuis vaginae punctatis pilosis

Habitat in Brasilia

gramen pedale. Vagina foliorum striata dispersa punctis luteis
infidentibus pilis reversis. Folia plana bycollicana. Panicula con-
tracta. calycis parvi squamula minuta ad basin. Antherae paniculae
Valvula calycina striata apice purpurascens. Antherae longitudine calycis
pedicelli capillares. flosculi oblongi. semina presiliis flosculi

panicoides Agrostis paniculis oblongis mutuis loricatis, calycibus be-
vispimis, Culmo setulato ramosissimo La Mart Tab. Encl.
pag. 162.

Habitat.

Culmi geniculati, folia glabra

mibi ignota

Phalariis & ranodes a La Mart Agrosti verticillata dicitur
uti A. ~~panicoides~~ ^{et elongata} paniculata. W. Genocissima ~~et hinc est~~ ^{et hinc est} ~~et hinc est~~ ^{et hinc est} coll.
1. pag 89. ii: var. elongata dicitur fuit

petiolata
latifolia

^{sub} A. panicula simpliciter elongata, floribus oblongis acutis calycis
longioribus foliis lanceolatis petiolatis
Habitat in Surinamo

gemmula fusca
Pedunculus pedalis adscendens vaginatus. Vagina laxa
fornata subvillosa, apice in petiolo simpliciter anisifera
collum depressum. Folium quadrangulum - 5 pollicaria plana
unguem fere lata glabra margine laevi. Pedunculati
longi, plures aggregati capillares flores simpliciter
scabi. flores pedicellati oblongi acuti valvula calyci
non carinata vides ope lenti carina scabi corolla
breviori. corolla bivalvis mutica altera parva longior
femen oblongum nigra utraque acutum compressi
epiculum.

Tenacissima a panicula contracta filiformi, floribus mutis linearibus, valvulis parallelis Lin - suppl. p. 107 + L. V. p. 111. Jacq. coll.

1. p. 85

Habitat in India orientali &

radice dura, esputa, culmi planibus paniculatis, tenacissimi angustissimi; glaberrimi: folia graminea Panicula angustissima: floribus adpressis. Cal. 2 valvulis linearibus. Costantibus longitudine floris. Cordilla linearis sabulata. Germen longitudine fere floris. Lin

^{mea}
~~minuta~~ a panicula filiformi C. L. V

Gramen minimum paniculis elegantissimis Bauh. pin. 2. Scheuchz. gram
40. Monf. hist. 3. p. 200 f. C. V. 2. fig. 10

Gramen minimum Dalub. hist. 425 Bauh. hist. 2. p. 465.

Habitat in Gallia, Germania

Gramen interdum ~~est~~ pollicare interdum digitale. Culmi plures
setacei ^{opalesci} basi foliosi. Tota culmi breviora filiformia
obtusiuscula ligula membranacea. ped. spica ~~est~~ unguiculata
6-9 flori. flores alterni sessiles obtusi a quibus voluteo purpurascens
rachis flexuosa

flor. spica simplici filiformi
culmi setacei

madrella A floribus racemosis, calycis valvula extenore incurva canna
apice tantum dehiscente Lin. Mant. 105 + L.V. p. 110
Habitatio Malabaria arenosa.

Culmi polinaver inferne decumbentes demum erecti, ^{vaginae testis} Solia frequen
tia secunda pollicana subulata patentissima superiore
bus erecta. ~~flor~~ pedunculus communis glaucus ~~feratus~~
nervi celli brevissimi compressi apice dilatati. glauculi lanicula
ti compressi dorsum nitidi glabri altero margine cari
nato

genus forte distinctum an cum Synthesma Walteri
conjugenda.

andropogonoides a. panicula simplicifloribus fasciatis alternis attenuatis

Culmo ramoso, foliis convolutis

Habitat in India orientali qui dedit sub nomine andropogon ^{var. natus} ^{ragha}

Culmi ramosi ~~segregati~~ gemmulis tomentosi rami ^{compressi basi}
ampla ~~est~~ ^{est} simpliciflora attenuata angustiore, striat a ~~est~~
folia convoluta subulata, Bipollinaria panicula a rami

simplicibus alternis laxa. ~~ff~~ ^{ff} flori fasciati distantes

foliari valvula calycina compressa ^{repens} attenuata ~~ff~~ ^{uniflora}
altera in ansta longiore ~~separata~~ ^{separata} corolla brevissima

mutica pediculi uti canna in cuspidebus deorsum respici
valvula minutissima ad basin floris calycis

Andropogon squarrosus panicula conferta glumis subulata
si abis her?

odorata Agrostis spica secundis congestis muticis Lour. Fe. Coch: pag 50.

Habitat ad littora Portuacensis.

Caeculus 6 pollicari, erectus tenuis foliis spiculis subulata breviter
globosa. spica terminali. Ligula serrata. vagina calycis mutica acuta
1 flor. gluma corollina subaequali calyce longior.

non vid.

glomerata A. fructu bifido glomeratis terminalibus, bracteis claratis
plumosi Walt. fl. Car. p. 59
Habitat in Carol.

non vidi.

Latentis Ag. specis bifidis latatilibus solidanis, bracteis clavatis
plumosis Walt. fl. carol. p. 59
Habitat in Carolina

non v.

Centa Ag. specis subternis umbellati: flosculis oblongis acutis, valis subaque
libus, foliis vaginisque glabris ~~Ag.~~ H. Kew. 1. p. 96

mibi ignot.

~~festucoides A. panicula patula antha inflata, calyce duplo lon-
giori basi inserta, foliis setaceis Vill. fl. Delph. 2. p. 26.~~

~~Avena monantha, paniculata, foliis setaceis, gluma caly-
cina exuperata, antha flore duplo longiore Hall. herb.~~

~~no. 147 d. 2~~

~~Habitat in alpinis Delphini 4~~

pelosa Agr. fructus digitatis linearibus, foliis margine pelosis. Retz off. 6: p 22 x
Habitat in India orientali

non vidi

mak

Cenchrus Agri. spicis subquaternis digitatis, flospulis unilateralebus alternis
appressi muticis herb. off. 4. p. 19.

Habitat ad margines vicinarum Indiae orientalis

In Calcutta basi repente filiformes, adscendentes basi ramosi semi
pedales et ultra basi vaginati: vaginis compressis striatis
apice utrinque macula fere ten. Folia convoluta glaucis
virescentia patentia bipollicaria. Spicae cylindricae raro squa-
lesiles umbellatae squamulis pollicari. rachis linearis dorso planis
subannato floribus in altero latere solitarii unbricati ovato-oblongi
acuti calyce longiori palea albepente gluma teneri compressi
valvula calycina subulata lanata corolla teneri altera
adpressa teneri altera patenti parum longiori.

Facies B. Dactyli

plicata Cyr. spica linearis multica, foliis plicatis Lour. fl. Cochinch. pag 51.

Habita in subrubris Cambomeis Inanum

Culmus sesquipedalis anceps erectus foliosus. Colea cuneolata magna
longitudinaliter plicato sulcata. Spica adpressa diffusa. Labella acuta

non vid.

Villarsii Agr. panicula oblonga, petalo exteriori villosa. antea desali. breviflora
Villars fl. Delph. 2. pag. 79 Agrosti villosa.
Habitat in Delphinatibus 4

non vidi

Calamagrostis ^A panicula incasata, petalo exteriore toto lanato apice
anfrato, culmo ramoso Lin. Spec. pl. pag. 924

Gramen arundinaceum, panicula densa viridi argentea splendente anfrata

Scheuchz. gram. 146.
Munro Hall. non 1521.

Habitat in Helvetis, Verso alpium ^{ramos.}

Culmi ^{ramos.} teteteri fructi junici. Folia convoluta elongata prope super
num prope altitudinem culmi. Panicula palmaris et ultra
radiculis longioribus et patentioribus quam in arundinaceis
Flores lonicolore vel rubra calycibus membranaceis flavescen
tes vel viride flavescens attenuato. corolla calycis parum brevior
toto lanato apice anfrato

Rothii Weldenovii Leersii diversa forte sunt a nostra

in de agr. colorata

Hall. Syn.

anandinacea a panicula oblonga, petalo exteriori basi villosa antraxae
forta calyce longiora Lin. fl. suec. 634

gramen avenacium montanum, panicula angusta & delatissimo flexio albi
icante et pappo Scheuch. gram. 507.

Habitat in Europa monticulis sylvestri glareosis juniperetis &
Asuado Hall. hist. pl. no 1372.

inter alios formas quadripedalis et bipedalis creta, folia fere anandinacea
cata, dura. Panicula contracta in spec. & formam, pithamea cum
inferior floret, illa, rem dilatatur superiore coarctata, cum superior
floreat, inferior angustata, interdum integra panicula sub florescentia
patet ante et post florescentia coarctata. Calyx floret paniculati
fusi o florescentia ante. glume calycino aequali: 20000
per un barrosi basi villosa et prope illam antram dotlem asperis
geniculatam ex feni

— coarctata

Calamagrostis a calycibus uniflora, lobis; corollis lanuginosis culms
ramoso Lin. l. V. Pl. Dan. 4. 200.

Gramen arundinaceum, panicula mollis pedicela, majori Bauh.
pin. 7. Theatr. 95. Scheuchz. gram. 122. 8. 5.

Habitat in Europa paludibus graminosis &

Culmum erectus glaber folia involuta. Panicula comata
pedicelli scabi ^{glumae} ~~valvula~~ lanceolata ferruginea basi purpureo-picta

Lanceolata Ayr.

— folius involuti

canescent. A. panicula latissima, gluma subequali, valvis mucronato aristati Weber
promissio fl. hollst. p. 10 (aundo)
Habitat in Hollstia.

non vidi

conspicua A. panicula lassa erecto patente, petali extenoni anfra reflecta Congo
fma Forst. prodrum pag 9. no 40
Habitat in nova Zelanda

non vid.

avenaceo Ayr. panicula capillari diffusa, foliis convolutis supremum
spathaceo glumis subulatis

avena filiformis panicula erecta tenuissima, calycibus
uniflori, antheris calyce duplo longioribus. Forst. prod. no 46.

Habitat in rova Zelandiae et insula paphatis

Gramen sesquipedale caetero pallide virens, Culmi vaginis
longis obtecti. Folia subulata longa erecta supremum
panicula longior. Panicula ramosa semipedalis ramis
elongatis capillaribus ~~subulatis~~ verticillatis quae laxis
si ab infimo valvula calycina corolla longiore gluma
corollina villosa altera anthera anthera dupli forata calyce
longior

Spiciformis Agrostis panicula spiciformi, flosculis brevifloris: aristis altera
receptaculo infesta geniculata longiori, altera infra apicem corollae
recta, corollis hirsutis Lin. Suppl. p. 1004

Habitat in Teneriffa

Gramen dodrantale, erectum, glaberrimum, culmis simplicissimis
Panicula coarctata tenuis, facie spica. Calyces magni, ovati, compres-
si, glaberrimi, margine membranacei. Gluma exterior major. Corol-
la hirsuta, aequalis, calyce brevior, obtusa, bivalvis. Valvula altera
basi aristata, ut videtur aristam receptaculo infestam. Arista genicula-
ta longior. Valvula altera versus apicem aristata. Arista recta brevior.
Nectarium intra corollam, breve, genitalia amplectens L. P. C.

epigeos: A. calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris Linn

P.V.

gramen anadenocicum paniculatum montanum, panicula pro
diceo viridi, semine papposo Scheuchz. gram. 124.

Habitat in Europa collibus aridis &

Culmibus basi flosculi secundi in panicula contracta subula
&

nbis

— subula calycinis flore longis

anudinacea P. panicula oblonga ventricosa ampla Linn. l. v. fl. Dan. 7-259?

Gramen anudinaceum spicatum Bauh. pin. 6. theatr. 94.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium Bauh. pin. 3.

Gramen anudinaceum, acerosa gluma, sericeanum Monf. hist. 3. pp.
203-f. 37-6-fig. 41.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis femine Scheuchz.
gram. 126.

Nota β Gramen paniculatum, folio variegato Bauh. pin. 3.

Habitat in Europa subhumidis ad ripas lacuum

Culmus 3 vel 4 pollicans uti folia glabra. Folca plana magis
flexura. gluma lanceolata acuta. Spica alba ramosa compa-
cto

colorata Ag. calycibus cinnatis, corollis glabris basi penicillis duobus lanuginosis
foliis planis l. 10. fl. O'Hon. pag 37

Arundo colorata Hort. Kew. 1. p. 116.

arenaria A. calycibus unifloris foliis involutis mucronato pungentibus

Lin. S.V.

gramen spicatum spicatum, foliis mucronati longioribus. Bauh.

per. 5.

gramen spicatum sicalinum maritimum maximum spica longiore. Scheuchz. gram 130.

Habitat in Europa et America ad littora maris arenosa &
Culmus teres bi s. tripedalis erectus glaber lavis. folia angustissima
pannicula contracta spiciformis subspithamea salvula lanicola
to

Nasha Ar. Calycibus unifloris nudis flore tubulato intus lanato multo
brevioribus; panicula secundaria nutante Retz. obs. 4. p. 21.

Habitat in India orientali

Culmum altum crispis nervis cymis folia pedalia digitum
transversum lata margine sicca vagina ore nudo. Rami
panicula capillares flexuosi glomeruli limbo tubulati anxi
stemonii. calyces corolla multo breviores.

bicolor Agr. panicula angusta erecta, foliis glabris consolutis Pers. St. v. p. 164
(anando)

michi haud nota

Plum. A. calycibus glabris margine interiorum foliorum lanoni hist. v. 14. fig. 2.

Habitat mihi ignota

mihi ignota

proicra A. panicula pedunculis racemosis erectis, floribus hirsutis
muticis lanceolatis Retz. obs. 4. p. 19.
Habitat in graminosis subhumidis Malabar

ayr

Georgia Ar. ^{und^o} Calycibus unifloris, pappi fasciculati compositi speculis linearibus
Lous. fl. Coch. pag 45 fig.

Habitat in sylvis Cochinchinae

Culmus perenni speditis, simplicis pennis nodis distinctibus. Folia linearia
to linearia. Spica terminalis composita ex speculis longis linearibus

a

Calamagrostis

non vidi

amundabos *fraxo* *frumph* *ant. lib. 6. cap. 6. fol. 2.*

Amundo *apertu* ^{foliis hexagonis} *parvula* *fricata*, *friculis* *congestis*, *ramis* *culmi* *inferiori*
bis *fraxo* *simi* *calyx* *ibus* *unifloris* *Lour. fl. Coch. pag. 87.*

Habitat in montosis desertis aridis Cochinchinae

Culmus lignosus densissimus subteris tortuosus, 30 pedalis, crassitie *lucida*
nodis prominentibus, internodiis brevibus, ^{his} *manibus*. Rami alterni, *expans*
ibus *desportibus* *arcuatis* *sub* *unif.* *Spinis* *plurimis* *crassis*, *fraxo*, *unidis*,
foliis *lineari-lanceolatis*, *parvis*, *glabris*, *stratis*, *fraxo*, *congestis* *petiolis*
congestis *foliis*. *Stem* *parvula* *erecta*, *in* *friculis* *congestis* *brevi* *desportis*,
corolla *maxima* *laeta*. *Stylus* 1. *Stymata* 2.

non vidi

Amudabor Venus Celiba d. et Rumph. amb. lib. 6. cap. 1. tab. 1.

Arundo multiceps glaberrima andri, spicis interruptis, spiculis vestrellatis
culmo duro, calycibus unispermis Thes. fl. Cochinch. pag. 50
Habitat in Cochinchina. 5

Culmus 12 pedalis, crassitie pollicis. Vexis multiceps, internodi diffu-
sus inter nodos longissimi. Folia lanceolata-linearia, 5 pollicia
vix, plana, glabra, amplexicaulia, fusca viridia. Spicis pau-
cis pedicellatis erectis, longis, compressis, spiculis subulatis sepius
umbriatis, circa pedicellum communem vestrellatis. Stylus 1. stigmatibus
3. longis

non vidi.

Anand abor fera. *Bala jangi* Rumph. amb. Lib. 6. pag. 7. Tab. 4.

Anand ^{floribus hest. v. d. n. s.} mitis panicula erecta coarctata, spicis longis imbricatis culmo
aequalis inermi calycibus 1 floris Louis fl. Cochinch. pag. 57.

Habitat. culta in Cochinchina

Culmus lignosus teres aequalis 40 pedalis, caespitibus inermi simplex, inanis,
articulatus, nodis 8-stantibus. Rami inermes, polynati. Folia majora
scula, lanceolata, striata, amplexicaulia. Panicula ~~coarctata erecta~~
simplex, spiculis longis imbricatis. Cal. 2-valvis, corolla brevissimae
lacinate. Stylus 1. Stigmata 3. villosa

non vid.

Agrostis
piscatorum. (Arundo) calycibus unifloris, spica terminali, culmo ramoso foliis
minimis lanceis fl. corth. pag. 45.
Habitat in Cochinchina.

Palmis perennis spicati, scabulatus, subplevis nodis approximatis. foliis
lanicolato-linearibus, obscure viridia, glabris, petiolatis.

Folius petiolatis

Calamagrostis

non vidi

Santa A. Venus Sanders. Aubl. fl. Guianens. Paj.

Arundo

Arundo Venus pna

Brown Amer. Jamaica.

non vidi