

Agrostis

Agrostis verticillata La Martini Andropogon lycurophus

Centa Agrostis spica subternis umbellatis, flosculis muticis oblongis acutis
valvulis calycinis subaequalibus, foliis rugosisque glabri Hort. Kew. t. p. 96
Habitat in India occidentali

alba agrostis panicula lassa, calycibus muticis aequalibus, culmo repente len. L. V.

p. 111.

gramen miliaceum majus, panicula spadicosa et viridi Pet. gram. 110. 119.

Rai Angl. 3. p. 404.

Habitat in Europa memoribus

miki hanc nota

alba Agrostis panicula laxa, calycibus muticis aequalibus culmo repente Lin.

J. V. pag. 171.

Phalaris semi-verticillata; paniculo ramis semi-verticillatis, patentibus; fructus
muticis ciliatis; foliis glabris Torrh. Deser. pag. 17. fide herb. Bankf.

agrostis sub nomine intermixta an novis, recte determinata p. aristata adest

Torrh. non alba Lin

alterius inquirendam

Distachya Agrostis speciei geminis, glumis calycinis ciliatis, valvula corollina
arista tortili

Habitat ad marginem viarum publicarum in vicinia montis Adami

honig

Caemi pedales, ramosi, erecti, filiformes, glabri, ^{villosi} superne capillares.

Folia angusta, subulata, remote ciliata, supremum pollicare
vagina semipedali.

Spica gemina, terminalis, bipollicaris, filiformes villosi. Strobili
in rachis dentato scapli, alterni.

Glumae valvula ciliata linearis; exterior parum longior, inter-
ior angustior, ciliata

Corolla valvula calycis brevior; exterior arista tortili, gluma
duplo longior

myanur Agrostis species terminalibus ternis, glumis corollae basi villosis
altero apice altero basi aristatis.

Habitat in Zeylona

Gramen pedale et ultra

Calmus felicifolius, foliosus.

Dolia subulata, angusta, pallida.

Species ternales ternis, palmatis, facie test. myanur. Glomus alteri
secundi subulati, glabri.

Calycis glumis setaceo-subulatis, ternis: interiori minore

Corolla basi pilosa: clauis valvula calycis longior aristata.

Arista altera ad basin valvulae interioris calycis longior altera
ad apicem valvulae exterioris longior recta.

alysoides & tomentosa incana foliis linearibus integerrimis caule fruticuloso
Leucogon minus fruticosum purpureum alysi-folium Barm. Lion.

004

Habitat in Europa australi maritima

Caulis pedalis semipedalis erectus, inferne ramosus: ramis confertis
veridibus aequalitate caulis, uti tota planta, tomentosa-nivea.

Folia sessilia, frequentia, ^{unguiculata} ~~ob~~ ^{pellucida}, obtusa, integerrima, crassa,
subtus convexa, supra canaliculata.

Petala purpurea, submarginata, obscure denticulata.

~~Heperi sicula frutescens filiqua~~ ^{Thunberg Sept. 1793} ~~incana~~ ^{Leucogon minus}
fruticosum purpureum, montanum emergens Bon: m. p. 2
140. t. 111.

Sub nomine Littorei a Gouanis accipi, differt enim caule fruticuloso
nec annuo, tota niveo tomentosa nec subtomentosa, folia
integerrima nec subdentata nec cum ^{clausis} ~~seguis~~ ~~Branch.~~ ad lili-
scam velata convenit optime vero cum 004. Si hic Littoreus
Cur. quod valde dubito si vero differ: hinc haec optima

Littora *O.* calycibus lineari-lanceolatis aristatis, corolla nuda: arista subterminali
recta, vel subdecumbentibus Smith - Fl. Brit. pag 70

Agrostis littoralis With Arrang. of Brit. Pl. 2. pag 129. Tab 23.

Habitat in littoribus marinis lutosis Anglorum.

Caermi basi decumbentes, geniculati, subpedales, foliosi, glabri. Folia latiuscula, plana, nervosa, ^{utrinque} margine scabra. Ligula striata, subpubescenti, minus laxiore.
Panícula erecta, bi-vel triuncialis, densa, lobata, semiseriata, ^{apice} ~~seriata~~, ~~la~~
dunculi capillares, scabri. Flores albi, apice virescentes, vel purpurascentes.
Glumae calycinis lineari-lanceolatae, patentes, subaequales, carina scabra: ~~arista~~
Aristae terminalibus, ^{rectis} ~~aristis~~, longitudine valvularum. Corolla calycis paulo brevior, alba. Arista ex apice fere valvulae majoris, recta, brevis, subinde calycem vix excedente Smith. l. c.

3 *Stacca* A. calycibus lanceolatis corolla basi aristata; aristula geniculata,
foliis radicalibus betuleis Smith. Fl. Brit. pag. 79.

Agrostis canina Bet. & Huds: Fl. Ang. pag. 30, 31.

Agrostis alpina Willd. arroy. of Br. pl. pag. 120

Agrostis betulea

Curtis Fl. Lond. fasc. 6. Tab. 12.

Habitat in ericetis andis Angliæ &

Radix tomentosa. Culmus spithameus, foliosus, declinatus. Folia pallida
viridia, glaucescentia, scabriuscula; radicalia betulea, cespitosa, erecta,
vaginis albidis; caulina solo fertile dilata, striata. Ligula alba, tenuis,
erecta, apice erosa. Panicula alba, erecta, semiverticillata; peduncul
erectiusculi, ramosi, scabri. Flores lanceolati, attenuati. Glumæ calycinis
anguste lanceolata, acuta, clausa, parum inaequalis, alba, carina
virescente, scabra, apice subinde purpurascens. Corolla calycis duplo
brevior, tenuissima; valvula exterior basi aristata, aristula calycem ex
cedente, alba, ultra medium geniculata Smith. l. c.

vulgaris. A panicula patente: ramulis divaricatis capillaribus, calycibus equalibus, petalo interiore duplo breviora retuso Smith. Fl. Angl. Brit. pag. 79
gramen melleaceum locustis minimis, panicula fere annuinaea Raii Synop.
sis 402.

Agrostis capillaris Leer. Fl. herb. 20 tab. 4. fig. 3. Flor. Dan. 163.

Agrostis tenuis panicula patente mutica, pedunculis subflexuosis, culmo erecto,
membrana foliorum obtusa Sibth. Flor. Oxon. pag. 36.

^{Fl. Dan.}
β. Agrostis canina With. Arrang. of Br. Pl. pag. 127

γ. Agrostis pumila panicula mutica subsiccunda, culmis fasciculatis erectis
Lin. Mant. 31. Lightf. Fl. Scot. 1001. uon fi. in Vitulo vol. 2.

δ. Agrostis vulgaris varietas sylvatica With. arrang. of Br. Pl. 2. pag. 133

Habitat in prati, pascuis et versuris agrorum Europæ &

Culmi erecti, glabri, striati, foliosi, altitudine varii. Folia angusta, acuta, scabri-
uscula, longissime vaginata. Ligula brevissima, cerosa, mutica, decurrens. Pa-
nicula erecta, purpurascens, alternatim semiverticillata, ramuli patentibus,
capillaribus, flexuosis, trichotomis, dichotomis et subdivisis, Coriis pilis
Flores orato-lanceolati. Calycis valvula subsquales, lanceolata, acuta, muti-
ca, patentes, basi purpureæ, margine planosæ. Petala tenuissima albidæ

Conter fl. Dan. 161. et Linn. 4. fig. 2. a With. ad canem. relata sed non Lin.

verte

externi calycis fere aequali; internis duplo brevioribus, recurvum. Antheris longitudine
corollae. Imbricatis.

B. Differt quod aristata. V. Differt culmis humilioribus et solo sterilibus, variat
corollae aristatae non raro et multum d. gaudet corolla calycisque post anthesin
elongata.

quod agrat. pallida Witheringi

glutinosa Agrostis

Habitat in Brasilia herb Thouinii

Tota villosa glutinosa, floribus exceptis, incanescens. Folia lanicolata,
tri-pollicaria. Culmi glabri, vaginis foliorum tecti. Panicula contracta
spithamea. Gloruli parvi. Antha terminalis, longa.

glutinosa Cyrostris

Habitat ad Rio Janeiro Commes. herb. Mus.

Culmus decumbens; ramosis, vaginis foliorumque hirsutus, glutinosus. Folia
lanceolata, angusta, patentia, attenuata, ^{tri}apollinaria. Panicula termi-
nalis corymbata. Glorculi purpurei, fenati. Calycis petalis longior, aristata
recta. Calycis duplo longior. Glorculi glabri. Stylus pilosus

pyramidata Agrostis

Habitat herb. ha Martini

Culmi ramosi, spithamei - Eolva lineana, angustissima. Vaginae ore villosa.
- Racemus compositus, ovatus; flosculi pendi.

Agrostis

Habitat in insula Bourbonica Commerçon Herb. mus.

Culmi erecti, ramosi, 9 latri, variete, altero latere alternatim foliis axillari-
ti. Folia subulata, subpithamea, convoluta, glabra, uti vagino. Pani-
cula terminalis, capillaris, diffusa. Pedicelli flexuosi. Floresuli oblon-
gi, acuti, glabri. Anata nulla. Calycis longitudine corolla.

habes

Agrosti

Habitat in insula Bourbonis Commeson herb. musc.

Culmi semi pedales, geniculati, ramosi,

habes

Agrostis

Habitat ad fretum magellanicum Comneson herb. mus.

Calmi simpliciter, erecti. Panicula cernitata

ovata Agrostis

^{Sodter}

Habitat herb. musci

Caumi glabri. Folia plana, glabra. Panicula terminalis, spicata, oblonga,
subinterrupta, pollicaris. Flosculi lanceolati, compressi, canalicati, margine dorsali
subdentato, aristae flosculo duplo longior.

Agrostis volucre a Thuillier

habes

Ayoni vanan Thullier
Habitat Panzi

Habes

Juncea Agrosti

Habitat in Carolina Richard

habes

lateralis Agrostis

Habitat in Carolina herb. Richd
gluma interior basi barbata multica.

Dulcis Agrostis

Subtoph.

Rubros

habes

Despar Agrosti

Habitat in Carolina Richard

habes

Agrostis indica Michaux
Habitat in Florida herb. Rich.

habes

Fed. Ass. Agronomists

96

5

racemosa Agrosti

Habitat ad Mississippi Richard
Culmi ramosi

habes

asper Agrostis

Habitat Illionai Richard

Culmi sesquipedales, erecti, simpliciter, nodos. Tota longissima, lanuginosa, pen-
dulo recurva, supra scaberima, subtus villosa. Vagina glabra, apice pilosa
Panicula contracta. Flosculi lanceolati, albi. Calyx corolla brevior
glaber. Corolla mutua

complanata Agrostis fructu umbellatis glabris, valvulis et venis calycinis anfractis,
foliis complanatis vagenisque glabris Hort. kew. 1. p. 96.
Habitat in Jamaica. 4

Chloris petraea Sw.

~~non ad.~~

adpenfons a.

stellata Agr. specis quadrifloris umbellatis, floribus
compressis, valvulis calycinis subaequalibus, foliis
oppositis, glabris. Wats. spec. pl. pag. 376.
Habitat in Ins. St. Helena.

non videt

tenuiflora Ag. ramulis simplicibus sine ramis adpressis, anthesis corolla
rurum flore conjugatis Wild. spec. pag. 364.
Habitat in America boreali 4

Stemata vgt panicula elongata finita, corollis calycis minoribus, anis
et basi petali fortiter flore longiore Wed. spec. pl. pag 366.
Habitat in America boreali

non vidi

ovata agr. petalo extenso ante apicem anfracto, panícula
ovata spiciformi corymbata Torr. prodr. pag. 40.
Habitat in Nova Zelandia

Michx cynosu

lupida Agrostis ramis panicula
spidiu spulis squalibus. Willd. ^{paucis verticillatis, calycibus hi}

Agrostis Apullani Pteris etc.

Scabra Cl. panicula varosa & varicata, ped. annulato. micro-
scopis folusque scabri Wild. Sp. pl. pag. 370.
Habitat in amer. boreali.

nubi quod

Tremula Agrostis panicula simplicis: subspicata, calycibus subquatuor
lobis corolla brevioribus, foliis rigidis convolutis & punctis
Wald-spei. pl. pag 372.

Agrostis panicula Mantz. Enc. 1. p. 60

Habitat in India. Cuvier

Microglossa

Cyperus Agrostis panicula spicata cylindrica, culmo mutante
Agrostis spicata Thunb. prod. pag. 19
Habitat in Cyp. 6 per

in eadem quam Thunbergii Cron & Di.

refractoria Acaudo. calycibus unifloris specia ster terminali culms ramis
foliis unispulis Lour fl. Cochinch. pag. 55.

Habitat in Cochinchina

Calmus pedalis ramis suis pubescentibus, nodis approximatis
Folia lanceolato-linearia glabra, petiolata omnium annu
unum mense. floris in specia terminali.

non vid.

8-1900 Post.
02 from
Munich.

micrantha Anudo calycibus acuminatis unifloris, panicula erecta densa flori-
scenta, vaginis ore pilosis La Mart. T. Enc: pag. 196
Habitat in Barbana

bicolor vna Palamagostu

Sida *Arundo* calycibus unifloris, fructu fasciculato compresso, pappi
linearibus. Linn. fl. Cochinch. pag. 65.

Habitat in fylvis Cochinchinae.

Culmus pedalis simplicissimus. Folia lanceolata linearia. Flores

novi

Spicae centi A pedale extenore antra recta finita longissima panicula
patula L. V. fl. Dan. T. 1893.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa P. B. Scheuchz. gram. 144.

Gramen capillatum Bauh. hist. 3. p. 462.

Habitat in Europa inter segetes C.

Culmi se pedales vel bipedales plures erecti vaginis striatis foliorum
tuti folia plana, scabra. panicula spithamea ped
primaria contracta ^{et} demum patens. pedunculi capillares
longi ramosi ^{et} remota aggregata vel subverticillata ut ped
celli scabri. flores glabri

interrupta Agrostis petalo extenore aristato, panicula attenuata coarctata interrupta,
det. Lin. l. V. p. 110.

Gramen capillatum, paniculis interruptis angustioribus Vaill. panf. 88.
t. 17. fig. 4.

Gramen arvense paniculatum, spica interrupta Scheuch. gram. 146.

Habitat in Gallia, Italia

~~Gramen sp. thom~~ simili agrost. spica venti ut fere tantum vana
tari. semi paniculis brevioribus inferioribus remotioribus

magellanica Agrostis calycibus hirsutis corolla duplo longioribus
petali exdonis arista recurva longiuscula La Mark
Tab Enc. pag 160

Habitat ad pedem magellanicum

Gramen sesquipedale culmo erecto simplic. Solia angusta plana
glabra ligula oblonga membranacea. Vagina longa striata
nervis

Panicula contracta. Pedunculi subtricellati capillari remoti

Rachis pedunculi, pedicelli calycibus carina hirsuti villosi

Et flosculi pauci in pedunculi. Calycis valvula subulato floran

tes divaricatissima compressa in aristam brevem deprentes.

Corolla calycis multo minor. arista calycis dimidio longior

recta

— panicula contracta, calyx pedunculis pedicellis calycibusque dorso
et villosis hirsutis, corolla brevissima arista calycis duplo longior

meliam effus. Lin Agrostis effusa La Mark peridotum Lin Agr. meli
nasperma. Candoyer. Agr. panicula. Alop. monspel. et panicula
agrostis alopecuroides

non idem

miliacea a petalo extenore anxia terminali seta striata mediolani

Lin. Spec. pl. p. 91. +

Agrosti miliacea Spec. pl. t. p. 61. n. 2. Royen Lugd. 59.

Habitat in Hispania

Culmi plures erecti glabri. Folia plana glauco viridia, ~~superius~~ ~~sub~~ striata, ~~remota~~, glabra. Ligula oblonga membranacea. Vagina striata, ~~superius~~ ~~sub~~ spatheo inferius articulo breviori. Panicula racemosa ampla floribus paucis contrisquam in a. f. a. vert. Pedunculi ad singulum dentem plures subventricillati. Pericelli capillares. Flopuli oblongi ~~pubescenti~~ ~~attenuati~~. Gluma calyptrae aequale coriaceo loricis una dorso nervosum corolla parum longiore. anxia longitudine flopulorum

— flopulis squante

alpina Agrostis panicula parva, subangustata, calyce colorato
corolla longiore, foliis setaceis ha Mart. T. Enc. pag. 166

~~Habitat in alpinis Helvetiis Aesculii~~

^{parvum}
gramen paniculatum alpinum panicula spadicata ari
statum Scheuchz. gr. pag. 140. prod. 22. Tab. 4. fig. 1.

Avena monantha paniculata, gluma calycina

panicula subintertexta asperata, anthera florali aequali Hall. hist. n.
ita valvula calycina 1477.

aequalibus corollae Agrostis alpina Scopoli. Fl. Carn. no 86.

longioribus pediculis Agrostis setacea Vill. fl. Delph. 2. pag. 76

culmi flexuosi foliis linearibus Habitat in profluviis alpium

in quibusdam Culmi plures filiformes pedales basi foliosi superne
culmo pubescente

scaphylli binodes glabri. Solia angusta plana
culmo dimidio brevior. Scabra. Panicula promun-
dentata manu vel minus elongata. Florenta patens
pedunculi 4-5 inferiores 3. qui vix cellati superiores
pauciores flexuosi rami rami rami rami
pauciflori flosculi lanceolati purpurascens
marginibus florentes. Calycis aequales corolla longior
agrostis Duplei
longior

res anthera fol in valvula extensa corolla calycina

repentis Ag. gluma calycina exaristata, arista flore duplo longiori, foliis
setaceis - All. fl. ped. no 2161.

Gramen paniculatum capillaceo folio, locustis parvis prostratis
super aristato Schumbr agr. pag 141.

Avena monantha etc. Hall. hist. fl. no. 1470.

Habitat in hujus Helvetiæ

^{festucoides} Agrostis festucoides panicula patula arista inflexa calycis duplo longiore
basi inserta foliis setaceis. Villars fl. Delph. 2. pag 76.

non vid.

Vincalis A corymbis colorati, petalorum arista seipali longitudine fere calycis,
Culmus adscendentibus Schab. spec. fe. lpf. p. 47.
Gramen caninum vineale Schumbr. agron. pag. 143
Habitat in Germania.

non vidi

Gubra Agr. calycibus squalibus lobatis, corollis infra apicem mucronatis,
foliis fetaceis laevibus Cor. herb. n. 5. 6. Tab. 4. fig. 4.
Habitat in Germania

michi haec nota

ruba Cygostis panicula parte florente patentissima, petalo extensioe glabro: aristâ ter-
minali tortili recurva Hudf. Angl. 26 ~~Eleo~~ spec. pl. p. 92. t. V. p. 110

Spamen alopecuro accedens Pluk. alm. 177. t. 33. fig. 6.

Cygostis panicula inferiore verticillatim laxa, superiora contracta Lin fl.
Lapp. 46.

Habitat in Europa boreali vulgaris 4

Panicula verticilli florentes horizontales, nondum florentes contracti quasi in
speciem, deflorata tota rubescens. Lin. spec. l. c.

canina a. calycibus elongatis, petalorum antra dorsali recurva, ciliis pro
fractis subramosis Lin. S. V. p. 1104

Gramen supinum caninum paniculatum, folio varians Bauh. pin. 1. Theatr

12.

Gramen paniculatum supinum ad infima culmorum genicula foliotum
capillarium geniculis fasciculatis denatum Scheuchz. gram. 141.

Habitat in Europae partibus humidiusculis.

Culmi basi repentes subramosi adscendentes vaginis antris et foliis an
tris vestiti teneri. Folia 2-3 remota in culmo angusta margine
scabra 2-3 pollicaria. Panicula 2 pollicaria ^{tenues elongata} contracta ^{demum}
natae ramuli coarctati ^{subopales} purpurei raris. Salvulo calycibus nitido
lanceolato margine hyalino. antra ca. ^{part} alba, flosculo duplo longiore
(medio notata geniculo fusco lenne) ^{velut} spec: calycia parum brevior

filiformis Ag. folus culmisque filiformibus, panicula approximata,
flores basi aristatis Vill. fl. Delph. 2. 103 20
Habitat in Delphinatū

non videt

cinna A. panicula filiformis secunda, ^{conspicua} ~~longissima~~ ^{recta}, ciliis
ramosis

Cinna canadensis Lin.

Habitat in America septentrionali.

Culmi teretes, ramosi, glabri rugulati. Folia linearia, ^{marginis} ~~fiat~~
ma 1-2 polliciana. panicula contracta filiformis valvula
calycine inaequali acuta corolla breviori. Corolla pubulata ~~super~~ villosa
altera valvula in ~~seta~~ aristam longa se depressa

Festuca A panicula fasciculata oblonga multicaulis, culmo obtecto foliis
brevissimis Lin Mant. 30. + R.V. pag 110
gramen Colicacium prothnum, panicula dispersa Segu. Veron. 3. p. 146. V. 3.

Festuca fig. 2.

Agrostis proterea panicula patens, spiculis quadrifloris subanastatis, culmo aspergente
obtecto foliis brevissimis patentibus Lin Spec. pl. pag. 111

Habitat Verona

Culmi pedales, adscendentes, vaginis foliorum obtecti
simpliciter. Colica pollicana glauco viridi patentibus
fascibus primis consoluta demum plana vaginis striata
glauco viridi. Panicula simplex ramis ^{scabris} pedibus pa-
tentibus pedunculis alternis remotis foliis ^{scabris} flores sub-
sessilibus lanceolatis attenuatis compositis glumis calyptra
brevis membranacea hyalina. Valvula altera corollina
anastata terminata

panicula simplici, fasciculis lanceolatis attenuatis,
calyce longioribus

~~Fest. proterea~~

bifida Poa spiculis sessilibus, ^{secundis diffinis} inferioribus remotis rectis, superioribus approximatis
recurvis

Habitat in India orientali

♀ Dignoscitur facile a reliquis specie simpliciter dodra et aliis spiculis pene
non recurvis

gramen ^{totum} glabrum, Culmo gli formi.

Spicula lanceolata, diffinis undecim vel in floris, superioribus 19
floris.

♀

hirsuta Cynosotis panicula subpucata, caule foliisque hirsutis, corollinis glumis

dorso anthesis apice bifidis Lea. Supp. p. 100. 4^{to}

Habitat in Teneriffa

Differtur hirsutis. Panicula Alopecuri panicci. glumis apice fessis

non vici

panicca A. panicula subpinnata, ramis ramulisque fasciculatis valvulis caly-
cinis alteraque corollina angustis: angusta corollina brensfina Hort. Kew 1. p.
pag. 94.

alopet: paniceus et monspeliensis hinc revocatus in horto Kewensi.

Bambos A.

исполнен генерал

verticillata Agrostis panicula contracta interrupta oblonga, flosculis
subulatis glumi calycini aequalibus, culmi ramosi

Habitat in Anglia, Gallia Barbaria

Culmi pithamoi vel bipedales inferne ramosi et ramosi
ex vaginis mediis culmi, vaginatis vaginis tertiis

Folia sesquipolliciana vel palmaria plana, bipi-
selennique undulata fenestrata scabra. Ligula membran-
acea. Pedunculi plures verticillati inaequales sive
usque ad basim floribus tertiis, inferioribus et culmo adpres-
si florentes patula inferioribus remotioribus brevioribus
flosculi subulati et glumi calycini aequalibus ope-
rentis subpalescentibus. Petala calyce breviora mutica
varia flosculis pallidis et intense viridibus

Agrostis verticillata panicula recta verticillis radiatis
rigidis interrupta, flosculis muticis Willd. fl. Delph
Ton. 2. pag. 74

hyemale A. panicula diffusa verticillata foliis teretibus, culmo erecto
Cornucopiae hyemale Walt. fl. Carol. pag 73.
Habitat in Carolina.

non vid.

Cornucopia Agr. panicula lano mutica, calycibus acutis
corolla longioribus, pedunculis pabris Ca. Marsh. T. Caryop.
162.

Cornucopia perennans Walt fl. Car.
Habitat in Carolina

4
pyramidalis Agrostis panicula patente parva pyramidalis
calycibus corolla longioribus, vaginis ore pilosis La Mart
Tab Enc: pag. 167.

Habitat in America meridionali Desf. Ant. 1788.

Culmi plures

~~namque~~

ciliata A. panicula mutica, gluma calycina angulata ciliata Thunb.

sup. p.

S. V. p. III.

Habitat in Japonia.

agrostis

non vid.

palustris
gigantea
gigantes

elongata

A. panicula seu contracta ^{florente patula} ~~superne~~ ^{superne} ~~patente~~ ^{patente} ~~prima~~ ^{prima} pedun-
culis verticillatis, ^{Holste} culmo basi ramoso

Habitat in anglia, ^{Holste} holsatia in se legi e Germania Schuder
Culmi saepe bipedalis et ⁵⁻⁶ ~~alt~~ foliosi basi ramosi geminulis in
fractis vaginis foliorum texti. folia lineam ^{foliorum} ~~foliorum~~
non repantes. folia angustissima, apice ^{venis} ~~venis~~
flavescentia vagina longa ^{fracta} ~~fracta~~ ligula lanicolata
hyalina integra. Panicula palmari vel semipedali
ramosissima. Pedunculi 10-12 ad spagulum dentem remoti
siaberrimi. pedicelli sub flore ⁱⁿ ~~in~~ ^{raspati} ~~raspati~~ ^{ore} ~~ore~~ ^{dentis} ~~dentis~~ ^{vellophi} ~~vellophi~~
glumo calycino aequali, pallide ^{viridi} ~~viridi~~ ^{vel viridi} ~~vel viridi~~ ^{subpurpureo} ~~subpurpureo~~
si ^{inter} ~~inter~~ ^{calycem} ~~calycem~~ ^{subulato} ~~subulato~~ ^{si} ~~si~~ ^{dorso} ~~dorso~~ ^{cannato} ~~cannato~~ ^{canina} ~~canina~~ ^{oculo} ~~oculo~~ ^{arma} ~~arma~~
to ^{seu} ~~seu~~ ^{spumoso} ~~spumoso~~. Corolla glabra, calycis duplo minor ^{mutica} ~~mutica~~
canta brevissima in petalo exteriore ^{proth.} ~~proth.~~ ^{quod} ~~quod ^{superior} ~~superior ^{esse} ~~esse ^{denti} ~~denti~~
intermediis valvula tridentata. us~~~~~~

superne primis
florens

Agrostis gigantea panicula parte superiore primis florente patente prima, caly-
culis ^{superne} ~~superne~~ ^{hispidis} ~~hispidis, petalo exteriore glabro, dorso ^{superne} ~~superne~~ ^{subanfrato} ~~subanfrato, culmo erecto.~~~~

71 Roth. fl. germ
2. p. 83

Agrostis palustris ^{Cast.} ~~Cast.~~

Agrostis alba ^{Leesii} ~~Leesii~~ fl. herb. Tab. 4. fig. 8

apenn. Ag. panicula contracta: saeculis lateralibus albernis fructis apenni
p. luc. apenni Weber suppl. fl. holst. p. 4
Habitat in Holstata

michi haud satis nota

St. neta Ag. panicula fructa pauciflora, culmo erecto

Hall. bot. purp. no 1476

michi ignota

Cormandeliana Ag. panicula ovata patente, pedunculis simplicibus, floribus
secundis muticis, calycibus aequalibus acutis nitidis Retz. off. 4. p. 19.
Habitu in a ridis duni Malabano.

vellosa
pubescenti

Cl. panicula capellan' patentesima, flospulis oblongis obtusis pilis
culmo ramoso vaginis folisque vellosis pubescentis

Habitat in India orientali

Culmi bipedales et ultra inferne ramosi et vaginis foliorum
recti superne nudi striati seretis flavescens glabri
folia plura 3-4 pollicina vix semicircum lata, margini
habra utraque e villis longioribus uti et vaginis vellosa mollia
subcanescentia. Panicula fistulosa pedunculis
alternis longis, pedicellis que glabris, capellanibus, flexuo-
sis. flospulis oblongis valvula aequali. Squamae longitudine
corolla squamula minusima oculo armato videntia ad basin
flospulis an regitur Pan. species cum quo habitu convenit uti
et cum milis capellane.

tenuis Ag. panicula patente, pedunculis subflexuosis, culmo erecto, ligula
obtusa Sibth. fl. ox. p. 37

Græmen miliæcum locustis minimis, panicula fere arundinacea
Bray Syn 402.

Agrostis capillaris fl. Dan. tab 163.

Habitat in Europa &

Rubra A. calycibus aequalibus lobatis, involvis infra apicem mucronatis foliis
setaceis Lær fl. Herbom pag. 21. tab. 4 fig. 4.
Habitat in montopio Herbom

mili cynota

Capillaris panicula capillari patente, calycibus subulatis aequalibus, hyspi
difficili colorati, floretulis mutuis Lin. f. V fl. Dan. tab. 163.

Agr. nor. Act. Holm. 1787. p. 245 Smith. w. 3. pag. 54. Tab. 574

Gramen montanum, panicula spadicem deliciae Vauk. prodr. 12.
pin. 3. Scheuchz. gram. 129.

Habitat in Europa pratis

Culmi digitales et altiores, ~~capituli vel interdum~~ caespitosi
filiiformes basi adscendentes vagina foliacea unica
in culmo folia radicalia intercedunt vero sima glauci orn
dia. Panicula sesquipedaliani patenti ramosa ramis fili
formibus. floretuli obtusi immixti purpurascens. valvula caly
cis lineares aequales corollinis parum longiores

Secundum
sic hinc in Hispania lectis
Smithii majores foliis parum latioribus ceterum omnino
eadem

Holonefesa A panicula ramulis patentibus muticis, culmo repente calycibus
aequalibus Lin. l. V

gramen caninum fupinum minus Scheuchz. gram. 120

β Gramen radice repente, panicula densa spicata Spedicio vindi, locustis
etiquis muticis Scheuchz. gram. p. 130

Habitat in Europa β in arena mobili γ

Culmi plures erecti. Tenues, inferni pedales et parum ultra. geniculi inferio-
ribus. Internodi repentibus, basi subbulbosi coherentes ramosi. Collei
angusta plano sepe inferora plerumque emanida. Panicula 2-3
pediculis primis contracta demum patens, laxa. Pedunculi capul-
lari; pedicelli breves undulato-divariati. Flosculi parvi vindi per
nursipiente ~~valde~~ glumae calycino aequali corolla parum longiore

pannula a pannula murica secunda, culmi fasciculati erectis Lin.
Mant. 31. 4 G. V. p. 111

Gramen minimum palustre, pannula radicea delicata Tenacifolium
Scheuchz. 2. gram. 131.

Habitat in Flandria, Suecia, Helvetia &

Palmi plures cespitosi digitali vel paniceo ultra filiformes
erecti folio unico vaginato. folia plerumque radice uti
vagina striata angusta, ^{ut supra} sequi pollicari plana pannula
primam contracta deum patent peduncul brevis inaequalis
reticulata subramis flores parvi basi purpureo. apice
apice flavescenti valvula calycina aequalis

Ustilago arrost. Holomysa obs. de Ehrh

mutabilis agr. panicula pendente, foliis radicalibus lineariibus congestis,
caulinis planis, culmo declinato Sibth. fl. Ot. p. 36

græm superuum caninum foliis varanis Bank. jun. 1.

græm paniculatum superuum, ad infima culmorum gemmula
foliorum capellanum foliis Donatum Scheuchz. agr. t. 3

^{fig. 9}
Habitat in anglia 4

michi ignot-

areali A. Calycibus coloratis, petalorum antheris dorsali longitudine fere calycis,
Culmi descendentes Schreb. fl. bor. pag 47.
Gramen caninum areale Scheuchz agr: p. 143.
Avena monantha panicula spissa, antheris paullo flosculis superante
Halli hist. stir. p. 1401.
Habitat in silicibus Reppa.

affinis canina

in h. ignota

tenuifolia A. panicula patula, culmo ramoso foliis stricis
habitat.

Chumacher Holber

Gramen pithamoum interdum albus. Culmi plures, alternati
tam ramoti filiformes. Rami frequentis folia frequentia an
quid hinc sive glabra patentia. Solvula calycina aequales subula
to purpurascens. corolla longitudine calycis mutica

altissima A panicula corymbata, culmo erecto duro.

Cornucopia altissimum Walt. fl. Carol. pag. 74

Habitat in Carolina.

non vidi

Sylvatica Agrostis panicula coarctata mutica, calycibus aequalibus: virginis corolla
brevioribus, fasciatis duplo longioribus Lin-Spec. pl. pag 1665. S. V. p. 111

Hudf. Angl.

Gramen melaleucum sylvestre glumis oblongis Rai angl. 404.

Habitat in Anglia sylvis humosis

Secundum Poll. affinis est stolonifera et capillari

michi non nota

mexicana a panicula oblonga congesta, calycibus corollisque aequi
natis subaequalibus muticis Lin. Mant. 31. + L.V. p. 111.

Habitat in America calidioribus

gramen viride glaucum. Culmi numerosi, pedales, laevissimi, erecti. Ramis
vix vix. folia margine scabra parva, ligula truncata. Panicula
viridis non patens, floribus numerosis concisatis scabris
Calyces sulcati subaeuales. Corolla pap. pilosa, longitudine
calycis

cochinchinensis Agrostis

Agrostis indica Lour. fl. cochin. pag. 49 et de ~~sa~~ Lym. Plukh.

Habitat in Cochinchina.

Caules 1 pedali simplicis sumus, teres foliosi, prorepens. folia
subulata. Panicula terminalis coarctata cylindrica multica
racemi alterni breves erecti.

non vidi

indica Ag. panicula contracta, racemi laterales erecti alterni

mibi ignota

plicata Agrostis foliis plicatis, spica linearis multica Lour. fl. Cochinch. pag. 51

Habitat Cantonum Sincensis.

Calamus sequi pedalis anae per se in foliis. Folio magna plicata
longitudinaliter plicato-furcata. Spica diffusa flospulis adpressis
anthera nulla

2223 pungens Agrostis panicula contracta mutica, foliis in voluta rigida pungens
Agrostis pungens panicula contracta mutica, foliis involutis
rigidis pungentibus: superioribus oblique oppositis culmo ramo.
Lo Schreb. Gram. p. 2. pag 46. tab 27. fig 3.

Phalaris diffusa; Agrostis virginica, perennans repentibus, foliis involutis
panicula mutica, culmatis, panicula spicata Tarsh. Difer. pag 20 no. 69
crat. foliis muticis, involutis, culmo ramo repente
Culmus repens, ramosus. Rami floriferi obliqui, inferne ramosi,
ramis ramo unico superne, vagina foliorum testi.
Boiss. Esper. p. 17.

Habitat in alpinis, Arabia et orient.
Folia alterna, binis semper approximata, bifaria, involuta rigida
pungentia, glabra, seriata, intermedia longiora, sepe bipollicia
na; summa brachia caum, reliquis parum ampliat.
Vagina foliis brevioris, subulnata, fauces utroque barbato
ejusdem sepe latitudinis ac folia.

Panicula contracta, subpollicaris.
Valvula calycinis lanceolata, carinata, glabra, inequales: unius
longitudine corollae, altera duplo brevior.
Corolla valvula aequalis: anterior substantia et figura calycis,
altera tenuis, membranacea, genitalia involvens

19
3229

Q figura ^{Rel. Schreberi} panum recedat: panicula minus coarctata, foliisq;
raris oppositis. ^{subito} ~~Pro~~ ^{at} ^{mentana Agrostid}
In herbario Linnei videtur variata ~~Agrostis~~ ^{Stolonifera maxima}
~~in herbario Linnei aservatur~~

Agros dipungear radice repente, foliis subulatis
nydi suboppositis Pavar. 42 p. 7. v. 111
gramen paniculatum mantoum nabonense radice repente
Tournef. fide herb Tournef.

virginica a panicula contracta murea, foliis involuto subulatis rigidis
exstantibus Clauf. Voy. 507. Lin. S. V.

Habitat in Virginia

Similis pungente culmo ramosisimo foliis 3-4 pollicibus
ora pan. flofculi lacini oblongi acuti pallide cum tinctura rufes-
cente interdum. Gluma calycina altera panum brevior
corolla longitudine calycis

lit. oralis La Martk fide herb. La Martk.

gaudet

Obs. Solias involutas ^{genuit} plurima gramina, quo ad littora maris mediterranea
 neque inque collibus aridis Hispaniae et Barbariae observari, facie saepe tam
 diversa ab aliis ~~quibus~~ in loco fertiliori nata, ut in autum facile pedicent.
 Pro specie distinguenda certe igitur folia involuta non sufficiunt, nisi alio nota
 simul adfuerit. ~~Pultum et Quapropter~~ ~~in graminibus~~ varia foliis involu-
 ti ^{partem} cultura exploranda ^{vel} ~~ut innotesceret~~ ^{illa}, num revera ab
 aliis jam notis differunt, ~~et si in his~~ transeunt, ~~et demum~~

panicula Agrosti panicula parva subpinnata, foliis convolutis pen-
dulis bifariis radice repente La Mart. T. Linn. pag 16 f.
tab. 41. ¹⁷⁷²
Habitat in Anpula francica

Cum ramosis sumo diffuso tereti ramis filiformibus vaginis
foliorum ^{dist.} secti. Solca bifaria subulata convoluta glabra
ix polliciana. ~~Panicula~~ ^{calyx} Panicula pedunculata
la picea polliciana glumis lanceolata acuta equaliter
florescunt mutici

panicula pinnata, foliis subulatis convolutis bifariis, radice
repente

mus

agr. ex eadem pice matrella non cum matrella La
eadem cum matrella ha creditur omnino diversa

Cittorali Agrost. panicula contracta subpucata calycibus
inequalibus, vaginis foliorum barbatis La Mart. T. Enc
p. 164.

β. ramis panicula longioribus

Habitata in Armenia meridionali β. in Senegal.

Sergeni cum her
non esse