

Agynceia

1. impubes A. foliis utrinque glabris
2. pubera A. foliis subtus tomentosis

Oxyria coriacea

pag. 94. Tab. 27.

Habitat in Sylvis Pegu 3

Artuscula. Stamini: recti, tenues, ^{antheris} canaliculati, a basi petiololum in anthera decurrente
nudi; Tenelli pubescentes. Stigma ramosa plura, alterna, horizontalia, petiolo
4a, lanceolata, integerrima, obtusa, nuda, internodiis multo longiora. Petiulus
brevissimus, gibbus, glaber. Stylus tetralobus, geminis, caducis, subulatis, curvis. Flores
axillares, parvi, masculi 10-12. pedunculati, flavi, nutantes, misti foemineis tot:
dem, sessilibus nudis, erectis. Pedunculus filiformis, pubescens; petiolo longior
♂ Cal. 6-partitus, extus pubescens: lacinis oblonga, obtusa, tres externae reflexae, internae
res patentis. C. 0. Anthera plures, lineares, adnatae rudimenti restitui, oblongae, acumi-
nato. ♀ Cal. 6-partitus: lacinis subulatis, geminis ante amplectentibus, persis-
tentibus. Cor. 0. Germen orbiculatum, magnum, depressum. Stylus crassus brevis. Sty-
gia cavum, magna ^{dentato} ~~venis~~ Capsula magna, orbiculata, depressa, umbi-
licata, 9-12 sulcata, 9-12 loculari: loculis medio dehiscentibus. Semina 2-3
in singulo loculo, verticalia, angulata, subovata, apice circumloculo centrali
affixa

orbiculata Agyncea

Agyncea impubes Memoire de Caraff. Soc. hist. nat. Paris.

Habitat. herb. Rusch.

Caulis depressus, statim a radice ramosus: rami ramuleque patuli. Stipulae 2 minuta membranaceae, subulatae. Flores minuti, subpedicellati, omnes ad posticam quidem ramorum praeoniam, plures: paucissimi ♀ in terminali fasciculo, caeteri majores, coeteri masculi. ♂ Cal. rotatus, bifidus: laciniis rotundatis, denticulatis, intus quasi duplicifurcis, ob appendicem folium e perispermio obrotundatam et pyramide laciniulas intus eisdem lobis loci apice liberis excurrentem. Stamina 3. 1 ad lphm, e centro calycis columella cylindrica, apice antheriferis. Anthera ad natam ♀ Cal. persistens, subimpanulatus, patens, bipartitus: laciniis rotundatis, breviter acuminatis, oculo armato denticulatis, 3tus interioribus minus patentibus. Prothellum: gemma in fundo calycis sessile, subovoides, tripulvinatum, vertice truncatum, area truncaturae ambitu rotundato. Ingonia, margine obtusato, quasi umbilicatum excavata intus cavitate trigibbosa. Styli tres e centro cavitatis geminis trifariam patuli et inter gibbularum recumbentes, sursum paululum incurvati, sulcis longitudinalibus etiam lateribus convexi, deapertentes in stigmata duo, apice recurvata, obtusa. florum foemineis perfectis solito ad se occidit nonnulli imperfecti dusepi, loco geminis imitamur quibus depressissimum et non excavatum. Capsula subinadeco-globosa, obtusa triquetra

apicetrigono excavata, subemmutata trilobulata, loculis dispersis, nuculis oblongis arista
sem incurvis, intus angulo interiore subulnato exiens, excipulo canaliculato. Testa
rugulosa, scabriscula, castanea. Latentes subciliacei, tegumentum proprium mem-
branaceum. Embryo undique inclusus, albumine albedo candido, carnosulo, inverso.
Radix supero, cylindrica. Cotyledones duo, oblonge, plano adpresso. Capsula ma-
tura in 6 partes funditur. Richard

impati A foliis utrinque glabris Mant. 296 * S. V. pag. 271.

Habitat in China ^{sub}
Tortex erectus ramis ultimis tomentosis. Folia alterna bifida
subpetiolata elliptica, vix acutiuscula integerrima, polliciana
utrinque glaberrima, subtus glauca venosa. Flores axillares
plures congesti. Pedunculi uniflori tenuissimi, longitudine floris
masculi flores inferiores minores glabri. Feminei flores superiores
maiores pedunculis tomentosis lina

Plukh. n. alm. 35. tab. 3 68. fig. 1.

Descriptio a Ventenat, ^{breuiter} conuulsi
caus. descriptio ⁱⁿ actura
an Bradlou ^{mihi} haud
nota

pubera A foliis subtus tomentosa Mart. 296. & LV. p. 2571.

Habitat in China &

Truncus erectus, ramis pubescentibus. Folia alterna bifaria
subpetiolata, ovali-oblonga, obtusa integerrima, sesquipollia
vix, supra nuda subtus tomentosa. Flores uterque procedente ut
facie diversa