

Cilanthus

♂ Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Stam. 10.

♀ Cal. et Cor. ut in mare. Germina. 3-5. Styli laterales. Peneicarpia membranacea, sperma

glandulosa A.

villosus Clitanthus foliis impari pinnatis, pinnis oblique cordatis basi dentato
sinuatis.

Habitat in India Orientali Wong

Stemli micano tomentosus. Folia 7 ve: foliola ^{sesqui pollicaria} opposita, attenuata, extre-
mitate integerrima, basi dentata; dentibus apice glandulosis, obscura
nervosa, utrinque villosula. Panicula ramis micanis. Samara lanice-
lata, sesqui pollicaris, utrinque acuta, glabra

~~glandulosa~~
~~isifandra~~ Alanthus Desfont. in act. pans. 1786. p. 269. tab. P.

Rhus frutescens foliis alatis: foliis oblongis acuminatis ad basin subrotundis et dentatis Ellis in Philof. Trans. vol. 49. p. 070. t. 25. fig. 5
et vol. 50. p. 446. t. 17.

Rhus coccodendrum Ehrhart in Harv. mag. 1783. p. 227.

Habitat in China & Alois

Arbor ex celsa ^{suave} folia pennata cum impari 5. jugis. foliola bre-
viter petiolata opposita ovata basi attenuata basi altero
latere parva breviora dentibus utraque 2-3. ^{subangulatis} superiore integerrima
extrema bipolliciana interiora minor, glabra venosa
Petioli canescentes. Racemi terminales supra axillares pediculis
et sparsi ultimi subumbellati. Touctus lanceolatus glaber
longe pollicaris.