

Aira

area aquatica

pedicelli microscopio vixi tuberculis minutis adpressi tamen non scabri. flores
geminii in proculo calyce glomerati lobis lanceo clavato carinatis.

Heppuni vulgaris

Caulis erectus semiplicis semis inferne radicans glaber coarctate penno anserina

Folia sessilia ~~longa~~ inferne fere supra ¹⁰ glandulati linearis obtusiuscula
glabris intermedia unguiculata inferiora et superiora breviora
obovata sessilibus et singula axilla.

Calyx et corolla nulla

Stamina filamentum unicum ex apice geminis

Stylus unicus, pelopisculus germen oblongum apice excavatum pro insertione
filamenti.

in floribus superioribus stamina nulla. In aliis vero omnes hermaphroditi.

Veronica hederifolia

Semina duo rugulosa erecta convexa intus planiuscula apicibus subnatis
medio perforatus uterque linea elevata per medium current.

Spinulos Arva
denticulatum Panicum racemis compositis, spiculis globosis villosis, foliis ovatis
^{Spinuloso}
ciliato - denticulatis, vaginis mucronatis hispida

Habitat in India orientali

Pulmi pedales, stricti, erecti, nigrescens, simpliciter, teretes, glabri,
striati. Folia promota, unguiculata, patentissima, supra multiner-
via, nervis subhispida, subtus striata, glabra, acuta, marginibus ^{et} tuber-
culis minutis in spinulam rigidiusculam acuminato ciliata. Va-
gines foliis parvis breviores, flavescentes, striatae, et punctis parvis seti-
geris inter strias benicatis mucronatis hispida[#]. Rachis tripollicaris,
angulata, glabra. Pedunculi capillares, flexuosi, glutinosi, teretes, pa-
tenis simi, inferiores semipollicares, ⁴/₂ - ³/₄ flori, sursum sensim minores
2-1 flori. Spicula pedicellata, remota, solitaria. Valvula calicina ^{gluma} sub-
rotunda, extus convexa, villosa, intus concava glabra. Olosculi hemispha-
rici, valvulae exteriores pubescentes. Styli 2, plumosi

Suprema glabra
lavis.

mutici

compacta CLEM

Habitat monte video Comerson herb. h. s. f.

Culmi sesqui pedales, geniculati, infracti, glabri. Folia angusta, longa. Panicula terminalis coarctata, interdum interrupta. Spicula parva, ovata. Flosculi glabri. Corpore flarescenti nitido. Gluma inflata.

nitida Aum

Habitat in Carolina herb. usq.

Folia filiformia. Panícula patentissima. Pedunculi verticillati; simpliciter
flores geminati, alter seplis. Spicula lanceolata, acuta, fusco nitida, antherae
la

ambigua Lisa

Habitas

Richard

rates

transpares. Cura?

Habitat

herb. Lus.

Caesuli plures, erecti, sesquipedales, glabri, subramosi. Folia convoluta, glabra. Panicula patens. Pedunculi flexuosi. Flocculi parvi. Calycis valvulae obtusiuscula, patula, biflora. Flocculi longitudine calycis: valvulae mutuae. Semina nigra acutata. Anisotricha, calyce longior patens. Holcus

melicoides Arn

Habitat in Canada Herb. Querc.

Culmi glabri, Tenues, pallide virentes. Folia filiformia, culmo, utroque
panicula pauciflora, corymbata. Spicula oblonga, acuta acuta. Calycii
valvula obtusa, hyalina. Corolla valvula villosa. Antha calycis longior
terminalis

Flavescens cum

Habitat in Canada Michaux herb. Guss.

Culmi erecti, sesquipedales, glabri, simpliciter. Folia plana, angusta, Panicula
angustata, subsimplex. Flosculi flavescetes, acuti, basi pilosi. Antha nulla.

Aira

Habitat ad fretum Magellanicum. Comraesf. herb. fusc.

Facies omnino Aira flexuosa. Culmi erecti, sesquipedales, glabri. Solia
filiformia, 2 3. in culmo. Panicula laxa, angusta. Pedicelli flexuosi
si. Specula fusca, apice argentea, lanceolata. Floresuli basi villosi
longitudine calycis. Anthera calycis longior

involucrata Acaia panicula patente, basi setis involuata. flosculis muticis.

Cavan. ic. 1. pag. 33 Tab. 44. fig. 1.

Habitat in Hispania ☉

non vid.

articulata Aera calycitani ²flosculi longiore, arista ad bas corollis
basi aristatis arista inferne villosa

Aera articulata paniculata, calycis flosculo longiore
arista villosa, arista medio nodosa & basi glumae procedente
Defend. fl. Atl. pag. 70 tab. 13.

Gramen panicula miliaee, locustis minimis Tournef
inst. R. Pl. 522.

Flat stat in arvis Barbano ©
an ab Aera canescente diversa

Ausa

Capillacea capillacea panicula capilla cea effusa maxima, flori-
li muticis calycis longioribus, altero pedicellato La Marti F. Enci-
roy 1771.

Habitat in Carolina

non vid.

1861. Ausa vesperifera hinc altissima La Marti

altissima cum folio plano striato appeni, pan

grandiflora A. panicula diffusa floribus glabris mutis nutantibus

Habitat in Dahl sub nomine Melica

Flores tantum geminae absque rudimento tertii. Panicula
diffusa pedicelli capillares calycis longitudine flosculorum per
parapetala flosculi laevi muti.

an Melica capensis Kunbergii

pyramosa A. panicula racemosa foliis subulatis floculis anfractis

Habitat in Hispania

Caesum caespitose longitudine digiti minimi vel pollicaris

Folia convoluta unguicularia Radiculis solitariis vel geminis
caespitose floculi corpa anfractis antra calyce brevior Calyx lon-
gitudine floculorum valvulis apice auris nitidis auro caespitose

non modo progenies Coii

cane scens A foliis stratis - summo spatheis paniculam includente infer-
ne obvolvende Lin. Spec. pl. pag. 974 Flou dan tab. 1023
Gramen foliis junceis oblongis, radice alba Bauh.
monf. hist. 3. p. 200. f. 10. 3. fig. 10

Gramen prostratum variegatum Bauh. pin. 5.

Gramen foliis junceis, radice subulata Bauh. pin. 5: Scheuchz
gram. 242.

Habitat in Scania et Australiori Europa arvis arenosis ☉

Calmi plures capiti filii formis basi saepe gemmulati semipedales
glabri internodii inferne ^{virescenti foliorum.} ~~ter.~~ Solia internodii
breviora. Panicula primum ^{plurima} ~~contracta~~ demum patens. Arista
in medio cincta denticulis, infra crispior fusca, supra tenuior et laevata
albida

Gramen a sabulatis aquitanis paniculatum capillares folios maximum

45 pubescens Aira panicula spiciformi oblonga, glumis ciliatis, seginis foliisque
villosis
gramen typhenum maritimum tomentosum, longius spicatum Wandl
Fr. 717.

Phalaris calycis divaricato, plano, ovato, ciliato, gluma florali in
teriori bidentata Hall. app. ad Scheuch. Agrost. pag. 60. n. 69.

Phalaris panicula ovato-cylindrica spiciformi, glumis ciliatis
germ. fl. Gall. prov. pag. 77. Tabl.

Atopercanis littoreus All. fl. Poen. n. 2151.

Phalaris pubescens Poir. fl. p. 140.

Legi per sem in arid. arenos. Tur. et Neapoli

radix fibrosa. teretes, basif. ramosi

culmi plures, pedales, inferne plenumque geniculati, infracti,
articuli internodii bi. tri. pollicariibus, ultimo

longiore, vagina foliorum tecti, inferne super ramosi rami
simplicissimi, floriferi, culmo triplo breuiore
folia attenuata, bi. tri. pollicaria, subtili hinc strata, et magis pulis
molliter villosa. vagina strata, longitudine foliorum, villosa,
superiores glabrescentes.

panicula terminalis, villosa, primam oblonga, deum elongata,
bi. tri. pollicaria vel parum longior, crassitie digiti intermedii
pedicelli brevisimi

arundinacea Aca panicula oblonga secunda multica imbricata foliis planis
Linn. h. v. p. 111
Gramen orientale paniculatum portulacica semine Tournef. Catoll. 39

Habitat in Oriente herb. Tournef.

Culmi erecti, teretes glabri. Scala involuta, scabruscula, panicula
magna, patentissima. Corolla calycis longior. Salsulis fructibus
an potius agris?

villosa A. foliis subulatis, panicula elongata angustata, foliulis sesquial-
teris hirtis angustis: anthera recta brevi. Lin. Suppl. p. 109 7
L. S. p. 112.

Habitat ad Cap. 6 p. 1

Radicis testis squamis ovato-oblongis, villosis. Panicula terminalis
villosa. Calmus glaber. Folia subulata, plana, remota: vaginis sepe
simplicibus et ramosis aggregatis. Calyx bivalvis scanopus glaber, obova-
tus biflorus. Flores magni ferruginei: alter longior craspor herma-
phroditus; alter angustior substerilis. Corolla hirsuta, terminata
anthera recta, corolla brevior. Lin.

non vidi

alguna a flosculis subulatis, panicula densa, flosculis basi pilosis aristatis; aristis
brevis L.V. M. Dan Tab. 961 act. sci. hist. nat. 2. 1. pag. 367

Gramen avenaceum capillareum, seminibus glumis argenteis vix
aristatis, foliis angustioribus Scheuchz. grass. 222.

Habitat in Alpibus haemorrhoidis, Germania. 24

Culmi subterrestres, ascendentes, semipedales glabri, inferne foliis
coloni brevis procumbentes. Efficia plerumque radicalia, duo in culmo
canaliculato subulata, sesqui polliciana plana, glabra. Vagina striata
superior folio longior. Panicula primam contracta coarctata de
mum patens. Pedunculi recti capillares. pedicelli pauci
sunt ad centem pilosi. Flores ovati acuti, purpurascetes; glom
bi basi pilosi dorso aristati arista calyce brevis

Canaliculatis basi pilosis dorso aristatis arista calyce brevis
foliis linearibus canaliculata plana

flexuosa a foliis setaceis, culmi subnudi, panicula divaricata, pedunculi flexuosi
fo. Lin. S.V. fl. Dan. 1. 157.

Gramen nemorosum, paniculis albis, capillaceis foliis Bauh. prod.
14. per. 7. Mon. bot. 3. p. 300. f. D. 4. 7. fig. 9.

Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angustissimis,
lobatis splendens aristatis Scheuchz. gram. 210. t. 6. fig. 1.

Habitat in Europa montibus, rupibus &

gramen pedale et ultra, glabrum. folia setacea plerumque radicea
culmi vagini breviora. Panicula pauciflora. Flores nitidi, dorso arista
ti: arista & calyce duplo longior, basi subpubescentia pedunculi partiales
inferiores oppositi, reliqui alterni. Arista calyce longior

capitata a foliis planis panicula patente, petalis basi pilosis antherisque
anthera brevi recta l.v. fl. dan. 4. 240.

Gramen segetum panicula arundinacea Bauh. pin. 3. Theatr
3. s. Scheuchz. gram. 244.

Gramen agrorum, latiore arundinacea comosa panicula Monj.
her. 4. 3. p. 10. 8. 5. fig. 17.

Habitat in Europa praevalens et fertilibus 4

Gramen bipedale et ultra, Culmus erectus glaber basi interdum geni-
culatus. Folia plana linearia & longitudine vaginorum. Pani-

cule palmatis et ultra. Pedunculi pariter seticillati 5-4.
supra oppositi. ^{panicula} ~~Elaphium~~ lineari obtusi angustiores quam in reliquis
anthera brevissima

montana a foliis setaceis, panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis & antea
tertili longiore. Lin. 1. V

Gramen avenaceum capillareum, minoribus glumis Bauh. pin

10.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capillareis brevi-
tus, locustis purpureo-argenteis et aristatis Scheuchz. gram.

216. t. 4. fig. 16.

Habitat in Europa alpina &

Culmi subscapitosi, spithamei glabri. Folia plerumque radicalia
setacea, unicum in culmo radicalibus latioribus subspithameis, vagina
calmum tegens. Panicula digitali contracta coarctata ^{acuta}
et pedicellis parum flexiosis. Spicula lanceolata argentea antea
calyx duplo longior

Subspicata a foliis planis, panicula spicata, flosculis medio anfractis: an-
fra reflexa laxiore fl. sp. 69 + fl. Dan. 4. 220

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile, locustis
in spicam collectis varicosis anfractis Scheuchz. prodr.
24. 4. 6. gram. 221.

Habitat in Alpibus Europae 7

Culmi palmares vel semipedales erecti foliis geminis ^{lobis} ^{parvis} ^{glabris} ^{et} ^{non} ^{vellosis} ^{et} ^{non} ^{glabris}
submentofus subconscientia (spicamina e ^{non} ^{glabra} ^{et} ^{non} ^{glabra}). Folia
lineari lanceolata, villosa sesqui pollicaria. Panicula spicata
sesqui pollicaria glabra, antea longior quam in reliquis excepta
Cula florum villosa. flosculi ambo anfracti

Carya Awa? foliis lanceolatis, panicula subumbellata ~~Carya~~
Coryllan variflora Act. f. h. n. Par. p. 1. pag. 106
Habitat in Am-merid.

non vid.

Sinenfis brevis foliis setaceis, panicula erecta, flocculis anfractis villosis Retz. ob.

3. p. 10.

Habitat in China

Culmus basi ramosus pedalis. Folia glabra brevia. panicula parva
- Calyx subulmi laciniolatis, striatis glabris, subaequalibus. Corolla gluma villosa
interior longior, acuminata. Retz

non vidi

Setacea cum foliis setaceis, panicula diffusa, flocculis basi pilosis: inferiore
mutico, superiore anthera brevi Retz. obs. 3. p. 10*

Habitat in Europa

et varietas caryophyllea. Calyx triflorus. Siliqua infimus multum pilosus
muticus, secundus minus pilosus anthera corolla parum longior
tertio minutus sterilis Retz.

non vid.

procox A foliis setaceis vaginis angulatis, floribus paniculato spica
to, flospaliu basi anfractis L.S. fl. Bon. Tab. 3 & 3

Gramen parvum procox, panicula laxa cernente Rus' angl.
3. p. 407. t. 22. fig. 2. Plukn. alm. 1778. 33. fig. 4.

Gramen minimum, spica brevi habitore, nostrum Scheuchz. gram.
214.

Habitatio Europa campis arenosis inundatis O

gramen vix. digitale glabrum. Culmo foliis unico vagina tectis. spicula alter
no 6. 7. brevissimi pedicellato, pedicelli ^{villi} simplicissimi crista calyce
longior

Caryophylloa A foliis fetacis, panicula divaricata, floribus anfractis Dufour
fibris lin. 1. V fl. Dan. tab. 302.

Caryophyllus arvensis glaber minimum Bault. prod. 105.

Gramen paniculatum, locustis purpureo-argenteis, annuum Monf. hist
5. p. 200 f. 8. 1. 5. fig. 11.

Gramen paniculatum minimum molle Scheuch. gram. 215.

Gramen phalaroides, sparsa panicula, minimum angustifolium
Marr. u. 44. fig. 1.

Habitat in Europa glareosis &

Culmi plures digitales vel palmari, filiformes, glabri, basi saepe geniculati ^{intra}
folia 1-2. in culmo unguiculata, plurima ^{adicalia} pollicaria
panicula ramis oppositis. ^{albedo viridescens.} flores ovati ^{peristia} in utroque flosculo
calyce longior

Cerdigenum M

minuta A. panicula laxa subfastigiata ramosissima, flosculis muticis

Loefl. 1074 Schreb. gram. T. 20 fig. 2.

Cyrtium paniculatum ar. vense minimum Vart. cent. 5. p. 35. T. 67.

Habitat in Hispania O

Culmi vni digitali. Tubus geniculi ad basim ferè, utrimo longissimo. Folia ad basim culmi
vni circiter, absque vagina acuta, plana cito marcescentia. Genicula ultima
solum pinnatifida et brevia, late conduplicata. Vagina inferius con-
tracta, superius laxior paulo ventricosa, ubique angulosa. Flores in panicula
diffusa laxa ramosissima. ramuli binati subdivisi in ramulos breves, omnibus
capellanibus parum flexuosis, floribus omnibus pedicellatis platanis. Valvula
calycis ovata. Loefl.

Culmi saepe suthamensi sonat magnitudine fructuum locis

aquatica a panicula patente, floribus muticis Coribus calyce longioribus, foliis planis. Lin. h. v. p. 1124 fl. Dan. tab. 301

Gramen caninum supinum paniculatum Dulcis Brank. jun. 1.

Gramen aquaticum melleum Scheuchz. gram. 176. Valt. part. 29
fir. fig. 7.

Habitat in Europae partibus aquosis &

Culmi ascendentes, pedales, glabri inferne foliosi basi ramosi. Folium
lineari-lanceolata, brevia pro parte culmi. Pediculi panicula
diffusa. Rami primarii ^{sub} verticillati. Flores facie Poae. calyces in
loco fructu quinque flori.

5
6
7
3
4
1
brevisolia ams foliis sub convolutis subulatis subsiccis, culmo subnudo, panicea
la spicata.

Legi Pampelona 2

Calycis ams cristata. Radices caespitosi. apice folios. folia polliciana
convoluta secunda, glabra, angustissima pallida viridia. Culmi
perthambi, brachy basi geniculati ^{inseta} sicut solum ad fragulum geni
^{inferior} tunc panícula terminalis oblonga, pollicari glabra. Calycis biflori valv
lis dorso ciliatis. glauci multii

equinoctialis Bignonia

attenuata A. panicula spicata, flosculis muticis glabris, foliis subulatis

Habitat in oriente Turchia

panicula tenuis bipollicari attenuata ^{Folium glabrum} flosculi glabri calyce
panis longior. Facies auro caespitosa at gluma mutica