

Albua

1, altissima. Albusa petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis subulatis  
lobulato-convolutis Dryan. in Act. Holm. p. 292.

Habitat in Cap. b. p. 292

Folia subulata, profus bipedalia basi unciis pene tres lata. Scapus foliis  
paulo brevior, crassitie digiti. Racemus bipedalis et ultra. Pedunculi  
sub anthesi deflexi, post florescentiam patenti erecti, triunciales.  
Bractes virides margine hyalino, unciates flores albi. Petala exteriora  
aperta, apice emarginata; interiora obtusa apice glandulosa. Didyma  
filamenta fertilia margine undulata. Stenelia triangulari extus pubes-  
ta reliqua paulo longiora antheris nullo. Germen subpedicellatum  
Stylus obverse pyramidalis, testis ramentis glandulosis: anguli terminati  
Tarsus in cornu subulata ramentis testis; centrum elongatus in stigma  
pyramidalis. Dryan. l. c.

non vid.

filamentosa Yucca foliis serratis filiferis L. S. V. p. 337

yucca foliis filamentosis Mon. h. 2. p. 419.

yucca virginiana, foliis per marginem approxime filatis Pluk. alm. 396.

yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margine filamentosis Gron  
Voy. 152. Trav. Etet 1. 37.

Habitat in Virginia 5

2 major *Albucia* petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis lineari lanceola-  
tis planiusculis Engelm. bot. Holm. 1784. p. 293. Hort. kew. 1. p. 436. Fargu. coll. 3.  
neg. <sup>45</sup> vdr. tab. 443.  
*Ornithogalum luteo-venosindicum* Corn. canad. p. 160. Morf. h. 2. p. 423. f. 4.

t. 24. fig. 7.

2 *Albucia* major foliis lanceolatis Len. S. V. p. 326. Berg Cap. reg. 07.  
1 *Ornithogalum canadense*; petalis interioribus convergentibus clausis, stamini-  
bus tribus castatis Len. S. V. ed. 16. p. 904.\*  
Habitat in Cap. b. spec. det. La Mart.

specimen herbarii dubium

an syn: Corn. canad. huc pertinet

3, minor *Albuea petalis* interioribus apice glandulosis inflexis, foliis linearibus  
latis canaliculatis Engelm. Act. Holm 1784. p. 294. Hort. Kew. 1. p. 436.

*Ornithogalum africanum*, flore viridi altero altero innatum Herm.  
parad. 13 209. t. 209.

*Albuea minor* foliis subulatis Lea. l. V. pag. 326

Habitat in Cap. bono spei 4

Folia pedalis, basi semunciam lata. Scapus semipedalis, diametro via Cinari  
Racemus semipedalis et ultra. Pedunculi sesquialterales. Bractea virides  
marginibus hyalinis, cito marcescentes, semunciales. Flores lutei. Peta  
la unciis breviora: exteriora apice nervata. interiora amicta apice  
glandula reniformi. Filamenta stentia linearia, apice filiformi  
inflexa. <sup>antheris nullis</sup> Stylus per utrumque procedente

4 *Coarctata* Albusa petalis interioribus apice foveolatis, foliis glabris peduncu-  
li longitudine bractearum Dreyer in Act. Holm. 1784. p. 295 +

Habitat in Cap. b. p. 2

Folia lineari-subulata, profunde canaliculata, bipedalia et ultra basi  
semineam fere angustiora. Capus folio brevior penna anserina  
angustior. Racemus coarctatus simpliciter. Pedunculi patulae unicia  
les. Bractea longitudine fere pedunculi. Flores lutei. Petala interiora  
apice incrassata. Filamenta sterilia etiam convexa, intus canaliculata  
anthera sagittata effata. Stylus protractus longitudine ovariis  
Terminatus stigma ex angulo styli apice rotundatis Dr. C.

*Draconis Yucca foliis serratis nutantibus* Lin. S. V. pag. 337

*Draconi arbori affinis americana* Bauh. Pin. 506

Talori in Kayra et Wapach nascuntur folia Clus. exot. 6. 21.

*Yucca Draconis foliis serratis* Lill. Elth. 437. t. 324. f. 417. Com. prolet. 42.

67. t. 16.

Habitat in America

6 abyssinica Albusa petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, bracteis flore  
longioribus Dryand. in Act. Holm. 1784. p. 190.

Albusa abyssinica foliis linearibus canaliculatis glabris L. V. per. 326  
Jacqu. Coll. 1. p. 55

Habitat

Folia linearia, canaliculata, altitudine scapi. Scapus brycedalis  
Racemus elongatus, flores <sup>nitentes</sup> inferiores remoti ultimi conferti. Brac-  
teo subulato, extra ferrugineo, <sup>marginis</sup> basi utraque membranaceo. Petala  
linearia obtusa bracteis duplo brevioribus

hoc uti omnes species confer: cum descript. in Act. Holm.



flaccida a foliis lanceolato-linearibus flaccidis racemo brevi pedunculo  
patentissimi, filamentis alternis, staminibus  
albis flaccidis. Do. Gay coll. 4. p. 201. Ti rar. tab 444

Habitat ad Caput b. per 7

Tota glabra. Folia radicalia, lanceolato-linearis, acuta, paniculata, striata  
flaccida, sequipedalis. Scaevola <sup>2</sup>res, crassitie calami, bipedalis, erecta, pubes  
debilis, hinc flexuosa, superne ramifera. Bractea lanceolato-acuminata, mem-  
branaea, pollicaris. Pedunculi bunciales. Flores penduli. Petala oblonga  
pallide flava est tenoa patentissima apice fimbriata interiora apice appen-  
diculata. Stamina 3 sterilia apice reflexa tria fertilia basi dilatata. Gai

non vidi

viridiflora. Al. foliis lineari-bus canaliulatis foliis villosis  
mo paucifloro pedunculis patentibus floribus nutantibus  
filamentis alternis stenilibus. atque coll. 5. p  
G. rar. tab. 446

non vid.

Spiralis Albuca petalis interioribus apice fornicatis, foliis spiralebus Thunb. act.  
Holm. 1786 p. 59. Tab. 2 fig. 1. Jacq. Coll. 5. 14i var. Tab. 243 9

Albuca spiralis; floribus nutantibus, foliis spiralebus Lin. Suppl. p. 196.

~~f. v. 1787 3/16~~  
Habitat in Cap. b. p. 2

Caulis uniflorus vel biflorus  
Folia radicalia paucis, quadrif. flex., linearis filiformia inferne erecta  
non spiralia, in adultiore planta flexuosa, villosa scabra, scapo breviora  
scapus simpliciter filiformis flexuosus apice nutans striatus, villosus scabri-  
dus; dupli. talis. Bractea lanceolata, acuminata pedunculo brevior  
filamenta 4na absque antheris +

non vid.

aurea A. foliis lanceolato lineatis, pedunculis floribusque erectis

albica aurea Ga. Equ. coll. 4 p. 202. Ic. rar. Tab. 441.

Habitat ad Cap. 6 p. 2

Vota glabra. Folio bipede unice dimidia lata, lanceolato lineari, subtilis  
fime striata, utroque fascia longitudinali alba infero plana deinde canaliata  
la, apice in apicem <sup>superne</sup> subulata ~~convergentia~~, basi erecta deinde ~~horum~~ prostrata  
Sapores teres, consistit calami erectus; longitudine folii corymbos racemosus.  
Pedunculi teres erecti 3-4 pollicares. Bractes lanceolato acuminato polli  
cari. Petala late lutea utroque fascia longitudinali viridi, apice calloso  
patentesima interna apice ~~formicuta~~. filamenta alterna breviora utri  
anthera alterna minorae saepe

Setosa Al. foliis lanceolato-linearibus, pedunculis patentissimis  
floribus erectis, squamis bulbi apice setosis Jacq. coll. 5  
Fr. var. Gal. 440

non vidi

4 Fastigiata Albica petalis interioribus apice foveolatis; foliis glabris, pedunculis  
Congregatis Dryand. in Act. Holm. 1784. p. 296. H. Vew. 1. p. 436  
Habitat in Cap. b. p. 4

Folia linearia, primum canaliculata, dein planiuscula, sesquipedalia,  
marginem lato. Scapus foliis dimidio brevior, crassitie pennis asperis  
Racemus fastigiatus, longitudine scapi. Pediculi sub anthesi patentis  
post florescentiam erecti tri vel quadrunciales. Bractea membranacea  
hyalina, dorso reflexa, femunciales. Flores albi. Petala externa  
lineari-oblonga, apice emarginata, unguis breviora. interna ovali oblon-  
ga, externis paulo breviora. Stylus prius maritimus pro externum  
ferè utra antecedentibus

*Aloëfolia Yucca foliis crenulatis fructis* Lin. S. V. p. 337.

*Aloë americana, yucca folio, arborescens* Pomm. prolect. 64. t. 14

*Aloë, yucca foliis, caulescens* Pluk. alm. 19. t. 256.

*Yucca arborescens, foliis rigidibus vixis, serratis* Dill. Ecth. 435. t. 323. f. 416

Habitat in Jamaica, Seracnee. †

① *viscosa* Albucia pedalis interioribus apice fornicatis, foliis villosis-glandulosis Lyon.  
in Act. Holm. 1784. p. 297. Jacqu. coll. 5. p. 40. rar. 4. 445  
*Albucia viscosa*, floribus erectis, foliis lanceolatis villosis-viscosis Lin. Suppl.  
pag. 196. V. S. p. 326

Habitat in Cap. bono spici 4

Folia radice alia planina, apice semper attenuato-acuminata, lan-  
ceolata, tenuissime glandulosa, viscosa, erecta scapo duplo breviora  
pedalis. Scapus simplex erectus, villosus-scabridus, flexuosus erectus  
pedalis. Flores racemosi, plures, subernui. Bractea ad basin pedunculata  
lanceolata, acuminata, concava, margine membranacea. Pedunculi  
valde glandulosi, cernui, bractea longiore pollicares. Anthera immo 6  
fertiles

non vidi.



*perfoliata* *Ursularia*

caudata a foliis lanceolatis linearibus canaliculatis fructu erecto, pedunculis  
no. Ventispruni  
Albucia caudata Jacq. coll. 4. p. 203. 7c. nr. tab. 442

Habitat in Cap. b. h. 7

Tota glabra. Stipulae paulae, lanceolatae lineari, canaliculatae, apice  
versuta subulata, pedalis. Scapus bipedalis, crassitie calami. Racemus  
a medio fere scapi. Bracteae lineari-lanceolatae primum virides deinceps  
suffruticulae, uncinatae. Stipellae 3 pollicares. Petala utrinque fasciata viridi  
interiori apice calloso fornicato, exteriore plana, interiori apice luteo  
filamentis 3 basi dilatatis, <sup>fornicatis</sup> <sup>interioribus</sup> <sup>exterioribus</sup> <sup>longioribus</sup> <sup>tribus</sup> alteris majoribus castratis tubis  
in filam dilatatis Jacq.

non vid.