

Alchemilla

Advensis A. foliis trifidis incisio, floribus axillaribus sessilibus monandris
Achemilla minima montana Col. Ephr. 145. Tab. 146
Chorophyllo nonnihil similibus Bauh. pin. 102.

Aphanes aovenis L. S. V. Fl. Dan.
Achemilla aphanes hesperata, foliis trilobis, lobis tri et byar
filiis Leers herbor. n. 122.

Habitat in Europe occi et orientis occis

Caules puberes, simpliciter depressi filiformes hesperati. Folcia
alterna dispersa cuneiformia in petiolum definentia
trifida. laciniis cuneiformibus inciso subtrilobis - f. trifidis pilosi
Hypoleuca ~~in~~ tubinabe dentato-cuneis. Flores sessiles contra specu
lus eorumque longitudine. Stylus. Stamen superne 1.

quomodo a monandra Sw. diffet ulterius determinand
- *Aphanes aovenis*

alpina a foliis dentatis serratis Bl. ju: 1424. Fl. Bon. tab. 49

Tormentilla alpina, foliis feniceis Bauh. pin. 326.

Alchemilla perennis incana argentea s. fenicea sativum provocans Morif.
L. 2. p. 195: f. 2. 7. 20. fig. 3.

hybrida β. Alchemilla alpina pubescens minor Tournef. F. R. H. 508. Pl. Kn. phyt.

240 fig. 2

Habitat in Alpibus Europa & Hyemulis foliaceis

Radix sepe ne divisus dactylis squamis ferrugineis membranaceis
saginantibus apice bifidis extus pelosis folia petiolata
folia verna s. v. oblonga, avenia supra glabra subtus fenice
nidida apice dentato-incisa. Petiolus feniceus longitudine
fere caulis. ^{caulis} caulibus ^{caulis} s. liformes feniceis foliis uno alterove
ternato remoto, ^{caulis} stipulis ^{caulis} ob ovatis dentato inci
sis. Flores terminalis in capitulo pedunculato congesti pedicel
latis extus feniceis

β. simili vulgari differt caule foliis que subtus subpeloso feniceis
potius sub vulgari collocanda

vulgaris A foliis lobatis caule puba D.C. Don. Tab. 693
phyllis

β. Alchemilla vulgaris Bauh. pin 319

Alchemilla minor Tournef. F. R. H. 502.

Habitat in Europa paucis ^{ramentis} ferrugineo fusca textis

Radix crassa caules decumbentes pilosi foliiformes, puberuli

sub floribus
cuius lina opposita
5 lobis fusca

foliis bipartitis, tri-lobis sub pedunculis. folia radicalia sub
trunda, 7 lobis dentatis pilosa petiolus longitudine folii pilo
sissima. Flores umbellati ex his pilosi breves pedicellati

pentaphylla A foliis quinatis multifidis glabris Lin. S. V. pag.

Alchemilla alpina quinque folia Bauh. pin. 320. prod. 130.

Alchemilla alpina pentaphylla minima, lobis fimbriatis Boiss. mus.
1. p. 10. tab. 1.

Habitat in monte Canisio, Furca, Gothardo Rhothiconum &

Caules prostrumbentes; simplicis; digitales, glabri, uti tota planta

Folia petiolata alterna, remota, ternata, vel quina, sulcatis cuneiformibus tri vel quadrifidis pelis minoribus longis adpressis, lineariibus
Stipula oblonga incisa. Pedunculi umbellati.

aphanoides A. foliis multipartitis, caule erecto Lin. Suppl. 129. t. V. 166

Habitat in nova granada ☉

Caules erecti, squamosi, subramosi, teretes pubescentes. Folia multi-
partita, aphanes simillima, nuda, radicalia petiolata, reliqua
amplexicaulia. Racemi terminales subverticillati. Calyx octo
fidus magnitudine aphanes Lin.

non vid.

varifolia A. foliis caule foliis folis prostrato ramoso, foliis lobatis petio-
latis ^{pedunculatis} axillaribus

Caules sceleriformes, glabris raris pilosis. Folia 3 f. 3 loba semi-
unquidulana, obtuse dentata, ^{glabris} stipula
subrotunda dentata. Pedunculi axillares folio duplo lon-
gioris. Flores alterni subsessiles folio floralibus dentato-
missis

diff. emend. in Syst

capensis Alchemilla villosa, foliis crenatis, floribus paucis, cymis
La Mart. T. Enc. pag. 347 tab. 16. fig. 2.

Habitat in Cap. b. spec.

Folia subthoracis rufescentia.

alchemilla minima pubescens Petw. Mus. herb. Vaill.

non vidi

pinnata Alchemilla foliis pinnatis: pinnulis bi-trifidisque fl. Peruv. 1. pag. 69.
Habitat in provincia Tarma et Patate ^{ura} ~~ab~~ montibus albis, frigidis et humi-

dis.

Pilosa, Caulis herbaceus, ramosus, teres, repens. Folia radicalia petiolata
pinnata: pinnae unciniformes bi-quinquefidae, sessiles; caulinae am-
plexicaulia. Pedunculi axillares breves. Calycis virides. Stamina 2.
germina 2. Styli 2. Stigmata capitata. Semina 2. fl. Peruv.

Impatiens Alelemulla foliis tripartitis, laciniis cuneiformibus multifidis fl.

Peruv. 1. pag. 68.

Habitat in montibus frigidis et scaturiginibus Pillao. 4

Villosa. Caules plerumque pedales, diffusi, repentes, teretes, filiformes, ramosi. Folia alterna, breviter petiolata. Petioli vaginantes: vagina multifida, stellata. Pedunculi axillares, terminalesque, dichotomocorymbosi, vaginis multifidis sulcatis. Flores parvi & esules. Filamenta 2. Germena 2 in fundo calycis inclusa. Styli filiformes longitudine staminum. Stigmata globosa, hyalina. Semina 2. fl. Peruv.

Alchemilla orbiculata: foliis orbiculato-veniformibus lobatis serratis, floribus
spirato-corymbosis fl. Penns. 1. pag. 60.

Habitat in Provincia Parvata hucanum montibus frigidis et humidis et
selleso. Caulis ramosus semis, repens, teres, filiformis. Folia Rami hirsu-
ta: Tenen nubiundi. Folia radicalia, longe petiolata, plicata, tri-11 lobata
inciso serrata, supra glabra, subter villosa argentea, venosissima.
Petioli hirsuti. Vagina perfoliata, multifida. Pedunculi axillares, foliis
duplo longiores, subcorymbosi, dichotomi, multiflori. Pedicelli breves uni-
flori. Calyx campanulatus, octopartitus: lacinis ovatis, aculis, patentibus,
alterna minoribus. Filamenta 2. breviora, calycis tubo insidentia. Germena
2. Styli 2. ad basin germinis inserti. Stigmata capitata, hyalina
Semina 2. fl. Penns.

monardria A. foliis tripartitis trifidis hirsutis; floribus monandris confertis
axillaribus Sw. prodr. p. 30.
Habitat.