

Allium

n^o pallens Allium caule subterret foliis subterretibus; floribus pendulis truncatis, stamini-
bus corollae inaequantibus Lin-Spici: pl. p. 427 + S.V. p. 322.

Allium montanum. bicorne, flore obsoleto Bauh. Pin. 75.

Habitat in Hispania, Italia, Monpelii, Pannonia, Barbana, ^{filiiformia}
Caule interdum petali, teris inferne vaginatus. Folia basi ^{foliis} ^{dilatata} ^{palana}
fistulosa, heptagona, erecta. Spatha diphylla, nervosa ^{filiiformis}
umbella duplo longiora. Corolla cylindrica truncata minoriae sub
florescentia petala. Petala oblonga, acuta, pallida dorso linea obscurio
re. Stamina simplicia uniloba

22 paniculatum Allium foliis canaliculatis
pedunculis capillaribus effusis, staminibus subulatis
corolla longioribus? Spatha longissima Lin-Spec. pl. p. 42 Bot. S. V. p.
Allium montanum bicorne, floribus triquetris purpureis pedunculis
longis et reflexis Sequ. Veron. 2. p. 70.

Allium foliis teretibus, vagina bicorni, umbella pendula suave
purpurea. Hall. All. 22. Opusc. p. 3 86.

Habitat in Libania, Aethiopia, Gallia, Italia, Oriente & ~~retra~~
Pedalis caule subtilissime striato, inferne glabro. Folia subulata
caule breviora. Flores pedunculis capillaribus pediculis erectis
et pendulis. Corolla purpurea obovata. Spatha diphylla
reflexe basi lata nervosa ^{paucis} ~~subulata~~ ^{subulata} umbella
3-4-5-6 longiora. Petala oblonga, obtusa. Stamina capillaria stylo
que petalis longiora

affinis pallidiflori

23. *Desfontainia* allium foliis teretibus subulatis, vaginis sulcatis, stami umbella
fastigiata, staminibus simplicibus longitudine corollae brevioribus.
Allium desfontainii; foliis caulinis teretibus; antheris subulatis; um-
bella capfulifera *Orth.* *Desfer.* pag. 72.

Habitat in desertis Arabianis

Palmaris caule striato. folia duo vel tres in perone, caule longiora
basi sulcata, superne striata. spathe diphylla erecta longitudine
pedicellorum erecta-lanceolata alba vix subulata striata.
umbella pauciflora pedicellis erectis. Petala lanceolata stami-
nibus duplo longioribus

Senecale Allium flaminibus tricuspidatis corolla longioribus Lin Spec. pl. p. 428 & L. v.

Allium sylvest. tenuifolium Dodon: pempt. 63.

Allium sylvest. camp. purpurascens Bauh. Pin. 74

Porrus sylvest. vineanum Bauh. Pin. 72.

Porrus sylvest. capite gemino Bauh. Pin. 72.

Allium campe. junifolium purpurascens capitatum majus Bauh. Pin.

^{p. 74}
Allium flaminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite bulbifero
phoeniceo, radice multiplici Hall. opusc. 370

Habitat in Germania &

Radix ex multis bulbis. Caulis bipedalis. Folia teretia fistulosa
pedalia. Spatha long. ovata magnitudine capituli. Capitulum
auctum bulbi acuminati recurvato, sive in longiora
acumina divinitis. Corolla parva violacea. Stamina sex
duabus, longa extra florem eminentibus. &

25
oleraceum Allium foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus Lin.
L. V. pag. 323.

Allium sylvestre tenuifolium Lob. 4. 156.

Allium montanum bicorne, flore exalbido Bauh. Pin. 75.

Allium bicorne proliferum flore intus albescente cum stria purpurascente
extus Bauh. 4. 2. p. 160 Icon Eques. pag. Allii sylvestris bicornis flore vi-
ri Egd. pag. 561.

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus Hall. opus. 7. 30. 1
Tab. 1. fig. 2. All. 24. fig. 4.

Cepa capitata bulboso prolifero, foliis semiteretibus nervis angularibus
Rabis fistulosis Lin. fl. Suec. 200*

Habitat in Europa boreali

Caulis sive bicubitalis fructus. Folio semipetalia, fistulosa. Spatha
diphylla subulata, reflexa, foliolo altero pithamou. Umbella
bulbifera bulbis globosis, bulbis oblongis. ^{ad basin filis inaequalibus} Flores pauci. Pedunculi
sempre pollicares, laxi, filiformes. Corolla campanulata. Petala oblonga
lanicolata, exteriora tria obtusa, pallide rubra minorum quam
in carnato cui similis

~~Lebanus Defideratus~~

capillare Allium foliis capillaribus scapo brevioribus. PAVAN. G.
vol. 3. pag. 4. Tab. 206. fig. 1.

Habitat in Hispania &

scapis teres. umbella capillifera - Stamina subulata
offine, Luptancia

non vidi

27 *A. sicilianicum* Allum. foliis subulatis, umbella globosa, staminibus triispi
Datis Lin. Sp. p. pag. 429 * L. V. pag. 323.

Cepa pteritis Trag. Gofn. kor. Bauh. Pin. 42.

Cepa Afcalonica Morf. h. r. p. 303. f. 48. 14. fig. 3.

Habitat in Palastina.

Statua *A. Schenopzasi*. Scapus subnudus, teres, pithamosus et
ultra. Spatha membranacea. Umbella globosa, floribus
A. Schenopzasi minoribus. Petala erecta, ovata lanceolata
conulea, Ganna citro conulea. Stamina longitudine petala
longum, alternis latissimis. Stylus stigmatibus obtusis h. l. c.

20 *nutans Allium* Scapo anicipiti, foliis lineariibus planis, staminibus tripartitis. L.
L. I. V. pag. 323.

Primum scapo nudo anicipiti, antequam florent nutante, folius ex se formibus
hinc paullo convexioribus Gmel. fl. Sib. 1. p. 55. t. 12.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis latissimis capite sphaerico, radice
lateralis foliis Hall. opusc. p. 347.

Habitat in Siberia

Bulbus oblongus truncatus. Caulis capitalis striatus. Tolia
Umbella globosa. Spatha membranacea brevis. Stamina et stylus
corolla longiora. Flores albo purpurei
Stomum dentes in antiquo obliterantur

Ampeloprasum Allium

24 *Senecioides* Allium *Scapo* *ancipiti* foliis linearibus ^{longis} ~~sub~~ ^{longioribus} ~~convexis~~ ^{convexis} ~~lobis~~, umbella
subrotunda, staminibus ~~scabulatis~~ ^{an. nec. pl. pag. 430 & S.V. pag. 323.}

Allium *f. moly* *rarispinis* foliis Clus. *hist.* 1. p. 195.

Allium *montanum*, foliis *Narcissi*, *major* *Bauh. Pin.* 79.

Allium *umbelliferum* *proterense* *Bauh. hist.* 11. p. 564.

Allium *radice* *bulbosa*, foliis *gramineis* *umbella* *erecta* *non* *bulbi*
fera, *vaginis* *simplicissimis* *Hall. All.* *opus* *pag.* 372. *Hist.*
sup. 1227. V.

Allium *caule* *ancipiti* *tereti* *scapo*, foliis *ensiformibus* *hinc* *paullo*
convexioribus *Gmel. Sib.* 1. p. 513. t. 11. *fig.* 2.

Habitat in *Sibinia* *Siberia* &

Radix *sub* *transversa*. *Folia* *cubitalia*, ^{obliqua} *basi* *triquetra*. *Petala* *erecta*
spatha *bivalvis* *ovata* *pedunculi* *brevior*. *Petala* *erecta* *dehiscunt*
Canaliculata *inflexa*. *Stamina* *corolla* *paullo* *longiora*.

300 *Odorum Allium Scapo teretiusculo, foliis linearibus canaliculatis subtus unguiculatis*
umbellâ fastigiatâ. Lin. Mant. 62. & S.V. 323.

Habitat in Europa australi &

Folia basi connata in canaliculâ culmum s. fasciculum stipitatum, linearia
longa, six carnea, subtus striata, supra canaliculata, minime hispida.
Scapus pedalis, teres, vel unius obfuro angulo, apophyllus erectus
pedalis. spatia brevis cum rudimentis spatulatis s. membra
natis inter omnes pedunculos. Pedunculi plurimi, erecti flonibus
longiores. Corolla alba odorata, petalis ovato-oblongis, acutis
sculis, erectis usculis - patulis, carina reflexente. Stamina sub
lata, simplicia, corollâ $\frac{1}{2}$ breviora. Germen punctis excavatis, cinereum.
Stylus albus. Lin. l. l.

3, angulosum Allium scapo ancapite, foliis linearibus canaliculatis subtus puberulis
794
gularis, umbella fastigiata Lin. Spec. pl. p. 430* S.V. p. 323. Hoffm.

Moly foliis nanisji Lobel G. p. 160.

Allium montanum foliis nanisji, minus Bauh. Pin. 75.

Allium petroem umbelliferum Bauh. hist. 2. p. 564.

Allium radice senescente leprosa transversa Hall. opus. All.
opus. p. 370. Hist. 1220. p.

Habitat in Libano, Germanis humidis silvis 4

Folia linearia angustiora quam in antecedente, lineis ^{superne angulato} erecta obliqua
spithamea. Scapus ^{pub.} nudus plusquam pedalis ^{longior} ^{longior} ^{longior}
vel folius longior. Spatha ut in A. senescente. Umbella erecta
convexa. Corolla subimbricantes. Petala acuminata, interioribus
alternis apice reflexa, ~~exteriora~~ exteriora erecta. Stamina simplicia.

neapolitanum A. capsae anisetae, foliis lanceolatis canaliculatis umbella
parva Cynth. pl. rar. Neap. Lasi: 1. Tab. 4.

michi ignotum

Pallasii A. caule ~~subter~~ folio, umbella deiformi, staminibus simplicibus
corollam aequantibus, stylo brevissimo Mur: Rem. Gott. 1775. tab 3.

non vid.

Torphaloi Allium folis Scapo folisque teretibus; umbella fastigiata, staminibus
72
trifidi corolla longioribus
Habitat in Aegypto Torph.

Folia striata cum scapo altiora basi eius sessifera. Scapus spi-
thamens striatus. Spatha 1-phylla ovata, nervosa pedunculis duplo
brevior, acuta. Cauda umbella pauciflora. Pedunculi polli-
cari. Petala ovata

ulterior enodanda

39 Canadense Allium foliis linearibus capitulo bulbifera Lin. Spec. p. 431. t. S. V.
pag. 323.

Habitat in Canada &

Folia plana, laevia, recta, spithamea. Scapus subnudus teres; longior
foliis longior. Spatha ovata mucronata, acutiuscula. Capitulum
ex bulbis. Flosculi pauci, pedicellati albi. Petalis
ovalibus. Stamina simplicia longitudine corollae. Antherae
saepe h. l. c.

non vidi.

Triglochin Allium foliis triquetris, staminibus simplicibus Lin. Spec. pl.
 pag. 1600 + S.V. pag. 723.

Habitat Neapoli 4.

basitriquetra ^{superne} apice plana

Planta semipedalis. folia ensiformia, valde cuneata, scapo altio-

ra. Scapi plures triquetri. Spatha diphylla, lato-lanceo-

lata pedunculis parum longior membranacea. Petala alba

lanceolata, acuta minime nitida, erecta, carina obsolete alba

Stamina et Pistilla petalis dimidio breviora. Stylus trifidus

Reymata caecuta

umbello 6-10 flora
 flores penduli maxi-
 mi hujus generis

35 ursum Allium scapo nudo Inguetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella
pauciflora Lin. L. V. pag. 323. Flor. Dan. t. 757.

Allium ursum Tuck. hist. 739. Camer. Epit. 330.

Allium sylvestre latifolium Bauh. Pin. 74.

Allium ursum bifolium vernum sylvestre Bauh. h. p. 565.

Allium foliis radicalibus latissimis petiolatis floribus umbellatis
Hall. All. 10 Opusc. 379.

Habitat in Europa paucis septentrionalis nemorosis, raris &

Planta semipedalis. Folia scapo breviora basi in petiolum
attenuata sesquipollicem lata.spatha

Petalis lanceolatis, albis. Filamenta simplicia, petalis breviora
Stylus longitudine filamentum

36 nigrum Allium foliis lato lanceolatis, ^{elongatis} umbella hemisphaerica, petalis patentis
femis

Allium nigrum; scapo nudo tereti, foliis linearibus umbella erecta, petalis
erectis; spatha mucronata bifida a Lin. Spec. pl. pag 430*. Jacq.

Allium multibulbosum; scapo nudo tereti, foliis lanceolatis elongatis
flexilibus, umbella fastigiata, petalis omnibus patentissimis Jacq.
fl. Austr. vol. 1. t. 10. Pl. V. pag. 323.

allium monspeliense Quon

Habitat in Galloprovincia, Barbaria

Folia basi radicalia nuncupia, scapo parum breviora attenuato
basi pollicis brevitate. Scapus cubitalis teres. Spatha bipar
tita. laciniis oratis, membranaceis, nervosis attenuatis longitudo
ne umbello. Pedunculi pollicares fastigiati. Petala lanceo
lata, ^{acuta} alba flavescentia, dorso viridia. Filamenta simpli
cia ^{heteromera parum latiora} corolla breviora. Germin oblique viride
variat corollae purpureae

allium speciosum Cynl. 40: plant. rar. siciliis huius pertinet
40/2

Juaveolens A. Scapo nudo teretifido, folis linearibus cernatis, um-
bella subrotunda florum tubulata

Allium juaveolens Taiyu. Coll. 2. p. 305. Ic. rar. Tab. 364.

Habitat in austro. parti paludosi

Folia, scapus et germer ad lentem punctata. Mulus oblongus, crassitie digiti mini-
mi. Scapus 6-9 pollicans, erectus gracilis basi angulo vel altero obflecto,
ad florentiam superne nutans. Folia linearia acuta, Craspula canali-
culata. Umbella subrotunda 30 flom. Spatha bivalves valvula acuta
ambella brevior. Petala alba interiorum parum flexion filamenta sub-
tata petalis duplo longiora. Saccy

pauciflorum Allium scapo ancipiti, foliis linearibus planis, umbella nutante stamimbus
37 simplicibus brevissimis.

Allium nigrum All. fl. Pedem. 1801. t. 25. fig. 1.

Habitat in Galloprovincia et 4 talia

Scapus semipedalis foliis brevior. Folia utraque plana angusto lineana.
Spatha longitudine subaequalium. Flores 6-7. majores quam in omni-
bus Campanulatis, purpureis, pedicello duplo longioribus. Petala
oblonga mucronata erecto patentia. Filamenta staminea petalis multo
breviora

fide Herbarii Linnœani diversa ab All. nigro, a Botanico Caspico delpho
lis pro eadem habetur

38 Moly Allium *Scapo subcylindrico, foliis lanceolatis, umbella fastigiata* L. V. p.
323.

Moly montanum *latifolium flavo flore* Clus-hut. app. all. 1.

Moly *latifolium luteum odore allii* Bauh. Pin. 75

Moly *luteum botanicorum latifolium allii odore* Bauh. hut. 11. p. 562.

Allium *foliis radicalibus perfoliatis, lanceolatis, floribus umbellatis*
Hall. all. 26 Opor. p. 303. n. 23.

Habitat in Hungaria, Baldo, Montpelii, Pyrenaeis &

Planta culta semipedalis vel parum ultra. Folia altitudine spari-
riternque attenuata. Spatha monophylla ^{ovata}, basi conniven-
membranacea hyalina. Pedunculi laxi, ^{ovata} flavo nitente lanceolati
ovata, basi et supra. Stamina simplicia

32-39

gracile Allium scapo nudo tereti longissimo, foliis linearibus canaliculatis,
staminibus subulatis basi connatis H. Kew. l. p. 429. *

Habitat in Jamaica 4

Solea nanispina, pedalis. Scapus tripedalis tenues. Petala erecta, alba
unguiculata. Ungues inferne cum staminibus connata in tubum
viridem. forte sui generis planta. Hort. Kew. l. c.

non vidi

78-79
Tricoidium album scapo nudo semitereti, foliis lanceolatis oblongis umbella globosa
seminibus solitariis Hort. Kew. 1. p. 420
Habitat in America septentrionali,

non vid.

39 ^{capituli} filamentosum album foliis lanceolatis umbella hemisphaerica, staminibus
simplicibus longissimis.

Prinum capium Pallas *Fl. 2. tab. 92*

~~Scapus pedalis versus~~

Habitat ~~in~~ circa mare capium in herbis

Folia radicalia palmata lanceolata utrinque attenuata tria vel
terna, pollicem lata, Scapus foliis duplo longior, basi valde attenua-
tus. Spatha 5-phylla. Umbella convexa. Pedunculi sesqui polli-
cari, subaequalis. Flores pallide purpurei. Stylus. Stamina sub
lata corolla duplo longiora. Stylus staminibus longior. Loculamen
in monosperma

Cepa *Allium* *Scapo inferne ventricosa longiore, foliis teretibus* L. p. 323.

Cepa *Bunafelt* III. p. 134

Cepa *vulgans* *Bauh. Pin.* 71.

Cepae *f. Cepa rubra (et alba) rotunda (et longa)* *Bauh. h.* p. 547

~~Habitat~~

~~Scapus 1 pedalis subtilissime striatus. Vagina fistulosa ventri medio ut caulis
ventricosa. Umbella globosa. spatula diphyllo reflexa ovata membranacea
filamenta simplicia~~

Allium *Hamini* *bus alterne trifidis, caule ad terram ventricosa.* *Hall.*
crusg. perz. 356

~~Habitat~~

Pedunculata *f. Scapus* *inibitalis basi ventricosa. Est superne sensim angustatus attenuatus
foliis teretibus, scapo breviori, Umbella globosa pedicelli laterali pendu-
li. Petala alba dorso linea viridi. Filamenta tria trifida, dentibus
lateralibus brevibus. Anthera filamentis alternis integris basi dilatata*

41) *Festulopsis* Allium scapo adoqueante folia teretia sentricosa Lin. I. V. p. 323

Cepa oblonga Dod. pempt. 687. Pin. 71.

Allium flaminibus simplicibus, caule medio sentricoso Hall. opus. p. 360.
All. 11.

Habitat

Radix tunicata. Scapus binedalis subtilissime striatus. Folio festulo
sa, teretia, medio uti ^{scapus} caulis sentricoso. Umbella globosa. Spatha
diphylla, reflexa, ovata, membranacea filamenta, simplicia

42

~~Cupressaceum~~
Cupressaceum

Albium siapo tereti, foliis ^{teretibus} ~~linearibus~~ ^{linearibus}, umbella hemisphaerica stami-
nibus simplicibus corolla longioribus.

Copa lusitana, foliis capellaceis, minima, purpurascente flore Tournef.

F. R. H. p. 303.

Habitata Lusitania?

Planta spontanea semipedalis. ^{teretia} Folia siapo duplo breviora lineari obtu-
siuscula, plura. Spatha monophylla. Flores purpurei. petala
ovata acuta. Hamistylis corolla duplo longior

Stintum Album

43
Schonoprasum Allium folia teretia scapo pedulato siliiformia, scapo adaequan-
te Len. l. v. p. 324

Schonoprasum Dodon. Pempt. 689.

Pomum fetivum junceifolium Bauh. Pin. 72

Allium schonoprasum Stamens simplicibus, foliis radicalibus teretibus, scapi longitudine Hall. all. 12. Opus. p. 361

β. Cera scapis folisque teretibus, capitulis pyramidalis Gmel. Sib. 1. p. 59. t. 15. fig. 2. 3.

Cera palustris aetiosina Buxb. Cent. 4. p. 27 & 45.

γ. Cera fistilis Camer. epit. 176.

Habitat in alpestribus Sibiro, Europa boreali, Helvetia

Folia fistulosa. Scapi pedales vel palmari fistulosa teretia spathe
bivalvi ovata umbella brevior. Flores erecti. Petala lanceolata
dilute purpurea, carina saturatione, nitida. Stamina coacta corolla
varietas major, foliis in caule Cera in Transmarica

444 *binicum* Allium scapo tereti foliis semicylindricis, staminibus subulatis Lin Mant. 562.

* S. V. p. 324

Habitat in Libina 4

Folia subcylindrica, minime angulata. Scapus foliis longior. Umbella
fastigiata florifera. Spatha parva, ovata, fimbriata. Petala ovata, sinu
obtusiusculo, acuta, alba, carina vixente. Stamina corollae breviora.
germen tenerum Lin l. c.

non vidi

narsiflora A. siagotensis, umbella terminali inclinata, petalis
lanceolatis, staminibus simplicibus brevibus Vill. fl. Delph.
2. p. 259. Tab 6

non vidi

45
Tenuispermum Allium capro tereti inani foliis subulatis feli formibus,
capitulis laxis paucifloris *Ken. l. v. pag. 423 321. Gmel.*
Liber. 1. p. 61. t. 19. fig. 2. 3.
Habitat in Siberia 2.

non vid.

altavian Q. fr. apo Veneti nani, foliis ventricosi fusum attenuatis
capitulis parvis confertis pinis Hall. N. 2. p. 757. Tab. R

non vidi

ornithogaloides A. scapo tereti umbellifero paucifloro, foliis subulatis planis
Walt. fl. Car. pag 121
Habitat in Carolina

non vidi

illyricum allium. scapo nudo tereti foliis sublineari basi canalicula
to dem planis subtus carnatis um bellata fastigiata
Allium illyricum ~~Herbert~~ Jacq. coll. 3. pag. 273. n. rar. 8. 365

Habitat in Illyria

Bulbus subrotundus tubillis undique cinctus. Folia plana teri
ter carnata, sublinearia acuta pedalea flaccidula. Scapus
folus longior inferne obscure angulatus coctenim teris, calamo
cylindricis. Spatha 2-3 valvis lacinis ovatis acuminatis
umbella fastigiata. flori numerosi pedicelli pollicares. Petala
canalicata semuncialis rosea patula. filamenta subulata
basi latapientia petalis paulo breviora Jacq.

*Stratum a: Scapo nudo obsolete triquetro, foliis linearibus obli-
quis subcanaliculatis subtus serratis, umbella fastigiata
paniciflora Tacqui coll. G. p. 40. var. tab 366*

mibi ignota

inodorum A. Stapo subtriquetro, foliis linearibus planis subtus canis-
si, umbella fastigiata glomerata: staminibus simplicibus Act. 44.
Kew. 1. pag. 427.

non vidi

46 Chamomoly Allium scapo subnullo, capsulis carnis, foliis planis ciliatis

Chamomoly an Moly Dioscoridis Colum. Ephr. 325: 1.326

Moly humile foliis gramineo Bauh Pin. 75.

Laturmia Marati

A habitat in Italia 4

Bubbiae magnitudinis fere nuclei consp. ^{et} brata tunica exterior affinis ^{punctis n}
^{gropiensa pelosa plana}
mensis perforata fusa in dentibus lanceolatis. Folia lanceolata digitalia, vel
pedicularia vel ultra, ^{gram} 3-4. Scapo duplo longiora. Scapus
ubi pars inferior foliorum vaginae membranacea scapo fere longior
tutus. ^{bohi} Umbellae ^{inter} passim ^{extus} vaginae. pedunculi filiformes. Petala
lanceolata alba extus purpurascens. Stamina simplicia corolla
breviora. Ovario carnis