

Allium

fuscum

glebosa

oxyphloe carolinensis oxyphloe

Allium caule planifolio umbellifero Gen in pedunculis floribus
pedalis 8 staminibus

Habitat in hungaria Kitchell ^{lineata angusta}
Caulis pedalis, teres, nitidus. Folia longa canaliculata, dorso
strata convexa caule altera duo vel tria. Umbellae
multiflora. Petala linearis oblonga carinata obtusa lobata
marginibus fusca. filamenta ovula parva longiora. Stylus
longitudinalis corollae. Pedunculi filiformes.

~~medic. Eupura culmo oxyphloe b. vagante, umbelle subcomposita
oxyphloe subvagante, filio subtorne
Habitat in monte orientali hung
familia Eupura oxyphloe ut per eadem dicitur in affluente
oxyphloe. coctorem ubi in illo culmo frigitur angulis membrana
culmo nuda nisi vagans 3 ad basin styli pedale squame
concolorato oxyphloe~~

eminens

~~Cyperus spicis cylindricis imbricatis ^{sub} fastigiatis, spiculis teretibus
Culmo superne angulis denticulato scabris~~

~~Habitat in India orientali Rottler &~~

~~Culmus altus, crassitie penna Cygnae, trigonus, ² superne angulis ¹
denticulis minutis ^{fusca ferruginea} scabris. Folia pollicem lata, extusum magne~~

~~lanaque se serrulato-scabra. involucrium triphyllum longissimum:~~

supra trinervia
marginē carina
que scabra, denticuli
culi ferrugineis

~~foliola ^{at} unicum bipedale, pollicem latum: pedicula triphyllum; folio
lineari-subulata, umbellula breviora. Ochreae semi pollicares, oblique
truncatae, integrae, obtusae. Umbellulae radii septem - octo triquetri~~

~~longiores spithamei, triquetri, latius pediculae octo brevissimi, distichae
chyi. Spica interdum longitudine digiti minimi, penna columbina pa-
rum crassioris, teres, laxa imbricata. Spiculae vix semi unguiculares,~~

subfastigata

~~aut decemflora, acuta: flava: valvula oblonga, mucronata,
lateribus membranaceis, magis vix striata~~

decompis

an Cyperus imbricatus Retzi

Album

Bulbus oblongus obliquus. ^{as} foliis semiteretibus subulatis, solidis, cetero
scapo breviori superius ⁱⁿ pedalis ^{triflorus} triphylla
umbrella ante florescentiam lachrya densa erecta ^{erecta} ^{obtusis} ^{trifloris} ^{trifloris}
pedunculis semipollicaribus. Petala oblonga ^{erecta} ^{obtusis} ^{trifloris} ^{trifloris}
parum breviora lamina corollae breviora simplicia

Caractere compresso
Lanceo angusto, ut unguis, ^{lanceo} ^{angusto} ^{compresso} ^{trifloris} ^{trifloris} ^{trifloris} ^{trifloris}
pubescente ^{erecto} ^{obtusis} ^{trifloris} ^{trifloris} ^{trifloris} ^{trifloris} ^{trifloris} ^{trifloris}

glomeratus & culmo in quetro nudo, umbella triphylla supra decomperta, spiculis
cum glomerato-rotundatis, spiculis subulatis Cen. Am. 21. p. 301 &

Cyperus aquiticus Italicus procerior, locustis tenuissimis
in racemum dense congestis Mich. gen. 45. - L. equ.
Ver. 3. p. 60. t. 2. fig. 2.

umbellulis ^{sub} triphyllis ^{ap} apiculatis ^{que} *Cyperus capitatus* glomeratum congestis, seminibus aristatis
mont. gran. 14. t. 1. fig. 1.

— ^{que} ob longis spiculis ^{sub} subulatis ^{com} com ^{mespe} mespe *Cyperus bipedatus* et *ultra*, ^{altioribus} *crassius* perna *cygneo* ^{stratus} stratus
habitat in *Italia* paludosis et *India* &
Culmus bipedatus et ultra, ^{altioribus} *crassius* perna *cygneo* ^{stratus} stratus
basi vagina foliorum 3. vaginantibus, culmo *brevioribus* canina
et margine lobibus. involucri foliola 3-4. proter
nonnulla breviora angustiora inter pedunculos, alterna appo
stata, umbel canina superne margine *fi* *abra* pallida
virens, umbella multo longiora. Umbella radius circiter
et interdum pauciores, iniquales cum capitulo *incipite* festi
li in centro, longioribus *fope* *sub* *spithamoi* pedunculi
partales 3- ad septem patentibus unicus longior erectus
toti spiculis confertissimis *fecti*, ut *fope* caputulum multi
cipitem *simul* *ca* *pinguis* *capitulis* *crassius* *digit*
intermedia. involucrium *radiale* *de* *haphyllum* *foliola*
angustis unicum capitulo longius. Spicula lineari-

Petacium Allium caule teretifolio umbellifer, umbella convexa multiflora, staminibus
simplicibus, foliis fol. petaceis

Habitat in Hungaria Vitakel.

Caulis erectus, semipedalis, teres, glaber, crassitie fili emporatici. Folia caulina
2.3. teretia, caule breviora. Spatha diphylla, brevis, lanceolata. Pedunculi
plurimi capillares, exacti, inaequales, patentes. Petala alba, lanceolata, cani-
na linea purpurascens. Staminata simplicia, corolla breviora. Germen
conicum, apice subtridentatum, dentibus viridibus

prope capillare

an spatha monophylla 4. hat.

Cernuum Allium scapo superne tetragono umbellifero, umbella cernua, stami-
nibus simplicibus, folia linearia plana

Allium cernuum; scapo nudo tetragono umbellifero, foliis linearibus
planis utculis, umbella cernua, staminibus simplicibus, germine sex

Habitat Plantato Roth in Römisch Antiqu. p. 40. t. 2. Catalogo Bot. p. 33.

Scapus pedalis, basi foliosus, inferne teres, sursum acuta tetragonus, apice
recurvatus, glaber, lavis, crassitie penae columbina. folia linearia, scapo
 breviora, angusta, basi canaliculata, sursum plana, laevia, dorso caninata.

umbella terminalis cernua, circiter vigintiflora. ^{stamina} involucrium membrana
cea, scariosa, brevis, evanescentis. pedunculi pollicares, subopuales.

Corolla campanulato-globosa, fere lili convallii, incarnata. Petala 3 exte-
riora, ovata, concava, caninata, tria interiora angustiora. filamenta 6,
simplicia, corolla longiora. Germen ala tripluci ovata apice bifida coro-
natum

Peracta florescentia erigatur pedunculi et scapuli remanent apice
recurvus.

Hort Hafn

Alceatum Allium

Habitat in Syria Herb. Desfont

Radix magnitudine nucis Coryli. Sola duo inferne, linearia, caute breviora, plana, albeata. Caulis 5-6 pollicaris. Umbella 9 flora. Spatha minor, phylla, ovata, membranacea, longitudine pedicellorum. Petala linearia-lanceolata, pallide purpurea. Filamenta omnia capillaria, corolla breviora

campanulatum Allium

Habitat in Syno Herb. Desfont.

Folia inferne, lineana, angustissima, semipedalia, glabra. Caulis tener, erectus.
Involucrum monophyllum, campanulatum, effidum, umbella brevior: lacinae
ovatae, acuminatae. Umbella 17 flera. Petala oblonga, obtusa. Filamenta
aequalia, minime tricuspidata.

Allium

Habitat in Barbana? herb Desfont.

Caulis pedalis et ultra, striatus. Solia duo vel tria inferne, lineari, plana, longa. Involucrum 2-phylla, ovato-subrotunda, membranacea, umbella brevior. Umbella subglobosa, multiflora. Petala lanceolata, acuta, nitida, pallida purpurea. Stamina capillacea, Petalis longiora

habes

mutabile Allium

Habitat in Carolina Mediana Herb. Ruth.

Bulbi subglobosi conyli magnitudine. Caulis teres, lavis, solidus. Folia linearia canaliculata longissima, flaccida, sursum flexa marginibus involutis sensim subptauca. Involucrum in duas partes romperis fissurae lanceolatas attenuatae. Umbello modo multiflora, modo pauciflora, cum bulbi pluribus suboputati, modo totum bulbiferum: bulbi ovoidei Corolla dilute subalbida incarnata; 6-partita; patenter sumis: petali ovali lanceolatis, acutis, subaequali. Stamina calyce breviora: filamenta subulata, simplicia. Stylus staminibus paulo brevior

capulare Allium

Cavan.


Habitat

hert-hu Rev. la Paux

Umbellus ovatus. Scapi plures, filiformes, semipedales, inferne foliosi. Folia pinn
ica. Umbella 6 florum, fastigiata, Petala lanceolata, involucrium breve
lanceolatum.
affinis odora

Vozelia ~~*gmel.*~~ ~~*Vol.*~~

Habitatio Carolina

Calycis superus, laciniis 5 que, unum a ceteris apice inflexum depresso, altero brevior, lanceolata, altera corollae tubo longior, oblonga ovata: reliquis tres lanceolatae versus medium superne utraque dente. Corolla calycis longior, infundibuliformis, villosa: laciniis 6. lineari, reflexis, obtusis. Stamina 6 longitudine corollae. Antherae versatiles. Stylus 1. Stamina parva longior. Stigma bilamellatum. Capsula quadri-lobulari. Semina subnervi^{is} in protha membrana irregulari reniformi cincta. Embryo.  Germe inferius hepaticum

i ampeloprimum Allium umbella globose flaminibus tricuspidatis, petalis carno-
si abris Lin. l. V. pag. 321.

Ampeloprimum Dod. pempt. p. 689.

Allium sphaerico capite folio latere s. Scordoprimum alterum Bauh.
Pin. p. 74.

Scordoprimum dictum Bauh. h. 2. p. 550.

Allium flaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphaerice
congestis, radice solumifera Hall. All. s. Opus: p. 344

Habitat in Oriente, inque Insula Holms Angliæ &

Radix sphaerica. Caulis tripedalis, inferne foliofus, folia carnosa
pulposa, glauca semipedales. Spatha monophyllo, brevis, decidua
umbella sphaerica, floribus numerosis. Pedunculi filiformes bi-
vel tripollicares. Petala alba, dorso linea purpurea fenti, interno
ra latiora. Filamenta tria trifurcata laciniis petalis, reliqui tubus
conyoniibus parum extra corollam

ponum Alluim

2 porrum Allium ^{alternis} staminibus tricuspidatis, radice tunicata Lin. S. V. p. 32.

Porrum Brunfels. III. p. 136. Bauh. hist. 2. p. 551.

Porrum vulgare Lob.

Porrum scditivum Dod.

Porrum commune capitatum Bauh. Pin. 72.

Porrum scditivum latifolium Bauh. Pin. 72.

Allium staminibus alternis tritidis, foliis gramineis, floribus spica
nisa congestis, radice tunicata, cauli circumnata Hall. All.

opusc. pag. 340

Habitat

4

Paulis sequepedalis inferne foliosus, loris. Folia pedalea, unicum
cata. Umbella globosa. Spatha decidua ovata. Flores numero
sissimi, purpurascens Petala lanceolata pallida, canna pur
pura scente. Stamina congestione Corolla. dentibus petalorum
equalibus intermedio antherifero

3 Lineare Allium umbella globosa staminibus tricuspidatis, corolla duplo longiori
bus. Lin. L. V. p. 321

Porum caule tereti folioso, foliis linearibus planis, umbella globosa,
staminibus corolla longioribus Gmel. sub. 1. p. 56. t. 13 et 14. pag. 1.

Allium staminibus alterne trifidis, radice tunicis reticulatis obtusi-
sa Hall. opus. p. 352.

Habitat in Siberia

Bulbus tunicatus, numerosis bulbis, obtusus quasi reticulo et
tunicis laevibus. Caulis cubitalis, foliis. Scila graminea
caninata. Spatha diphylla. Umbella globosa pallide
rubella. filamenta corolla longiora

4 rotundum Allium umbella subglobosa, floribus lateralibus nutantibus; stami-
nibus truncatis Lin. l. V. p. 321.

Allium sphaerocephalon purpureum sylvestre Bauh. hist. 2. p. 164.

Allium flavum alterae trifidis pro sphaerico foliis gramineis radice
multiplici Hall. op. p. 350

Radix ex numerosis bulbis inter communes vaginas congestis. Caulis
tripedalis. Intha brevi. Petala purpurea, interne delictora

5 victorialis Allium caule planifolio umbella rotundata, staminibus lanceolatis
corolla longioribus, foliis ellipticis lin. s. v. pag. 321. Faicq. austr. vol. 3.
tab. 216.

victorialis longa & luf. hist.

Allium argenteum Camer. epit. 329.

Allium montanum latifolium maculatum Bauh. Pin. 74

Allium radice oblonga, reticulo obducta Hall. All. 17. Opusc. p. 20.

p. 375

Habitat in alpebus Helvetiae Italiae &

Caulis bipedalis tercostriatus. Folia radicalia semipinnata caulina
pinnatifida, latiora ^{in montana} quam in reliquis omnibus ^{obtusis} Allii, basi attenu-
atae vaginantis vagina membranacea tenuis! Spata membrana
acea reflexa latera, longitudine parum exulorum. Petala ^{arida} ~~alba~~
albo-flavescentia

6 subhirsutum Allium foliis ~~hirsutis~~ lanceolato linearibus ^{inferioribus} ~~hirsutis~~, staminibus
subulatis

Moly Dioscoridi Clus. hist. 1. p. 192.

Moly angustifolium umbellatum Bauh. Pin. 75.

Moly Dioscoridi parvum quibusdam Bauh. Hist. 2. p. 560.

Allium foliis radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, flori-
bus umbellatis Hall. All. 15. opuscul. pag. 360

allium subhirsutum caule planifolio umbellifero, foliis inferio-
ribus hirsutis, staminibus subulatis Lin. S. V. pag. 321.

Habitat in Barbaria, Italia, Hispania, Oriente &

Semipedalis. Caule lavi, inferne folioso. Folia graminea utrin-
que attenuata caule longiora, pilis rariis prope marginem adpressis. Spatha monophylla ^{creta acuta} membranacea
pedunculi breviora. Pedunculi capillares erecti fastigiati. Petala lanceolata albida nitentia. Filamentum petalis
breviora

allium trifoliatum Cyrilli plant. rar. sicil. fasc. 2.
vix species differit. Legi eandem tam Neapoli quam
Tuneti

7 magicum Allium *Caule planifolia* caule ramulo bulbifero, flaminibus propli-
cibus den Spec: pl. pag. 424* S.V. pag. 321.
~~Moly latifolium Dodon. Herpt. p. 605~~
Allium

an Diversa ab Allio nigro

non vidi

obliquum Allium Stamini bus filiformibus, flore triplo longioribus Lin. Spec. pl.
p. 424. * S. V. pag. 321.

Allium radice tunicata, foliis planis linearibus caulinis, capitulo
umbellato Gmel. Sib. 1. p. 49. t. 9.

Habitat. in Siberia

Caulis bipedalis, teres. Folia alterna, plano canaliculata, obliqua
vaginae teretibus striatis. Umbella globosa. Spatha ovata, acuminata
brevi purpurea. Petala ovata, emissa, concava, pallide flava
carina viridi. Filamenta simplicia, colore corollae. Antherae lutescae
Lin.

9. ramosum Allium foliis linearibus subconvexis, staminibus umbella subsessata
staminibus simplicibus

Allium siapo nudo Verki fano; foliis semicylindricis, staminibus convexis
Congonibus Gmel. sib. 1. p. 52. t. 11. fig. 1. bona

Allium ramosum caule planifolio umbellifero, staminibus subulatis
Congonibus, umbella globosa, foliis linearibus subconvexis her. Spei.
pl. pag. 425. * S.V. pag. 321. fide herb. her.

Habitat in Sibiria apud compositus ancipite

Caulis fere bipedalis teres folia basi foliosa. Folia planiuscula, pani-
culata. Spatha aphylla ovata brevissima. Pedunculi subaeuales
Petala lanceolata, pallide purpurascens. Filamenta fere
longitudine corollae. E medio caulis videndum Ramus nudus, longitu-
dine corollae.

10 roscum Allium umbella fastigiata, petalis emarginatis, staminibus brevissimis sicut
pluribus Lin. S. V. pag. 321. Spec. pl. pag. 432.

Allium sylvestre f. moly minus, roscum amplo flore Magn. Monsp. II. t. 10

Allium foliis ensiformibus, radice bulbis stipitata, floribus amplis um-
bellatis Pauc. Monsp. 42.

Habitat Monspeliis, Pedemontis Neapoli in vineis et cultis. 2

Radix bulbi
plures sub bulbo
majore

~~Pedales vel bipedales glabri teretes. Folia~~ linear-lanceolata,
atenuata, scapo breviori. Si apus teres, gl. coris, pedalis.

Spatha bifida, brevis (in subhirsuta monophylla) Pedunculi
pollicares. Petala oblonga, obtusa ^{paucissima} purpurea, vel alba dorso
dilute purpurea, nitida, majora quam in reliquis speciebus.

Stamina simplicia brevissima.

Bulbi interdum in umbella

tataricum Allium foliis semicylindricis, staminibus simplicibus, umbella plana
Lin Suppl. p. 1967 S. V. p. 322.

Habitat in Siberia

Caules teres teres, semipedalis versus basi foliosus. Folioa caetera
cuculata, lora, vix caule breviora. Spatha bivalvis
subrotunda marcescens. Umbella fastigiata. Corolla
plana alba. Petalis lanceolatis carinatis. Filamenta
basi coeacta, petalis breviora. Lin l. l.

Coenocentrum A. Umbella globosa, ramis simplicibus foliis lanceatis: vaji
ni pinnatis Pallas d. 2. p. 737. tab. A.

non vid.

Lineare A. umbella ~~globosa~~ flammulae ~~unicuspidae~~, corolla Duplo
Compositis Gmel. ~~pt. 1. 7. 13. 14. fig. 1.~~

non vidi

12 fativum Allium bulbo composito, Stamimbus tricuspidatis Len. V. p. 322.

Allium Dod. pempt. 602. Com. epist. 320.

Allium fativum Bauh. Pin. 73

Allium vulgare vel fativum Bauh. hist. 2. 555.

Allium stamibus alterne trifidis, foliis grassineis, capita bulbi fero,
radicibus in unum bulbum congruentibus Hall. opus. p. 331.

Habitat in Italia Sicilia

- Bulbi plures extra bancam collecti. Caulis tripedalis foliosus.
Folia plana, lata ad duas Capitulum parvum rariore planta
Spatha monophylla sensim attenuata. Flores pauci

in herbario deest

13 Scordoprasum. Album foliis margine scabris, vaginis anicipitibus, staminibus truncatis
Lin S. V. pag 322.

Scordoprasum. Clus. p. 2 hist. p. 209. 210. 211.

Allium sativum album sive Allioprasum caulis summo circumvoluto Bauh
Pin. 73

Allium genus Ophioscorodon dictum quibusdam Bauh. h. 2. p. 559

Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, scapo ante maturitatem
contorto Hall. opus. pag 334.

Allium capitulo bulboso erecto, foliis planis subternatis: vaginis anicipi
tibus Lin. flor. huc. 270*

Habitat in Europa boreali, Pannonia

Bulbi orato Ingueti, caulis bipedalis et ultra, interdum ante florescentiam
sub capitulo flexus contortus cernuus nutans. Folia graminea alter
na. Spatha diphylla monophylla longit capitulo panum brevior
Capitulum globosum. Bulbi globosi. Pedunculi pauci ungui
culari purpurascenti, Petala ovata, acuta. Filamenta longitudine
petalorum.

14 arenarium Allium vaginis teretibus, spatula mutica, staminibus tricuspidatis Lin.
fl. Sueic. 2794 S. V. pag. 322. Flor. Dan. N. 290

~~Porrum~~
Allium five moly montanum latifolium Clus. hist. Bauh. h. 2. p. 560

Allium montanum latifolium bicorne, flore edute purpurascente
Bauh. Pin. 74

Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis
Aster serratis Hall. opusc. pag. 336.

Habitat in Scania Danica, Thunbergia arenosis

Scordosopo minor et angustior. Bulbi et florenti consueti. Stamina
corolla paulo longior. Spatha obtusa. Folia margine integerrima,
angustiora et graminea. Vay.

Porrum latifolium, staminibus alterne trifidis, umbella bulbifera Repp.
Hall. 154. t. 2. fig. 2.

in herb. de sid.

55 *Carinatum* Allium *staminibus subulatis, spatha longissima* Lin

Ampeloprasum proliferum Lobel. Ic. p. 156

Allium inodorum, umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis canalicatis

Hall. Cruci. p. 391. Tab. 2. fig. 2.

β. Allium f. *moly montanum* ? - Clus. hist. 1. p. 195.

Habitat in Europa boreali

Bulbi exigui ad radicis basin majores. Caulis interdum quadripedalis. Folia
pulposa succulenta, plana, obtusa, pedalia. Spatha diphylla
basi dilatata, nervosa, subulata, foliolo altero ^{sesquipedalibus} pollicari. Capitulum
gymnium. Peduncululi pauci penduli. Corolla campanulata
Petala ochroleuca externe officinorum, interne ditissima, cuncta vix
filamenta corollae breviora

26 *Pallasi* Allium umbella difformi, staminibus simplicibus corollam equantibus
Stylo brevispino Murr. in Com. gött. 1775. p. 32. t. 3. s. V. pag. 323

Habitat

Caules subterrefolius

non rdi

16 Sphaerocephalum Allium foliis semiterribus; staminibus tricuspidatis corolla longioribus
lin. S. V. p. 327. All. flor. Pedem. 18724 Poll. hist
Moly montanum purpureo flore Cluj. hist. 1. p. 195
Allium montanum capite rotundo Bauh. Pin. 75.
Scorodoprasum montanum junctifolium, capite rotundo dilute purpureo,
no, floribus paucis Michel. gen. 25. t. 24. fig. 5.
Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, spica sphaerica
non bulbifera fraxea virente Hall. opusc. p. 353.

Habitat in Italia Sibiria, Helvetia &

Folia minus fistulosa quam in A. dependente, sed plana. Petala
nunquam patentia. Radix bulbo unica, neque adnatis bulbis
ter habet All.

Petala virentia nec atropurpurea. Caulis glauci. Spatha bifida

17 parviflorum Allium umbella globosa, staminibus simplicibus corolla longioribus
Spatha subulata her. spec. pl. pag. 427. S. V. pag. 322.

Habitat in Europa australi ^{et in America simpliciter}
Taxis A. sphaerocephali. Bulbus oblongus, tunicatus. Caulis teres striatus
foliosus. Folia longitudine fere caulis subulata. Umbella globosa,
floribus minimis: Petalis exterioribus ovatis, trifloribus; interiori-
bus duplo longioribus, lanceolatis, purpureis. Stamina sim-
pliciter, corolla longiora, uti etiam stylus. Spatha corolla longior
diphylla.

Descendens Allium pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tripedatis ^{colle longiori}
pag. 323. *Allion. fl. Pedem-ped. n. 1073.*

Habitata Helvetia, Italia

Difficile distinguitur a *Sphacephalo*. bulbulo^r duos ad caulis
originem constanter habet; folia fistulosa, supra canaliculata;
caulis bipedalis. *All. l. c.*

Folia angusta umbella glabra pedunculi inferiores breviores.
Petala evata, acuta concava. Stamina petalis dimidio longiora
fruttha triphylla

*Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite suave
nubente Sphaceo non bulbifero atropurpureo* *Hall. opusc.*
p. 355.

~~vid. colus adhuc non specimen Lebani ad Sphaceo. vel hanc partem~~
Difficile enim a charact. *Allion.* distinguitur a *Sphaceo* ^{alio modo}
_{intus petendo}

19 moschatum Allium umbella fastigata pedicellis umbello erectis fastigiatis, petalis
lanceolatis ^{simplex} staminibus corollae brevioribus foliis setaceis
moly moschatum capillaceo folio Bauh. Pinod. p. 287.

Allium sylvestre perperillum junia folium moschatum Bauh. Hist. 11.
p. 565

Allium foliis terribus caulinis, floribus umbellatis Hall. All. ¹⁴ 367.
opuso: pag. 367.

~~Allium~~ moschatum, caule teretifolio umbellifero, umbella
fastigata subperflora, petalis acutis, staminibus simplicibus,
foliis setaceis Lin. S. V. pag. 322.

Habitat in Galloprovincia Narbona Hispania apud elevatis &
caulis pedali inferne ^{interdum per magni petalis} folios, tenuis an angulatus, tenuis
folia superne aphyllus. Folia inferne plura seapo duples
breviora rigida. Spatha diphylla subulata longitudine
pedunculorum altero minore. Peduncululi filiformes sub
aequales interdum 3 saepe ultra 3. Corolla longior ^{quam in brass} ^{simplex} ^{petalis} ^{bra}
sequentibus petala pallida purpurea. filamenta ^{simplex} ^{petalis} ^{bra}
vera

20 flavum Allium floribus pendulis, petalis oblongis obtusis, staminibus corolla longiori-
bus

Allium f. moly montanum W Clus. hist. 1. 194.

Allium flore luteo f. pallido Bauh. hist. 2. p. 561

Allium. foliis teretibus, vagina biterni, umbella lutea pendula Hall.
opus. 24. p. 305.

Allium flavum; caule teretifolio umbellifero, floribus pendulis,
petalis ovatis, staminibus corolla longioribus Lin. S. pl. pag.
42 & S. V. p. 323. Haecq. fl. Austr. v. 2. t. 141

Habitat Monspelii &

Spontanea in thamao culta pedalis et ultra. Caulis teres striatus
inferne foliis vaginatus. Tolia subulata recurva glabra
spatha diphylla patensissima umbella triplo longior foliis
subulatis recurvis, basi planis membranaceis sulcatis ~~sub~~ striis
viridibus altero minore in spontanea sequipollentaria.
umbella multiflora. Pedicellis capellanibus inaequalibus
vix unguiculatis ^{longioribus} ~~laxis~~. Corolla flava obovata, campanula
truncata. Pet. stamina et stylus corolla longior. anthera fulva