

caulis Althaea

Habitat in Syria herb. Desfont

Stipes radicalis, longe petiolata, vix pollicaria, subcordata, inaequaliter crenata, obtusissima, utrinque villosa et venosa, supra scabru sculo, subtus lanescens, subreticulata. Petioli quadrupollicares. Flores pedunculati, congesti in apice radicis. Pedunculi semipollicares, uni flori. Calyx exterior 7. fides. Calycis villosi. Corolla magnitudinis Malva sylvestris

Lutea Althea

Habitat in Oriente: herb Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, villosus-subtomentosus, inferne teris, superne angulatus.
Folia petiolata, 3-4 pollicaria, ovata, obtusa, crenata, utrinque villosa, subtus
pubescentia, venosa. Stipulo 3-4 fido, breves. Pedunculi axillares, 2-3 polli-
cari, uni flori, indivisi. Calyx incurvus, exterior 7 fido. lacina ovata
lanceolata. Flores magnitudine Alth. officinalis cui affinis

~~Althaea~~
Althaea byoniifolia Benth. prodr. 130 Herb. Mus.
red t. paper

Althaea byoniifolia Benth. prodr. 130 Herb. Mus.
red t. paper

officinalis A. foliis simplicibus tomentosis P.V.

fl. Dan. tab.

530

Althoea Euehy hist. 15. Cam. epit 667.

Althoea Dioponidis et *Plinii* Bauh. pin. 315.

β *althoea laciniato folio* Bauh. pin. 316.

Habitat in Hollandia, Anglia, Gallia, Sibiro subhumidis

⁴
Caulis erectus albus ^{angulato} tomentosus canescens. folia petiolato
ovata oblonga, lobis ^{angulato} sublobis lobis acutis inaequaliter
ferratis utraque mollissimis. Stipulis subulatis pedunculis
axillaris plures pedunculis usque pollicantibus vel minoribus
Cal. ext. ^{subtundis} 9 fidus ~~ca~~ laciniis linear lanceolatis interior
laciniis ovatis acuminatis

althoea officinalis caule erecto tomentoso, foliis cordatis obsoletis
lobatis tomentosis Cavan. disp. pag. 93. t. 30. fig. 2

rosea A. foliis sinuato-angulatis Lin. l. V

Malva hortensis Dod. pempt. 652.

malva rosea, folio subrotundo Bauh. pin. 315.

Habitat in Oriente I.

Caulis erectus 4-6 pedalis angulatus inferne ramosus villosus. Foliis
petiolata. alterna cordata 5-7 angulis, angulis obtusi crenatis
subrugosa subtus pubescentia, mollia, septemnervia. Stipula lanceola
ta. petioli villosi pubescentis. Flores axillares subsolitarii
brevis pedunculati superne spicati Calyces villosi tomentosi
est error si qua vel officinae Linnæi ovato-lanceolatis. petala
pubescentia. Caps. 4 circiter 30.

althæa rosea caule erecto, foliis ovatis cordatis 5-7 angulis crenatis
Cavan. obs. pag. 91. tab. 21. fig. 1

althæam et alicam generæ conjungit Cavan 4us. Schreb

huensis Aeth

Althaea huensis caule erecto glabro inferne ramoso, foliis cordatis scabri
crenatis angulatis radice annua Caran. Desf. pug. 92. tab. 29. fig. 3
althaea churensis Lamour.

Habitat in Chura O

Caulis teres 3-4 pedalis per totam longitudinem floridus. Folia petiolata
inferiora subrotunda 7 angulata superiora lobata. lobo medio producta
v. stipula fissa. flores axillares saepe bini. Calycis tomentosi corollae
6-8 pediculi laciniis lanceolatis. Corolla maxima roseis apice purpurea
nascendi Caran.

acaulis Alth.

althaea acaulis caula crasso minimo, folus numeroſi, flombuſ ſpiciatis

Caran. Def. p. 93. tab 27. fig. 3

Malva roſea folio ſubrotundo Chalpenſi acaulis, flore pallide lacteo
mon. hilt. p. 524. 2021.

Alt. ab. itat.

⊙

Caulis pluſer 2-6 pollicares divaricati firmi erecti caſpitie digit
ſubtomentoſi uti tota planta. folia longe petiolata cordata
rotundato lobata rugoſa venata: lobi in folio ad ultionem obli
vati. ſtipula lato ciliata. flori axillares ſolitani in ſpicam
conglomerati brevis pedunculati. Cal. extenor 6 dentatus Petala
pallide lactea unguibus villoſi Caran.

michi ignota

coromandeliana A

Althea coromandeliana foliis subtriangulatis crenatis obtusisque nervis
subturbis: floribus in cernatis simplicibus solitariis Caran. D. S. f.

per 93.
Habitat in Coromandel

Caulis herbaceus, uti tota planta tomentosis. Folia petiolata obtuse
triloba. Stipulae breviter floer axillares subturpi. Cal. exterior 6-8
Caran.

non vid.

Sisifolia A. foliis palmatis Lin. S. V

malva rosea simplex peregrina Tabern. hist. 315.

malva rosea, foliis ficus Bauh. pin. 315

Habitat in Oriente ♂

Caulis angulatus pilosus. Folia inferiora magna, longe petiolo

4a 5-7 lobata lobis saepe oblongis obtusis, sinu crenatis
suprema hastata utraque pubescentia subtus albicante.

Petuli villosi inani. Stipula trifida laciniis laciniola

si flores ^{germini} inferiori axillares superiores solitarii
breviter pedicellati Calyx villosus tomentosus scaber

^{thea}
alter *Sisifolia* caule erecto foliis inferioribus palmatis 7
lobis crenatis superioribus hastatis Caran. des. 92
tab 20. fig. 2.

grandiflora Aeth. foliis cordatis angulatis tomentosis patulis, pedunculis subtrifloris
Scop. del. in f. 2. p. 334. 17

non vid.

Corymbosa A. foliis simplicibus cordatis angulatisve glabris, pedunculatis calycibusque pelosis, floribus corymbosis Sw. prodr. p. 101.
Habitat in Hispaniola

non id.

narbonensis A. foliis utrinque tomentosis: inferioribus quatuorlobis;
superioribus trilobis, pedunculis solitariis unifloris Hort
New. 2. p. 445. Jacq. Coll. 2. p. 275

Althaea narbonensis caule tomentoso, foliis cordatis dentatis
inferioribus angulatis acutis, superioribus subobovatis
Cavan. Desf. 2. p. 94. Tab. 29. fig. 2. Pomerai in Act. Tolos

3. p. 307.

Glaberrima G. Aestiva 4

^{mollis} *Tota planta pubescenti subtomentosa subincana. noll & foliis*
petiolata inferioribusque dentata inferiora subindistincta
obtusius angulata sublobata sequentia s' lobis superiora
trifido hastata for. inequaliter serrata lobis int. lanceolatis
intermedio productione ^{trifido linearibus concinatis} pedunculi axillares et in
terminali plerumque gemini omnino utri
canabere cui maxime affinis. Anlli glabri

trifido hastata pedunculis solitariis
geminisque alterotifloris

hirsuta A. foliis infidis piloso-hispidis, supra glabris, pedunculis solita
ris unifloris h. spec. pl. p. 966 & Jacq. fl. austr. v. 1. 170

Aleica villosa Dalech. hist. 594.

Aleica hirsuta Bauh. pin. 317.

Aleica hirsuta minima, flore copio, hispanica Barr. u. 1169

Habitat in Gallia, ^{Moravia} Italia, Hispania, Austro-septibus.

Aleica hirsuta foliis cordatis piloso hispido supra glabris, radice
libris numerosis subrotundo-lobatis caulibus trilobis quinque
brisque, pedunculis solitaneis unifloris Pavan. d. p. 75
Tab. 29. fig. 1.

Caulis plures, pedales, hirsuti piloso hispido ubi tota planta, exceptis
foliis supra diffusis subramosa folia longe petiolata
reniformi subrotunda inferiora ^{pollicifera, latiora quam longa} crenata integra 5 nervia
superiora 5-7 sulcata sequentia quinquefida superiora trifida
caulinis apice dentatis lateribus integerrimis ^{stipula}
stipula lanceolata adnata pedunculi folio longioris
calyx ex deno 8 sed uti laciniis uti interiori lanceolata adnata
ta. Corolla calyce dimidio longior ^{numerosi stigmatum et capsularum}
subrotunda crenato-varia.

veluti

hispida 1

foliis inferioribus reniformibus superioribus 5fidis
caule calycibusque piloso hispido

Ludwigii A. foliis lobatis utrinque nudis, pedunculis congestis
unifloris Lin. Mant. 90. t. V. pag. 624
Alcea minor sicula, flore major minore Ray her. V. 605:
Habitat in Sicilia O

Caule: erectus pedalis pilis raris adpressis. Folia longe
petiolata, glabra inferiora bipollicaria superiora vix
pollicaria subrotunda basi subcordata sive lobis
obtusis apice crenis 3 bus majoribus. Petiolus folio
duplo longior. stipula linearis. flores ^{com.} axillares densi
~~glomerati~~ ^{congesti} breiter pedicellati. remoti, calyces hispidi
lacini lanceolati. Corolla calyci subaequalis. capsula
subdecem glabra

Althaea Ludwigii caule erecto, foliis subrotundo sive lobatis
lobis trirenatis, floribus minimis congestis peduncula
tis Lavan. des. p. 96. tab. 30 fig. 3

Cannabina A. foliis inferioribus palmatis, superioribus Digita-
tis. L. S. Jacq. fl. austr. 2. t. 101.

Alicia fruticosa, cannabino folio Clus. hist. 2. p. 25

Alicia cannabina Bauh. pin. 316.

Habitat in Hungaria, Italia, G. Narbonensi ad Sylvanum mar-

genes 4

Caulis erectus teres pubescens, ramosis oxyali. Folia
petiolato inferiora profunde 5fida superiora trifida a lat-
eribus lanceolatis attenuatis utroque acuti utroque peltata
stipula linearis. peduncululi axillares et ex apice rami
longior gemini alter parum longior. Cal. ^{interius} ext. 7-9 fido
laciniis lanceolatis interior pentagonus laciniis ovatis

acuminatis. ^{interius} peduncululi gemini alter biflorus longior alter brevior fl.

Aethaea cannabina foliis inferioribus ovatis palmatis dentatis
superioribus hastatis laciniis media longioribus Cavan
Diss. pag. 94. tab. 30 fig. 1