

Alysum

x caule fruticoso

1. *penosum* A. ramis sessilibus ^{formibus} spiniferis ~~et~~ nudis.
2. *halimifolium* A. caulebus procumbentibus, foliis cuneatis argenteis ^{gerrinai} caete
3. *saxatile* A. caulebus paniculatis, foliis lanceolatis mollioribus ^{subrepens}
4. *alpestre* A. caulebus diffusis, foliis ^{fratellatis} subrotundis incanis, calycibus coloratis

xx herbaica

5. *hyperboreum* A. foliis incanis lanceolatis dentatis, staminibus quatuor bifurcatis
6. *incanum* A. caule erecto, foliis lanceolatis integerrimis, ^{incanis} petalis bifidis, filiculis oblongis
7. *minimum* A. caulebus diffusis, foliis linearibus ^{ob} tomentosis, filiculis orbiculatis compressis glabris
8. *campestre* A. foliis lanceolatis caule filiculisque compressis stellato pilosis, calycibus deciduis, staminibus sexibus parvis

9. calycinum A. foliis lanceatis cae filiculisque subrotundis tumidis incanis,
 staminibus omnibus deactis, calycibus persistentibus
10. montanum A. ^{caulisque effusus} foliis sublanco-latis, pilos^{is} echinatis, filix calycibus
 deciduis filiculis ~~compressis~~ orbiculatis emarginatis
11. alleionii A. foliis cuneato-lanceolatis subtus incanis filiculis oblon-
 gis compressis foliis lanceolatis subtus germina villosis-filiculis
12. clypeatum A. caule erecto, filiculis subs^{is} plebis ~~et~~ ovatis compressis,
 petalis acuminatis lanceatis
 xxx filiculis inflatis f. calycibus oblongis clausis
13. sinuatum A. caule herbaceo, foliis lanceolato-deltoidibus.
14. creticum A. caule fruticoso, foliis lanceolatis subdentatis to-
 mentosis, filiculis globosis
15. gemonense A. caulis suffruticosis, ramis duran^{is} catis, foliis infami-
 lanceolato oblongis, filiculis oblongis
16. atriculatum A. caule erecto simplicissimo, foliis radicalibus cilia-
 tis caulibus lanceolatis glaberrimis integerrimis
17. vesicularia A. foliis lanceatis deactis, filiculis globosis angula-
 tis acutis (differentia emendanda)
18. deltoideum A. caulis suffruticosis prostratis, foliis lanceola-
 to deltoideis filiculis hirtis

Alyssum

vesicarium Alyssum foliis inferioribus linearibus ^{tridentatis}, superioribus
oblongis subintegerrimis, filiculis inflatis.

Vesicaria orientalis Tournef. Cor. pag. 49. Itin. ed. 4. pag. 252.

Tab. 252. Ed. 1727. 8^o fol. pag. 99. Tab. 94.

Vesicaria Armena minor Tournef. herb.

Alyssum vesicarium foliis linearibus dentatis, filiculis inflatis
triangulatis Lin. S. V. pag. 591.

Caulis plures, herbacei, digitales vel paucos ultra, simplicissimi,
glaberrimi, uti tota planta.

Folia sessilia, basi et in medio cauli saepe verticillata: ^{alia, juniora} ~~alia, juniora~~

Verticilli remoti
interjecto folio uno
vel altero

^{superiora} reflexa pollicaria, ~~alia, juniora~~, unguicularia erecto-
patentia; omnia linearia, versus apicem dente utrinque
unico vel gemino remoto, acuta: ^{superiora} versus flores ~~et~~
^{bilinearia} ~~alternata~~, sessilia ^{inflata} oblonga, acuta, arenaria, plerumque in
tergerrima

A distanter

Racemus terminalis. Flores quinque vel septem.

Filicula magnitudine nucis avellanae, inflata, subglobo-
sa, membranacea, e nervis quatuor longitudinalibus suban-
gulata

Turnitidis Alysium
habitat in oriente herb. 4 usq.

Alysium orientale Turnitidis folio flore luteo Tournef. Cor.

Caulis herbaceus, erectus, palmans, ramosus, uti folia villosa-subcanescenti. Solum
radicalia lanceolata, vix pollicaria: caulina oblonga, remota serrata:
serraturis paucis. Racemi terminaliter. Flores minuti. Siliicula oblonga,
absque stylo, parva
forte potius species Draba.

crassifolium Alysseum

Alyssoides orientales annua, myagris fativi folio Tournef Cor.

Caulis herbaceus vix perthamens, ramosus, pulis raris oculo armato videndis
adpressus. Folia cuneata, integerrima, pollicar vel subrepanda, pollicana,
obtusata, avenia, glabra. Racemi laterales et terminales: pedicelli capella
reo, patentissimi, calliculo oblongo glabro, inflato, mucronato, unguiculari.

Tenuifolia Alyssum.

Classi orientale *Tenuifolium*, canescens, flore albo. Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. Quis.

Caulis digitalis, simplicis, ~~alopi~~, incani filiformis, inferne foliosi, superne
superne folio uno alterove. Folia unguiculata, inferne conferta, minima
oculo armato, pulis stellati, linearia, integerrima. Conyctis terminalibus
secundum seque Tournef. pectus cauli videtur ramosus.

Eiusdem generis ac *Alyssum* maxima est.

obtectum Alyssum calycibus persistentibus silicula longioribus subinflatis

Habitat in Paejo herb. De hesper. 7

Tota ^{planta} incana, siliabruptula. Caules pithamos, simplicis, erecti. Folia radica
lia frequentia, caulina alterna; omnia linearia, basi versus attenuata
vel subcuneata, laevia, sessilia 2 pollicaria. Racemi terminales. Flores plu
res. Calyces clausi, persistentes, quinquefidi ovati, silicula longiora, sub
inflata. Pedunculi patentes. Petala lutea, cuneata. Stamina duo super
ne dentata. Silicula globosa, glabra, calyce duplo minor, tetrasperma

pyrenaeum Alig. sum

Gouan

Habitat in Pyrenaeis herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, superne ramosus, teres, glaber. Folia radicalia petiolata, oblonga, dentata glabra, semi-pollicaria: caulina pennatifida, linearia. Racemi terminales: pedicelli patentes. Siliculo oblongo, stylato

Crochomon Alysium

Habitat in Hispania Lib. Scopul.

Caulis erectus, pithamos, simplex, vel superne ramo uno vel altero, emicans.

Folia linearia, mucosa. Racemi pauciflori. Calyx et corolla persistens. Siliula
subrotunda, hirsutissima, e lana alba, florescente, compressa, semiventriculari.

Calycis foliolo, uti petala oblonga

Alysiu?

Habitat in Hispania herb. Jusf.

Caules plures; basi ramosi, ciliati, inani. Sola nitida, sicut unguis alani, in
cano ~~lanceolato~~ suburgente, obtusa, integerrima, frequentia, furfur ne remotiora.
Pedunculi prothamici, erecti, filiformes, inani, flores parvi. Pedicelli distincti
patentissimi. Silicula orbiculata, glabra, lensima, stylo mucronati.

Linnaeus

Alyssum

Lunana fruticosa perennis incana laucori folio Tournefort. Cor.

Habitat in Orienta herb. Mus.

Radix apice in ramos ^{in cultu congrua} plures varie flexos diffusis. Caulis tomentosus, incani. Sola
confecta, unguicularia, ^{in cultu congrua} cuneata, tomentosa incana. Corymbi pauci flori. Sili
qua semi pollicares, oblonga, incana, acuminata.

Alyssum

Alyssum orientale serpyllifolium Capsulis in spicam longissimam dense congestis
Torez herb. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis erectus, lignosus, palmari, ramosus: rami in summi oppositi, superiores alter-
ni, patentissimi, simplicissimi, uniaxi. Folia semipollicaria vel minor, laniceo-
tuba, basi attenuata, uniaxi

Ellypsum

Ellypsum orientale serpylli-folio, Elichrysi capitato Torrey. Cor.

Habitat in oriente herb. maj.

Caulis plures, simpliciss, semipetaler. Corymbi ex axillis supremis

Alysum

Alysum orientale serpyllifolium, capfuli minimi Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis plures, erecti, inani, longitudine Digiti intermedi

a

Habitat in Hispania VV. Desf.

Fruticosa. Folia linearia, integerrima. Siliula orbiculata glabra

~~Stufena~~

tomentosa & siliiculis orbiculatis bilocularibus, foliis subtomentosis hinc
mant. 92. l. V. pag. 591.

Alysum creticum saxatile, serpylli folio candidissimo, capsulis orbicu-
latis Toumef. cor. 15.

Alysum orientale caulebus frutescentibus paniculatis siliiculis obor-
bitatis compressis dispermis Ad. spec. 2. p. 32. t. 15. fig. 1.

Habitat in Oriente &

~~caule pluri suffruticosi~~ Desfusi. Radix superne densa in caulis breves
frutescentes descendens a quorum apice cauli erecti, subincurvi.
ramosi. Folia cretana inferiora plerumque ovata oblonga, sinua-
ta & repollidana. caulina sessilia linearia lanceolata integerrima
vel denticulata rariis terminalibus et axillis supremis. Flo-
culi. Siliicula orbiculata compressa biloculari disperma.

tomentosum Alysum

forte melius Alysum adjungitur
non vidi

mantima Q. perennis, foliulis bilobulatis ovatis dipteris Len
Sp. pl. p. 910* mant. 426.

Thlaspi montanum perenne flore albo Barr. ii. p. 44.

Thlaspi narbonense, centunculi angustifolio Tabern. ca. 461.

Thlaspi alysson dictum mantimum Bauh. pin. 107.

Habitat in G. Narbonensi; Hispania mantimis, &
Caulis prostrati perennante ^{ramosissimi} ~~superne canescentes~~. Solea canescentia
lineana sessilia acuta in gemma racemi brevis terminales

mantimum alysson

Habitat alyssi et foliula modo monosperma et flamina edentula
si una cum tomentosa retineatur sub clypeola. Character foliula
emarginata deletur sed tam sit genus naturale si cum ponthlaspi con
mantis

Spinosum A. ^{mis L. & C.} racemis ~~spilibus~~ spiniformibus nudis. Lin. Sp. pl. p. 907. y

1. v
Thlaspi fruticosum spinosum Bauh. pin. 100.

Leucosum f. Thlaspi spinosum Bauh. hist. 2. p. 931.

Thlaspi spinosum hispanicum Bar. ii. 000.

Habitat in Hispania, Gallia cautebus &

in pediculis semipedalis ramis ^{rigidis} inferne inferne

superne ramis spinis ramis flexuosis & pedunculatis

persistentebus ramis vili foliis plenisque persistentibus

induratis canis. folia lanicolata basi albennata, ^{meis} squamis

menstruissellatis vili armato videntis argenteis polliciana

Racemi ex ramulis ultimis spinis persistentibus. pedicelli patenti

triflori vix unguiculati

halimifolium Ed. caulibus procumbentibus perennantibus, foliis lanceola-
to-linearibus acutis integerrimis lin. s. v

Thlaspi halimifolia, semper viridi Herm. Lugd. 594. t. 595.
Thlaspi parvum, halimi angusto in cano folio Boerh. mus.
2. p. 45. t. 39.

Habitat in Europa australis aridis &
Caules ramosi. Sola in ramis sterilibus confectis majoribus
policaribus in ramis femurquiculantibus minoribus
ubi rami speli stellati argentei, cuneiformia.
Silicula oblonga, tetra, sermo glabro

fastigiale A. caulibus frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis
mollissimis repandis. Cord. prec. 1. p. 10. t. 7.

Thlaspi luteum leucog. folio Boiss. mus. 79. V. 93.

Alyssum creticum fastigiale, foliis undulatis inanis Tournef

Cor. 15.

Habitat in Creta &

Rauii plures palmari & versui radicem aphylli squamis
& petioli persistens superne ^{ramos} terti. Solia inferne
conferta basi attenuata sequi pollicaria ^{ubi pappum} a petio
denso stellati tomentosa, mollia integerrima vel obtusa
subpinnata. Caulis ramosus & stantia linearis lanceolata
vix pollicaria ^{tomentosa} florum parvi flavi. Sili.cula
obtusata compressa & glabra. Radix superne ramulis
conferti simplicissimi

et nota

alpetre. caulis suffruticosi diffusi, foliis subrotundis, incanis, calij
Cibus coloratis Ger: g. prov. 32. 8. 13. fig 2. Mart. 92. 75. V.

590

Habitat in Alpibus cjaloprovincie ^{inferiorum} versus ^{partem} Ahaliam 2

Caules laxi, palmari simpliciter decumbentes piliformes
superne incani. Folia subpeltata, parva obtusissima

integerrima uti caulis superne et pilis minuti stellatis canis
Cal. flores primum corymbosi flavi calycis flavescentes.

Decidui

ramuli inferiores tenues foliis conferti. Petala calycis

Duple Congrua

Lycopericon A. caulis herbaceus, foliis intans dentatis, flaminibus quatuor
bifurcatis. Lin. Spec. pl. p. 9104

Lunaria foliis ellipticis inordinate dentatis Kropfen. act. petr.
1747. p. 301. t. 15. pag. 1.

Habitat in America Septentrionali.

Flamina 4 basi squama emarginata 2 breviora unguem
to notata. Lin.

non vidi

minimum A. caulebus herbaceis diffusis, foliis linearibus tomentosis,
filiculis compressis Lin. l. v.

Lunana annua minima Hispanica, foliis leuciji maritimi
Boeck. Leydb. 2: p. 6.

Habitat in Hispania O

Caulis filiformis digitales ramosi. Folio uti caulis pilis fella
si pubescentia filiculae floris minuti. filicula
subrotunda glabra.

glabra

Culta

incanum A. caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, flo-
ribus corymbosis, petalis bifidis Lin. S. V.

Thlaspi incanum machlinense Clus. hist. 2. p. 132.

Thlaspi fruticosum incanum Bauh. pin. 100.

Habitatio Europa septentrionali in arenosis, apricis & S.

Caules erecti sequipedali perenne ramosi a pulvis stella
4-5 uti folia, si aber. folia septem bipollicaria in
culta vridiora. Flore prope corymbosi demum
racemosi. silicula brevis oblonga acutiuscula incana.

com
ompetre A. caule herbaceo ramisibus stipatis pariflorum, calycibus
deciduis. Lin Sp. pl. p. 909

Thlaspi montanum inianum tuberosum, serpyllifolium, majus.
Baut. p. 107.

Habitat in Gallia. C

Similemum calycinum petalis caule foliis sed magis de
cumbens foliis latioribus. filamenta absque dentibus. r.
foliorum petala a receptaculo filamentis compressis, magis
tomentosa ha

Caulis uti tota planta minus iniana pilis magis
di. tantibus longioribus

calyx sem caulebus herbaceis, foliis punctatis, plicatis
obtusatis, nudis Ger. fl. 9. pro. pag. 351. huius speciem
videtur a calycino differre prolesca quod magis propro
ta filis calycis decidua

calycinum A. caulibus herbaceis, flaminibus omnibus dentatis caly-
cibus persistentibus Lin Spec: pl. p 9084 Faerq. fl. Austr.
4. 8. 338.

Alysson Cam epit. 558. p. 1.

Alysson minimum Clus. hist. 2. p. 133.

Thlaspi alysson dictum campestre majus Bauh. pin. 107. Bam
ii. 900. 11. et 912 n. 21.

Habitat in Austria, Gallia, Germania. O ~~rami~~ ^{pendentes.}

Caulis inferne lignosi teretes scabri ^{solia} ~~canescenti~~ ^{pubescenti}

lanceolati ^{canescenti} ~~rami~~ ^{superne} ~~pili~~ ^{bellati} ~~canescenti~~ ^{canescenti}

obtusiusculi ^{marginati} ~~obtusiusculi~~ ^{marginati} ~~obtusiusculi~~ ^{marginati}

~~obtusiusculi~~ ^{obtusiusculi} ~~obtusiusculi~~ ^{obtusiusculi} ~~obtusiusculi~~ ^{obtusiusculi}

petala minima ~~in~~ ^{emarginata} flava ~~oblate~~ ^{oblate} alba

montanum A. caulibus herbaceis diffusis, foliis sublanicolatis punctato-
ciliatis. V. p. 5707 Jacq. Austr. 4. V. 330. 37. Ind 2504

Thlaspi alpinum repens Bauh. pin. 107.

Thlaspi montanum Cuseum Bauh. hist. 2. p. 998. 920. 1. 329

Habitatio Helvetia, Germanis apud piceis &

Rarai inferna, lignosi, diffusis prolium benti exiti, inveni-
matur ^{quae} feminum fere nudis apylli. Solea crasso

in ^{an} annis una ceteris ma quassa numerosa
basi attenuata semipolluciana, pilis stellatis uti rami
recta. Siliula subrotunda tumida iniana folia

superiore leviora

hispanica fruticulis palmarum ramis minus siliulis
minus tumidi vix vix piceis ~~ovata~~
retata emarginata

siliulis orbiculatis emarginatis

argentem
albom

A. foliis lancea cuneato lanceolatis supra subtus incanis, filiqui
oblongis compressis

Lunana argentea. All. fl. Ped. n. 901. tab. 54. fig. 3

Alisium argenteo folio floris luteis Mont. in Linn. Musc. Mel.
Musc. Taurin. s. p. 73.

Habitat in Italia 2

Caules palmari vel ultra supra ramis superne pilis stellatis
ut folia subtus incanis. Colea unguiculata basi attenuata
nuda supra vix tamen non glabra. Pediculi vel
ramuli florigeri et alii superioribus fastigiato corymbis
filiculis idem compressis tubo non emarginatis.
ut in montano. Petala vix emarginata lutea parva

an absp. argent. Jacq. eadem plant.

orientale A.

elyneatum A. caule erecto herbaeae, filiculis sessilibus ovalibus compres-
so-planis, petalis acuminatis linearibus. Lin. V

Alysson Desfontis Dod. pempt. 89.

Leuonum alyssoides - Elyneatum majus Dod. pempt. De Bank
pin. 201.

Alysson filiqua Lata appera Bank h. 2. p. 934.

Habitat in campo australi, Libano C. (S)

Caules erecti fructi pedales superne ramosi subangulati
pilis densis villosi. Folia sessilia lanceolata integerrima
sequentia erecta patentia sesqui pollicaria utroque petali
internum dente densi nullis densi stellati pabra. Filicula ut folia
uno altero petali stellati dente, unguiculari stylo brevi terminata
filicula infero
subeodem atillone
solitam
brevi pedicellato. Racemi terminales elongati. flores
flav.