

Amazonia

1. exco. A.

Tachyali paniculata. Aubl.

Habitat. Cayenne Herb. Richard

Rami glabri, apice incani, superne angulati. Solia alterna, pennata
cum pari. Soliola breviter petiolata, opposita, lae. In polliciana, cetera
minora, lanceolata, oblonga, avenia, fittus nervosa, incana, supra gla
bra. Petioli acute trigetri, recti. Pedunculi Racemi terminalis compo
siti.

erecta

^{Amasonia}
Amasonia foliis paniculato-ovatis pubescentibus scabris, bracteis sessilibus
bisfloribus longioribus

Amasonia erecta den. L.V. pag. Suppl. pag. 294.

Bontia blattans folio Bamer. fl. Guyan.

Bractea semipollicari, obovata obtusissimo marginato integerrimo
villosa. Paulis superne villosis herb. Guyp.
vix a mea descripta

18212 *Novanthea acubata*

Calyx perianthium pentaphyllum folioli rotundati brevibus subimbricatis ante adpressi
Corolla pentapetala infera, petalis ovatis obtusi patentibus reflexis
Stamina fere nulla antheris in glandulis sessilibus triquetris subulatis bifurcatis parvis, mucro
nata
germen superum ovatum. Stylus fere nullus. Stigma subsessile obtusifiliaculum
Pericarpium
germen subsessile lobatum corae magnitudine pisii supra planitiesculum stylo stigma
mucronatum, capsula biloculari loculis triplicibus
Semina fusca nitida, testis curvata utraque obtusa
Corpusculum digitiforme pollicaris testis obtusum intane basi apertum pedicel
latum e' basi calycis enatum ad basin supra deorsum fere ut in marigrano
Acubati fere non bona flores enim copiosos longos pedunculati corpi
scula nimis lata et brevia ⁱⁿ ~~corbis enata~~
rami testis crassitie penno cygneis sufficentes, glabri cicatrici
in pedunculis depressi
folia brevissime petiolata, alterna obovata, coriaceo, indentatissima qua
in ungue
in pollicaria emarginata glaberrima subtus sufficentia.
marginem parum reflexa
Flores superne in ramis sparsi secundi pedicelli semunquivalares
in medio pedicelli parum infra
bractea minuta decidua, pedicelli corpusculorum in ad basin calycis
longos pollicares.

ex capsula Trinitati

Amasonia punicea, foliis lanceolato ovatis serratis lobis, bracteis petiolatis
flore brevioribus.

Habitat in insula Trinitatis Ryan &

Truncus bi-vel tripedalis. Rami erecti, pedales et ultra, teretes
simplicissimi, in pedunculo desinente, fusci, ad eandem
~~illa~~ villis raris adpressis, leviter canescentes.

Folia petiolata, sparsa, bi-vel tripollicaria, elliptico-lanceolata,
inferiora interdum obovata, basi attenuata, utrinque acuta,
inequaliter serrata: serraturis submucronatis, venosa, ad
tiora glabra, margine subvillosa, juniora subtus villosiuscula,
Folium unum vel alterum ^{superne} in pedunculo, remotissimum,
lanceolatum vel lineare, villosum.

Racemus terminalis, longis sive pedunculatus, bipollicaris
vel ultra. Floris alternis, secundi: pedicelli
inferiores triflori, superiores uniflori. Bractea obovata
vel petiolata, mucronata, serrata, subtus, uti pedicelli
et pedunculus superne, subvillosa, acuminata, supra
punciceo, acuminata, pedicello parum longior
res.

Calyx persistens, pubescens, quinquefidus: laciniis ovatis, acuminatis, acumine
ciliato.

Corolla monopetala: tubus subcompressus: laciniis superior angustior, reliqua
ovata.

Stamina. Filamenta quatuor, declinata, corolla longiora. Anthera oblonga

Pistillum. Germe globosum. Stylus filiformis. Stigma acutum

Pericarpium. Bacca oblonga, piso parum major. Semina quatuor, costis
convexa.

Sub nomine Taligales dedit Dr. Rijk, convenit quoque cum Taligalea
Campestri Aubl. fl. gu. Tab. 252. habitu, foliis, bracteis coloratis, caly-
cibus, ^{figura} corolla, differt modo caule fistuloso, stigmate simplici, et
fructu Tetraspermo, ~~hac~~ ^{habet} omnia potius differentia speciei quam
generis. ^{sub} Fructus certe Bacca est, ^{an} semina interdum forte abor-
tientia.

~~Cum Amazoniam et Taligaleam congeneres esse, suspiciant Caleb. Schreb.
nisi si haec quidem non absque fundamento, ^{ita enim inter} propter convenientiam in
omnibus differunt modo fructu, ^{fructu} ~~et non a se videtur agendum~~
^{conjectura} Amazonum autem non videtur ut conjecturavit Schreb. quod
hinc non nisi fructus imperfectum viderit~~

Amasoniam et Talysiam congeneres esse, suspicatur Celeb. Schrebener
Certe inter se tam affines sunt, ut potius dubitandum non specie differant
quam genere, conveniunt enim in omnibus, ~~non quod fructus modo~~
quoad fructum secundum descriptiones. Absona autem non videtur
sententia Schreberi, quod Linnæus tantum fructum imperfectum vidit.
Ideoque plantam descriptam, potius ad Amasoniam referre volui, quam
novum et incertum genus condere.

Amasoniam et Talysiam

Mimosa glandulosa foliatis, subseptem jugis: pinnulis septemdecimjugis
glandulosa Mimosa foliatis, subseptem jugis: 17 jugis glabris, glandula inter singula paria,

spicis axillaribus solitariis elongatis

Habitat in Papua ad von Rohr &

Rami lanceifoli, ^{taetidisculi} cortice cinereo, validi, glabri.

Folia petiolata, interdum terna vel gemina, tri v. quadripolliciana, bispinnata,
quaque vel ^{et longa} 2 jugis. Foliola opposita, bipolliciana, 17 jugis, interiora breviora, pinnulis

paucioribus: pinnula opposita, ^{imparis} oblonga, acuta, sessilis; femina quicunq;
caesi; acuta, latera externe angustissima glabra

Stipulae duae Petiolari subtus convexi, supra plani: glandula sessilis, cava
inter singulum par foliolorum; secundarii plani, microne terminati. Stipula caecidua.

Spica axillares, solitariae, foliis longioris: Peduncululi angulati, glabri.

Flores copiosi 5 partiti, glabri, gravi: parvi

Calycis campanulati, quinque dentati

Corolla calycis dimidio longior, profunde quinque fidu: laciniis linearibus
in lacunculati.

Hamulae numerose monadelphae

erecta Amazonia Lin. Suppl. p. 194 & S. V. p. 501.

Habitat in Surinamo

Caulis herbaceus, tripedalis, simplicissimus, teres. Folia alterna, petiolata, remota, elliptica lanceolata, subserrata, scabra. Racemus terminalis simplex, pedalis: pedicellis subtrifloris. Bractea ovata, florum paulo longior sessilis. Flores penduli nutantes sessili Lin.

Taligales ~~compensis~~ auct. ^{sub}
amazonia punicea Plant. Amer. mani-

erecta An. foliis lanceolato ovatis subserratis bracteis sessilibus
punicea An. sessilibus serratis corbis bracteis
petiolatis

~~erecta~~