

Ambrosia

Tranſeria

Habitat hab. Desfont.

Caulis herbaceus, striatus, superne villosus. Folia petiolata, alterna, ^{bi}subpinnatifida
laciniis primariis lanceolatis, attenuatis, acutis, terminali inferne pinnatis, ciliatis
integerrima, supra glabra, subtus incano-tomentosa. Spica terminali mascula ^{bi}
3 pollicari. Flores foeminei axillares, sessiles.
An eadem ac Tr. Cavanillae an cum Ambrosia conjugenda

paniculata Cambogia

Foa monophylla Walp.

Habitat in Carolina Richard

Pedunculi terminales; saepe plures. Flores omnes interdum foeminei

bidentata Ambrosia

Habitat in Carolina herb. Mich.
Caulis erectus, ramosus

habes

Crasifolia Embrofia

Habita — Hort. Parif. et herb. Desfont.

Caulis erectus, herbaceus, angulatus, sulcatus, villosus, ramosus. Folia petiolata pollicaria, bipinnatifida: laciniis linearibus, obtusis, carnosis, villosis, glaucis cinereis. Petioli plani, longitudine fere folii. Flores foeminei axillares masculi in racemo terminali.

integ-folia Ambrosia

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, pilosus. Folia semiamplexicaulia, ses-
qui pollicaria, scabra, indivisa, erecta, inferne versus remote serrata, ramo-
rum integerrima, pilosa. Racemi terminales simpliciter.

caum, librum. Coriolum nudum, cretum. Cotyledones ellipticæ convexæ fere planæ. Radix
brevis paucis tuberculata. Richard

tenuifolia Ambrosia

Habitat in monte. vides herb. Musf.

Caulis fruticosus. Rami? Teretes, scabri, purpurascens, superne villosi, incani. Folia
petiolata, sequi polliciana, incana, bipinnatifida: pinna lineares: lacinia inter
gemina. Racemi terminalis. Flores nutantes

alpathii folia Ambrosia.

Habitat herb. Guaj.

Caules Verdes, striati, villosi. Folia petiolata, alterna, lanicolata, pennata
di fida, sesqui pedicellata, villis utraque mi rulis, subtus incana: la
cuna non scabra, lanicolata, obtusa vel acuta, integerrima, terminalis
major subpinnata, suprema lanicolata, integerrima. Spica terminali
ter. Oloro parvi nitentes

trifida a. foliis trilobis serratis Lin Spec: pl. pag. 14017 S.V.

Ambrosia virginiana maxima, platani orientalis folio Moris
hu 1.3. p. 4. f. 6. t. 1. fig. 4.

B. Ambrosia gigantea inodora, foliis oppositis trifidis Ray: suppl.

109.

Habitat in Virginia, Canada O

Paulis ^{ramis} pelopis scaber. Folia petiolata ^{suprema} sessilia ^{opposita}
^{inferiora} ^{et} ^{quodam} ^{modo} ⁵ ^{partita} ^{acuminata} in
trifida ^{et} ^{membra} ^{paucis} ^{scaberrima} ⁱⁿ ^{nervi} ^{basi} ^{attenuata}
petiolum ^{latius} ^{latius} ^{colato} ^{attenuato}, serrato ^{subtus} ^{pallidiora} ^{acumi}
ne ^{et} ^{basi} ^{integerrima}. Pedunculi ^{terminali} ^{erecti} ^{multiflori} ^{flores} ^{ruantes}

Y varietas foliis inversis oblongis triplinerviis, trifidis in rudimentis
ramulorum

Elatior a. foliis bipinnatis fedis, racemis paniculatis terminalibus
glabris Lin. S. V

Ambrosia maritima, foliis artemisiae inodori, elatior Herm.
Legdb. 32. tab. 35.

Ambrosia virginiana elatior et rindior *hortensis* facie monf.
her. 3. p. 4.

Habitat in Virginia, Canada &

Caulis erectus ^{perisperm} striatus. folia petiolata alterna bipinnata
pediculis amato pili brevibus adpressis ut scabra laciniis
laniceolata mucronata. racemi terminalis serpis apicem
alterni prolixi. flori feminei inferius remotiores sespales
in sexibus folioli lancea, masculi parvi pedicellati nutantes

— foliis conspicuis

Diospyros A.

maritima A. foliis multifidis, fructu solitarius pelosi subflesibus. Cn.
Spec. plant. naz. 14014

Ambrosia God. pempt. 35.

Ambrosia maritima Bauh. Pin. 130

Ambrosia

Habitat in Aetnae, Cappadocia maritimis arenosis. O

Caulis erectus ramosus albedo pelosis. Vires folia petiolata attenuata
vellosa subtus et cana mollia. Laciniae obtuse mucronata mic
mi pollicari sespales

— bipinnatifidis vellosi subtus cana siccibus laciniae
inferiorum obtusi.

slatui

tenue folia A foliis bipinnatifidis angustis pinnis incanis racemis
pedunculatis

Habitat in Brasilia Thauri

Cauli purpurascens terius scaberrimus striatis. Folia pediculate alter-
na angustis pinnis supra callis minutis scaberrima subtus incanis
racemis palmatis terminali. Calyx albedo punctatus flores nictan-

tes.

artemisiifolia a foliis bipinnatifidis: primis ramulorum end: vix
integerrimis Lin. Spec: pl. pag 14017

Ambrosia maxima nodosa, marubii aquatici foliis terniter
laciniatis, Virginiana Pl. in alm. 27. Tab 16 fig. 1. Monf. hist. 3.

^{p 4}
Habitat in Virginia, Pennsylvania ©

Caulis vix erectus scaber. folia alterna subpetiolata scabra
subtus venosa, pili adpressi laciniato lanceolata mucrona
to

simplicifolia A. folus canicollati in vasis, flentibus axillaribus sub
foliariis Walt. fl. Car. pag. 231
Habitat in Carolina

non vidi