

# Amellus

1. Lychnitis A. foliis oppositis lanceolatis obtusis utrinque incanis, pedunculis  
unifloris
2. Diffusus A. foliis alternis lanceolatis acutis subtus tomentosis, pedunculis  
unifloris
3. umbellatus A. foliis oppositis <sup>ellipticis</sup> triplicinerviis subtus tomentosis, floribus  
subumbellatis

1 *Cyathocoma* *Amellus* foliis oppositis lanceolatis obtusis <sup>in canis</sup> ~~terminis~~ pedunculis unifloris L.  
Sprengl. pag. 1276 \* P. V. pag. 770. Mart. 476. Berg. Cap. 290 \*

*Chrysanthemum* vel *probus* *Buphthalmum* africanum *Leuciji* foliis; *Asteris* flore caeruleo Breyer. Prodr. 1. p. 23. Icon. p. 27. t. 15. fig. 2.

*Buphthalmum* foliis oppositis lanceolato-linearibus obtusis integerrimis; calycibus subrotundis Hort. Cliff. 416. \*

*Sertifera* *asteroidis* Sprengl. pl. 1. pag. 902.

Habitata C. bonopiei

Caulis teres canescens ramosus. Folia sesquialia inferiora opposita superiora alterna, lanceolata obtusa, basi subtilissime villosa in anthera, integerrima, basi parum angustiora. Pedunculi terminales uniflori foliolis nonnullis adpressi. Calyx foliolis imbricatis in anthera lanceolatis. Paleae longitudine seminum. Pappus villosus simplex.

2. Diffusus Amellus foliis <sup>alternis</sup> lanceolatis <sup>acutis</sup> margine subtus tomentosis, pedunculis unifloris.

Habitat ad fretum magellanicum 5

<sup>3-4 nectatis</sup> <sup>aggre. gottis</sup> Caulis & rubiculus ramis diffusis, teretibus tomentosis. <sup>alternis, sessilis</sup> Folia lanceolato-linearibus, <sup>obtusis</sup> basi attenuata <sup>obtusis</sup> crassiuscula, venis integerrima, supra glaberrima, subtus tomentosa pollicaria. Pedunculi ex apice ramulorum axillariis, solitarii uniflori <sup>apiculi</sup> tomentosi <sup>apiculi</sup> crassiores, foliis duplo longiores. Calyx imbricatus foliolis ovatis acutis, flavis, extimis apice & sursum, intimis apice hirsutis. Corolla radii lanceolata, <sup>apiculi</sup> Calyce duplo longiora. Pappus simplex. Pales longitudine floretulorum <sup>apiculi</sup> apice hirsuto. <sup>apiculi</sup> Pales linearis.

Amellus diffusus foliis alternis oblongis basi attenuatis subtus tomentosis  
8 Oct. in Anon. Gott. 1709. p. 39.

3 umbellatus Amellus foliis oppositis ternis <sup>plu</sup> subtus tomentosis, floribus subumbellatis Am. ai ad.  
S. p. 407. & S. V. pag. 770  
Solidago villosa incana, foliis ovatis oppositis, caule asurgente subnudo tripartito,  
floribus subumbellatis Brown. Jam. 320. t. 33. p. 2.

Habitat in Jamaica &

Caulis in thamesi teres tomentosus ascendens. Folii petiolata, opposita, ovata  
oblonga triplicinervi, albido tomentosa, lanuginem etate <sup>in parte</sup> ~~superiore~~ lanugi-  
nem deponentia, dentatoferrata, acuta basi in petiolum producta.

Peduncululus terminalis, caule 2. triplo longior, apiculatus, lanuginosus

+ intermediae <sup>quadriflorae</sup> <sup>subulatum</sup> <sup>et triflorae</sup> <sup>et biflorae</sup>  
+ intermediae <sup>quadriflorae</sup> <sup>subulatum</sup> <sup>et triflorae</sup> <sup>et biflorae</sup>  
no pedicellis bipolli-  
cantibus  
Flores subumbellati vel oppositi peduncululis ternis floribus. foliolum lanceo-  
latis <sup>extimis</sup> <sup>villo</sup> <sup>subtomentosi</sup>. Calyx imbricatus folioli  
simplex. Paleae longitudine feminum

Carolinensis. Am. foliis oppositis sublanicolatis subserratis, pedunculis  
geminis unifloris axillaribus Walt. fl. Carol. pag 213  
Habitat in Carolina

For id.