

Amethyssea

Genoplant. Schreb. n 45

Cal. subampanulatus. Cor. 5-fida; lacinia infima patentior. Stam.
approximata. Sem. 4. gibba.

1. coerulea A.

50

~~1~~

Amethyssea

Cal. subampanulatus, 5-fidus. Cor. subequalis, 5-fida.
lacinia infima longiore concavo. Sem. 4. gibba.

Coerulea 1. Amethystea Lin. Amoen. ac. 1. p. 386. Ed. 2^a p. 110. Gmel. Sib. 3. p.

248.

Amethystina montana erecta, foliis corymbis digitatis trifidis serratis,
flosculis cum coma a coeruleis parthenis. Amm. nith. 4. Hall. in act. ups.
1742. p. 58. f. 1. Com m. Götting 1751. p. 209. t. 10.

Habitat in Sibiria montensis. O

Caulis sesquipedalis, erectus, tetragonus, glaber, ramosus. Folia
opposita, petiolata, tripartita; laciniis lanceolatis, profunde
serratis, attenuatis, glabris. Pedunculi ex axillis superioribus
et apice caulis, oppositi, trifidi: pedicellus intermedius uniflo-
rus; laterales bi-triflori *

in id eodem M. siapo Tereti, foliis distichis linearibus flor subspitaneo terminali
Thunb. in. n. 10

In orientalis pumila sempervirens, gramineo acuto rigido folio,
flore luteo & condeo mixto inodora Till. p. 89. t. 33.

Morsia spatha uniflora foliis gladiatis, radice fibrosa Mill.
t. 159. t. 239. p. 4.

Morsia in id eodem foliis gladiatis Lin. Mant. 204

Habitat in oriente. 7

Folium radice, disticha caespitosa Glabra siapo
altiora pedalia. Si apus Tereti umbicata scitui
~~folia~~ ~~spumae~~ ~~linearibus~~ ^{albis} vaginis linearibus obtusi
pallidioribus. flores terminali solitarius petala
laciniis 3 cuneiformes 3 linearibus lanceolato angustis
rei