

Ammannia

Debilis Ammannia foliis lanceolatis basi attenuatis, caule ramoso, foliis opposi-  
tulis axillaribus, capsulis bilocularibus. Hort. Kew. 1. p. 163. 7

Habitat in India orientali.

humilis Ammannia

Ammannia ramifera Walt.

Habitat in Carolina herb. Aub.

glabra. Caulis prostratus, ramosi, tetragoni. Folia lanceolata, semi  
pollicaria, subpetiolata, basi acuta. Flores axillares, solitarii, sesplesi



Senegalenſis Ammannia

Habitat in Senegal herb. La Martk

Caulis erectus, ramofus; rami oppoſiti, ſimplices, patentes, uti tota planta glabriſſima.  
Folia lineana, ſeſſilia, pollicana, baſi panem dilatata, ſubuniulata. Pedun-  
culi axillares, breves, triflori

indica Arn. foliis lanceatis: sepius decurrentibus, umbellis axillaribus  
brevissimis, calyce quadridentato La Mart. T. En. pag 311.

Habitat in India

confer Planch. tab. 357. fig. 5. et Burm. ind. tab. 15. fig. 7.

est ammannia floribus axillaribus numerosissimis foliis lanceatis

~~namque~~

Senegallensis Amman - foliis sessilibus basi <sup>sub</sup>acuminatis, floribus pedicellatis  
aggregatis, calycis quadridentato La Mart. P. E. pag 311 tab. 77. fig 3.  
Habitat ad Senegal. ♂  
affinis verticillata

non vid.



*rosea* *Ammannia* <sup>foliolibus</sup> foliis subs-petiolatis linearibus, floribus <sup>solitariis</sup> oppositis, caule repente  
Habitat in agris onyraceis India O

Caules semi-pedales ramos oppositos tetragonos, sensim versus apicem breviores, remoti. Rami <sup>ramulosis</sup> ramulis oppositis, patentissimis determinate remoti, sensim sequi pollicares sensim minores. Folia opposita, semi-unguicularia ad articulos, glaberrima avenia obtusa. ramulorum minora versus apicem confecta sunt quasi <sup>parva</sup> spicae, floribus ex omnibus axillis solenem oppositi, confecta, hinc quasi spicae foliolosa ramulorum. bractea dud subulata, hyalina ad basin cupressis floris, longitudine calycis. Calyx monophyllus, campanulatus laciniis ovatis, inter singulas dens subulatus longior. Stamina ob parvitatem floris numerare non valeo. Capsula globosa. Stylus persistens stigma planum orbiculatum. Semina plura

3 retusa Bumelia foliis oppositis cuneato-oratis retusis rigidis, floribus congestis axilla-

ribus Schw. prodr. p. 49

Aethras. T. Brown. 1840

Habitat in Jamaica L.



*Catipolia* A. foliis semiamplexicaulis, caule tetragono ramis erectis lin  
Mant. 331. N. V. p. 162

Apparinet folio anomala, v. p. fulo femoralis rotundo, femine minutis  
fimo Sloan hist. jam. 1. p. 44. V. 7. fig. 4.

*Ignardia* foliis sessilibus lanceolatis quasi auratis, floribus ternis  
Brown. jam. 148.

Habitatio Caribaeis locis humidis  $\odot$  interdum simplicispan  
Caulis erectus pedalis e lineis decurrentibus tetragoni, uti tota  
planta glabra. Rami inferne oppositi. Folia opposita bypelli  
cani lanceolata attenuata semiamplexicaulis, patentia  
integerrima. Pedunculi axillares brevissimi uni s. triflori  
pedicelli brevissimi capsula globosa femine Piperis nigre dimi  
do minores

mea ex India orientali an eadem cum hanc

Houston D.



ramosior Ammania foliis semiamplexicaulis, caule tetragono, ramis patentissimis  
Mant. 332. \* L.V. pag 162

Ludwigia aquatica erecta, caule rubente, foliis ad genicula binis longis angustis  
hispidi in part, flore tetrapetalo albo Clays. 774.

Ammania foliis subpetiolatis, caule ramoso L. Spec. pl. 175 \*

Habitat in Virginia O

Planta pedalis, acuta angulatus, lateribus planis. Rami inferne, oppositi teretes  
simplices, patentis. Folia lanceolata linearia, basi dilatata inflexionia  
Flores laterales, axillares utrinque 3, subpetiolati. Calyx dentibus 3, patulis.  
Stylus germine longior. Petala 4, purpurea, subrotunda, patentia. Filamenta  
purpurea. L. l. c



debilis A. foliis lanceolatis basi attenuatis, caule ramoso, floribus fasciculatis  
axillaribus, capsulis bitoculatis Hort. Kew. 1. p. 1624

Habitat in India orientali ☉

Calyx angulatus. Petala pallide purpurea. Filamenta fundo calycis  
inserta aequae breviora. Anthera ovata flava Hort. Kew

foliis cuneato lanceolatis

Caulis erectus glaber utriusque planta humi inferae opposit.  
patentissimae. Folia pollicaria sursum minorum ovata  
obtusae basi attenuata suprema et ramosa linear. lanceola  
ba

Languinolenta A. foliis semivariis plecticaulebus, basi cordatis, floribus sub  
pedunculatis, octandris petaligenis Sw. prodr. p. 33.  
Habitat in Jamaica, Domingo



*Octandra* a floribus petaloidis octandris Lin. Suppl. p. 46. 127. f. V. p. 162  
emanans coccinea Rottb. progr. 1773. no 4  
habitat in India orientali

Caule palmari vel ultra erecto, uti tota planta glaber, tetragonis, basi sa-  
mosi, rami oppositi. Folia amplexicaulia opposita, pollicaria et ultra  
lanceolata inferne angustata basi dilatata subcordata, integerrima acuta  
tota avenia. Pedunculi axillares solitarii oppositi, ternis 3- fere uni  
flori. Petala sanguinea



baicifera A. foliis subpetiolatis, capsulis calyce majoribus coloratis Burm. ind. t. 14  
fig. 3. Lin. Spei. pl. p. 1754

*Cornelia verticillata* Ad. spec. 2. p. 9. tab. 1

anonymo; Lincano folio, Orientalis, g. Collii lutei flore, herba capsularis ver  
ticillata Plukn. alm 33. t. 136. fig. 2. at non ramosa.

Habitat in China ☉

Tota glabra. Caulis erectus. Tetragonus angulis acuti ramosus. rami oppositi  
simplicis sive pectentis. Folia opposita sive unguiculata linearia  
utroque acuta. flores axillares breviter pedunculato, passim vertice  
lato parvo.

~~Folia in distalia lanceolata~~

pennatifida a caulebus proclumbentibus radicantibus compressis, foliis lineari-  
pennatifidis Lin. Suppl. p. 127. + P. V. pag. 162

Habitat in Java

reliquis facie simili. Folia sparsa, magis approximata linearia, pennatifi-  
da pinnis minimis quasi filiformibus. Flores axillares solitarii  
vel plures. Corolla uncinata. Capsula tetragona Lin

non vidi



visuabona Ammia foliis cordatis lanceolatis semiamplexicaulis, floribus  
sessilibus verticillatis caule frutescente  
Habitat in India Orientali Dr. Kötter 3

Caulis rami (an caulis erect. frutescens) obscure tetragoni ped. alis  
glabri acuti tota planta ramuli axillari oppositi. Folia amplexica  
caudica avenae polliciana vel parum ultra avenia enervia sub  
tus pallidiora, lacinia basi cordata, integerrima. Flores in ramuli  
sespiter parvi verticillati. Capsula globosa calycis dentibus 4  
petala non vidi.



grandiflorum *Cynanchum* caule volubili foliis cordatis, ovatis  
cuneatis, inferne glaucis, corollis coriaceis Cav. 9. t. 1.  
Plag. 14. tab. 21. 4  
Habitat in America calidior 4

ferrulata Ammannia? foliis oblongis ferrulatis caule fruticifloso

Habitat in Arabia orientali 3

Rami teretes ramulose pilosi. Folcia subpetiolato opposita periclinum  
querculata oblonga utraque acuta ferrulata, subtus ope latis  
punctis elevatis striata. Flores verticillati pedicelli axillares, unispa  
ri verticillati Capsula 4 valvis minuta globosa  
an huius generis flores non vidi habitu quam maxime ad myrs. africa  
na accedit



*Spiciata* Am. foliis <sup>ovalibus</sup> oblongis, pinnis <sup>subterminalibus</sup> ~~axillaribus~~ subfoliis

Habitat in China ad Mentha O

Caulis digitalis vel parum ultra, simplicis pinnis uti. <sup>ovata</sup> tota plan.  
to glabra. Folia bipinnata remota, semper unguiculata <sup>oblonga</sup>  
tertia. <sup>basi</sup> ~~apice~~ <sup>apice</sup> pinnis axillis supremis et apice  
unguiculata. Flores parvi oppositi solitarii. folum ovatum  
ad basin singuli calycis corae parum longior

Loratum



peploides Amm. foliis <sup>obovatis</sup> oblongis, pinnis axillaribus foliosis.

Habitat in agris onyrcis Andis orientali Peruvij

Caulis inferne ~~in~~ geniculis radicantibus, <sup>perithamou;</sup> tetragonis; angulis acutis, uti tota planta glaber ~~ramosus~~ <sup>simplicissimus</sup> inferne ramosus rami oppositi palmares sensim minores. Folia sessilia obovata

folia et bractea  
colore rubicundo.

linguiculata <sup>venata</sup> ~~superficia~~ <sup>linea</sup> opposita integerrima subtus  
nervosa <sup>venata</sup> supra arena. Spica ex omnibus axillis sesqui  
pollicares, simplicis sensim minores. Folia floralia tercia  
obtusiuscula <sup>nudiuscula</sup> inferiora semiunguiculata flore triplo lon  
giori flore in alio foliorum floralium sessile solitarii oppositi  
conferti parvi. Calyx laciniis 4. ovatis acutis. bractea duo minuta  
setacea ad basin calycis capsula oblonga stylis calycis longior  
stigma capitatum. corolla nulla ut videtur

roseo *Ammania* foliis linearibus spicis axillaribus foliis

Habitat in aquis oxyraicis inde orientalis Hongy ①

Convenit habiti, modo capiendi omnia cum *Am-pepforde*

Differt folus linearibus subtus pallidioribus ~~et~~ cæcis  
cord. capsulis globosis calycis laciniis calycinis lanceolatis alte  
austis petalis oblongis calyci insertis  
bracteo uno subaequo calyci longiori