

Amomum

grana Paradisi Amomum scapo ramo brevissimo Lin. S.V. p. 50

Malague Garcia Clus. rar. port.

Grana paradisi officinarum Bauh. Pin 413.

Clettari Rheed. ~~Herb~~ Mal. 11. t. 6.

Habitat in Madagascari, Guinea &

Planta adhuc obscura.

Zingiber Amonum scapo nudo spica ovata Lin. L. V. p. 50. Jacq. hort Vind. t. 75

Zingiber Bauh. Pin. 35. Brown. jam. 119

Zingiber Rheid. Mal. 11. p. 21. t. 12.

Zingiber majus Rumph. amb. 5. p. 156. t. 66. fig. 1.

Habitat in Andia inter trojulos 4

Zingiber Am. scapo nudo spica ovata, squamis ovatis, foliis lanceola-
tis ad apicem ciliatis Willden. sp. 6.

amonum zingiber scapo medio vi, spica ovata foliis linea-
ri lanceolatis Sw. ob. pag 2.

habes certe fide herb. Vahl specimen herb. imperfectum et dubium

Zenumbet *Amomum siapo* *nudo* *spica* *oblonga* *obtusa* Lin. S. V. p. 50. Murv. in Com.
göth. 1775 p. 26. t. 2. Gaiqu. Hort. Vind. vol. 3. t. 54. Mill. Gard. 17. t. 28.

Brown Jan. 113.

Viator - *inphi* - *Vua* *Pheed* - *Mal.* 11. p. 27. t. 13.

Zingiber latifolium *sylvestre* *Herm.* *Lugd.* 636. t. 637.

Lampyrum *Rumph.* *Amb.* 5. p. 14. t. 64. fig. 1.

Habitat in India 4

Zenumbet *siapo* *nudo*, *spica* *oblonga* *obtusa*, *spicis* *subrotundis*,
foliis *ovatis* *marginibus* *glabris* *Weden.* *Spici* *pl.* p. 6

Amonium racemosum Scapo spathis oblongis tubo, racemi compressato oblongo
fl. Penn. 1. p. 2. tab. 1. fig. 6

Habitat in Pennsylv.

Radix ramosa, fibrosa, tuberculata. Culmi plures, simplicis, teretes, geniculati, erecti, villosi. Folia petiolata, oblonga, glabra, lineata, nervosa, erecto-patentia, 1-3 pedalia, latitudine bipalmari. Petioli convoluti. Scapi plures, teretes, striati, erecti, pedales: vagina oblonga, oblonga acuta, convoluta, nervosa, striati. Pedunculi pauci bif. 4 flori. Spatha ovata, concava, marcescens. Spatha tubulosa ad basin pedicello rufum, profunde bifida, marcescens: laciniis ovatis. Calyx ruber. Corolla et Nectarium rubrum luteum. Capsula nigra, leviter striata. Semina grisea fl. Penn.

accedit ad
silvestre

Charact. gen. addit. sequentia

Nectarium faucibus corollae insertum, bilabiatum: labium inferius longitudine corollae, trifidum; laciniis subrotundis. Labium superius corollae brevius, antherarum gerens, integrum angustum. Anthera bipartita. Stylus anthera semineactis. Capsula calyce coronata, angulis inferius demum. Semina 3 gona, pulpa filamentosa involuta.

Annona thyrsoidea scapo spathis oblongo ovatis vestito fructu conico thyr-
soidea fl. Peruv. 1. pag. 2 - Tab. 2.

Habitat in Peruvia siccis &

Radix tuberosa fasciculata. ^{caulis} Caudex plures, teretes, erecti, striati, geniculati;
aequantulum declinati, vulneris. Folia alterna, oblonga, acuminata
acumine sulphureo, glabra, lineata, nervosa, pedalia, inferiora seorsum mino-
ra. Petioli convoluti. Scapi plures, teretes, erecti, striati, semipedales
spathis ^{ovatis} convolutis, oblongo ovatis, striatis rubris vestiti. Spatha, ovata
conica, purpurea, inter flores. Calyx incarnatus, ad basin spathe tu-
bilosa, bifida rubra; laciniis ovatis. Corolla lutea. Nectarium luteum
laciniis subrotundo, intermedia bifida, ad basin utraque dentriculo adnata.
Capsula oblonga, magna, rubra, demum purpureo nigra. Semina grisea,
sine fl. Peruv.

latifolium Amora. foliis ovatis acuminatis, scapo simplici, spica oblonga La Mark
T. Enc. pag. 5.

Habitat in Ind. orientali 2

2 Hua Hort. Malab. II. p. 13. fig. 7.

Zedoana longa Bauh. pin. 35

anonymum zedoana scapo nudo spica laxa truncata Berg
mat. medica.

Zedoana A. scapo nudo, spica laxa cylindrica truncata, foliis
ovatis acuminatis. Wild. spec. plant. II 7.

Curium A. siapo spathis latis est centro foliorum Taique hort. 3. 7. 4.
Len. I. V. p. 50

Habitat.

man yella Hua Rheed. Mal. 2. p. 21. 7. 11.

Curium longa foliis lanceolatis nervi lateralibus
numerosis Sw. obj. pag. 8. Lin.

Folia elliptica radicalia 6-8 pollicaria.

Scapi foliis breviores nudi squamae spicae lanceo-
late

silvestre A. Scapo nudo, spica elongata bracteis oblongis ventricosis, foliis
lanceolatis Sw. prodr. p. 11.

Sloan. hist. 1. p. 165. t. 105. fig. 2.

Amomum 2 Brown. Jam. 113.

Habitat in Jamaica. 4

Caulis 4-8 pedalis simplex teri foliosus, glaber. Folia bipedo-
lia. Petioli vaginantis. Scapi radicales culmo dimi-
dio breviores vestiti vaginis alternis antea lanceolatis
ovatis, retusis striatis glabris, ad basim vaginantium subor-
tuculatis. Spica pedalis bractea imbricata oblonga
ventricosa. flores bractei vix longiores flavi
aridi.

Flores interdum caulem foliosum terminant Richard.

an alpina racemosa Rottl. hanc perkinet

Zeylanica Chimaphila Pedunculata paniculata multiflora L.V. p. 57. 2. 86. Zeyl. 14.

Sp. p. 11. 2.

Arbustula zeylanica, rotini foliis subtus lanugine villosis, floribus albis
cuculle modo laciniatis Clus. alm. 44. t. 241. f. 4.

Habitat in Zeylona h.

meza A. Scapo brevissimis, capsula ovata, foliis ensiformibus acutis

Thunb. Fl. jap. p.

V. p. 51.

Et Hooker vulgo meza Komph. am. exot. p. 226

Habitat in Japonia

affinis am. cardamomo differt scapo magis fasciculato brevioris nec oblongo imbricato. Solus capitulum minus. Foliis brevioribus spithameis in illo saxe quadrupedali Thunb.

non vidi

pedunculata Appalachus foliis fasciculatis subulatis glabris,
pedunculis filiformibus foliis duplo longioribus L'Herit. / Aug
p. 21. t. 26.
Habitat ad prom. 6/pe 5

madagascariense Amom. caulis flexilibus altissimis, scapo brevissima pauciflora
terminato, capsula acuta La Mart. T. Enci: pag. 5
Zingiber Melegnetta Godr. De Sem. 34. Tab. 12. fig. 1.

Habitat in Madagascaria

Amomum angustifolium Sonner. It. ed. germ. 2. p. 1094
Tab. 137.

angustifolium Am. scapo nudo brevissimo, spica capitata, foliis
linearibus lanciolatis Wed. Prosp. pag. 8

glabra
Caulis 8 vel 10 pedalis. Folia pedalis utraque attenuata
medio pollicem et paucum ultra lata. Scapus brevis, imus
sectus squamis lanciolatis. Squama lata oblonga
Spica globosa capsula ovata

Cardamomum A. specia radicali sespli obovato foliis obovato
ellipticis cuspidatis Wed. spec. pl. prag 81.

Cardamomum minus Pumph. amb. 5 p. 192. Tab
65 fig. 1.

Amomum lin. Mat. med. p. 33.

Habitat in India umbrosissimis, coenosis monti-
um radicibus 4

gesta de fruct. pag 78

non vidi

chunensis Hillebrandii diphyllis, foliis ciliatis

~~Enipium~~ Amomum scapo brevi retinato simpliciter, ~~foliis lanceolatis~~
umbriata, foliis lanceolatis
globba Enipia Rumph. amb. 6. pag. 130. Tab. 61.

Amomum an globba Enipia? Konig Retz. off. Jap. pag
51.
Amomum villosum scapo brevi retinato, bracteis linearibus
fructu villoso. Lour. fl. Cochinch. pag 4.
Habita in India Orientali Cochinchina

Radix repens. Culmus perennis simplicissimus debilis erectus
terre 6 pedali. Folia lanceolata, nervis, glabra petiolata
Scapus 4 pollicum. Verrucis retinatus. Spica subrotunda, bracteis
linearibus imbricatis. Corolla infundibuli formis tripartita.
Nectarium petali forme. Pericarpium inferum globosum
semipollicare usum 3 locis: exalve ceteris deorsu adpresserit
vires crispis.

~~villosum~~ villosum A: scapo vaginato brevissimo, spica subrotunda, bracteis
lanceolatis flore compositis. Willden. spec. plant
pag. 4 non vidi

echinatum. Cl. species radicali scapula ^{sub} globosa, capsulis sulca-
tis echinatis globosis Wied. spec. pl. pag. 28.
globosa eripha v. indici Rumph. a. n. b. 6. p. 137.

Tab 61. fig. 1.

Amomum 2. Pretz. obs. 3. p. 50

Habitat in sylvis b. p. a. v. indico

~~Cardamomum~~
~~Cardamomum~~ a scapo simplicissimo brevissimo, bracteis alternis laxis.
Lex. f. Cor. 2. p. 4. Sonnerat. t. 2. p. 240. t. 136.
restituatur Elettari & Rheid. Mat. 11. p. 975. 6.

Habitat in ~~Indisum brevissimum, scapi maximum induribus~~

repens a. scapo ramoso decumbente, foliis lanceolatis w.
Spec: pag. 9.

Habitat in montibus Gata Malabario &
Solia pedalia pollicis brevitate. Scapi proterum
bentes spica alternis distantes squama lanceolata
Spica longiores

Amomum vocantur scapo longi ramosis, racemis
terminalibus alternis Lam. Tabl. En. 5. tab.
2. fig. 2

Eng. menis gestner de fruct pag 35

herpitarum. Anomum spica caulina simpliciter reclinata: fructu subrotundo, herpa-
to lous. fl. Coch. pag. 5

Habitat in sylvis Cochinchinae

Radix horizontalis ramosa, repens. Culmus perennis simpliciter spinosus
erectus, herpitarum, 6 pedalis. Folia lanceolata magna. Petioli am-
plexicaules. Spica lineari simpliciter pedunculata biflora. Ananth.
inferius 4 pedum laciniis obtusis ^{sub}aequalibus. Cord. superius infundibuliforme
tripartita, laciniis obtusis ^{sub}aequalibus. Nectarium petaloforme latissimum
obtusum inferius 4 pedum laciniis basi lateralibus brevioribus.
Fructus 3 gonius. herpitarum exaequali polispermus

Siapa caule folioso herpitarum; spica lineari
reclinata

non vid.

non vid.

petiolatum Amomum. Folia subpetiolatis utrinque glabris, spica conica ante
umbriata La Mark. 1. Enc. pag. 5.
Habitat in Mexicana
Caulis foliosus

Globosum Amon. semina caudata ramosa, fructu globoso teri Lour.
fl. cochinch. pag. 5.

Habitat in China et Cochinchina.

Radix tuberculosa brevis. Caulis perennans simplicissimus teres erectus
quadripedalis. Folia lanceolata magna glabra crenata petiolata
amplexicaulis. Gynaeceum pedicellatum triflorum. Salyx tubulosa 3-4
dentatis. Corolla papera alba ~~fl.~~ rubra infundibuliformis
tripartita: lobis oblongis ovatis subaequalibus. Nectarium
longitudine simpliciter undulatum, apice rotundatum emarginatum
cum ~~polyphyllum~~ petali forma corolla insertum. Stylus con-
cavus ciliatus. Anthera stylum amplectens: Pericarpium
evolve

pyramidale A. foliis lanceolatis utrinque glabris racemo terminali pyramida
li composito La Mart. P. Enc. pag. 5.

Habitat in Martinica 4

Dissepimenta maturitate evanescent. Caulis foliosus

Guenezi
Littorale

A. si apud bambus, spathis cordatis, foliis apice elonga-
tis tortuosis König. Retz off. 3. p. 5. t. 6.

Habitat in India orientali.

non vidi

littorale a. *Sapiis brevissimis squamosis, spatulis ovatis, cauli
buxiplumis, foliis apice nudentibus* Dietz. obj. ~~4~~ p 52
Habitat in India orientali.

non vidi

~~citata~~ Arexana

Stapoli fl. carn.

montanum Scapo erecto longioribus spica ovata acuta
foliis petiolo ter ovatis acutis Retz off. 3. pag. 51
Habita in India orientali

Specimen herb. Dubnii

medium Amom. *Spica caulina ramosa, fructu oblongo striato ovali.*

Herb. fl. Coch. pag. 4.

Habitat in China

Caulis perennis, luteus, simplex & pedalis, crassus, teres. Folia magna, oblonga, subacuta, glabra, petioli amplexicaulibus. Spica longa terminalis, ramosa. Pericarpium ovale polypermu

Ulexynofum A. Scopis erecto curvatis, pappis ovatis, floribus
lingulis bracteatis, foliis sessilibus Retz. obj. 3. p. 56
Habitat in Japonia Orientali.

non vidi

cypriaticum

Alyghas *Amomum racemos paniculato, racemulis secundis*

Cardamomum zeylanicum sylvestre aquaticum Burm. fl. Thes.

Zeyl. 54.

Alyghas *Lin. Fl. Zeyl. n. 440*

Habitat in India Orientali König

Chiripes glauca