

Amysalis

incana Amygdalus; foliis lanceolatis serratis rugosis subspilebuis, subtus albo tomentosis
Pall. fl. ross. 1. pars. Tab. 7.

Tab. in campo apud ad pedem promontorium Caucasii;

Arbustula virgata, cortice cinereo. Folia sparsa, argute serrata, stipulae peltatae
aliquoties dentatae. Flores ut in Amygd. nana modo minores, solitarii
vel gemini, sessiles vel axillares; Calyx tubulosus subangulatus laciniis
acutis subvillosis. Petala subrotunda pallide rosea. Stamina 12. Stylus geminus
que villosus.

non vid.

angulatus Amygdalus

Habitat in Syria herb. Desfont &

facies Spartii vel Ephedra. Rami rari glabri, angulati, e caespitibus
erecti, pedales et ultra in spinam definentes. Folia breviter petiolata, remota, sem-
per pollicana vel ultra, lanceolata, glabra, obsolete venosa. Stipites subsessili
glabri, ovatus, magnitudine coryli

Prenus

persica A. foliorum serraturis omnibus acutis, floribus sceplebris soli
tariis Lin. Sp. pl. pag. 676 +

Persica rubra Cam. epit. 145

Persica molli carne et vulgari Bauh. pin. 440

B. Nucipersica, quo nucum juglandum faciem representant Bauh. pin.
440.

Habitat

folia longa, acuminata, e gemma terminali, nec infra flores. Flores
gemmales. Corolla dilute rubescens

pimenta A.

communis A. foliis serratis infimis glandulosis, floribus sessilibus
geminis Lin. Spec. pl. pag. 6774

Amygdalus sylvestris Bauh. pin. 442.

β. amygdalus L. ad. pempt. 798.

Amygdalus sativa Bauh. pin. 441.

γ. Amygdalus amara Tournef. J. R. H. 627.

Habitat in Mauntano sepibus

Rami circuncati, glabri. Folia e gemma terminali petio
lata lanceolata elliptica utraque glabra bi s. triplici
cane serrata serratis infimis venisque venosa. Flores bre
ter pedunculati

Cochinchinensis Longycaeus foliis ovatis integerrimis, racemis parvis terminalibus
Lour. fl. Cochinch. pag. 316.

Habitat in sylvis Cochinchinensibus

Arbor magna. Folia acuminata, undulata, nitida, alterna. Flores
albi. racemi parvi. Calyx infero campanulatus: laciniis ovatis
reflexis. Petala subrotunda. Stigma planiusculum si abrum. Drupa
semipollucis, ovato-ventricosa apice acuta, fusca.

non vid.

Dulcis A. foliis petiolatis crenatis, floribus geminis: corollae calycis vix majori
ribus
Habitat

mibi ignota an varietas Am. communis

prunella A. foliis venosis rugosis Lin. mant. 74 & 514. S. V. pag

462.

Amygdalus Persica africana nana, flore ⁱⁿ carnea pleno Tournef. l.
R. 4. 625.

Amygdalus persica nana flore carnea pleno Ruhn. 11. 7. 4

Habitat in Africa

Rami cortice cinereo juniori fusci gemmo foliifero laterali
et terminali. Folia petiolata lanceolataq; utrinque glabra
tenuisime serrata pollicaria ~~at~~ basi in petiolum non atten-
nuata. Petiolus filiformis. gemmo florifero laterales
superano internodi tomentoso. Petala latiora quam in nana

Herm. Lugd. 407 & 489

nana A. foliis basi attenuatis Len. Mart. 396. P.V.

Amygdalus indica nana Planch. alm. 20. V. 11. fig. 3. Mill. Dict.
t. 20. fig. 2.

Armenaca persica foliis; fructu exsiccato Amm. rith. 273. V. 30

Habitat in Asia septentrionali;

Rami alterni riyati, cortice cinereo purpurascente. Folia
et gemmae lateralibus et terminalibus plura, lanceolata utraque
glabra, petiolata pollicari tenuissime serrata. Flores et
gemmae laterales interdum unicus ad singulum latus gemmae
foliiferae sessile Petala lanceolata cuneata obtusa. Calyx et
gemmae glabri.

orientalis a foliis lanceolatis inter emmissis argenteis perennantibus;
petiolo breviori Mell. Diet.

Amygdalus orientalis, foliis argenteis splendens Du Hamel. arb.
40.

Habitat in Oriente &

Rami frequentis prope patentissimi nigri feretes juvencos
inicas tomentoso-iniani. Folia breviter petiolata, utrin-
que tomento candidantia integerrima alia rana subire
nata, mucronata, late glabrora. St. unguis ulani
stipula subulato flos pallide femineo glabro. flores
non vidi

foliis oblongis subintegerrimis utraque tomentosi

unicana A. foliis lanceolatis serratis pubescentibus nervis subtus albo tomentosis
Pall. flor. ross. tab. 7.
Habitat r

non usidi