

# Amyris

1. elemifera A. foliis ternatis quinatis pennatisque subtus tomentosis
2. sylvestris A. foliis ternatis crenatis acutis
3. maritima A. foliis ternatis crenulatis obtusis
4. hexandra A. foliis alternis pennatis integerrimis, floribus hexandris
5. gileadensis A. foliis ternatis pennatis quinatisque lanceiformibus integerrimis, pedunculis unifloris
6. torrifera A. foliis pennatis foliolis petiolatis planis
7. nataf
8. prostrata, foliis pennatis: foliolis petiolatis undulatis
9. ~~nataf A. foliis ternatis pennatisque: foliolis lanceolatis crenulatis~~  
~~integerrimis, axillaribus~~
10. balsamifera A. foliis ternatis quinatisque pennatis ovatis integerrimis, racemis terminalibus compositis

- ovata Amygd foliis pinnatis ovato-lanceolatis, paniculis axillaribus

Habitat in Guinea Thonning 3

Frutex ergalis vel ultra, ramosissima, cortice cinereo fusco. Folia  
Rami pubercentes, teretibus culi. Costa pinnata cum impari, 5-6  
jugis: foliola subalterna, brevisime petiolata, vix crenulata, venosa,  
pellucido punctata, odorata. Petiolis pubercentibus. Panicula axillaris  
pedunculi multiflori, sub corymbosi. Bractes minutae. Baie ovatae, glaberrima,  
nigra magnitudine oposuland. Semen unicum magnum. Thonning  
Totus frutex odore anisii. Thonning 4

amigophylla Ameyris foliis pennatis foliolis ovatis ~~bullois~~ pubescentibus crenatis  
ba

Chenopodium  
Chenopodium erianthoides  
Ealyx heterophyllum. Corolla heterostala. Pericarpium papirum-fibrum  
culatum 2. fructuare 2/3. semina 2/3. (Solanaceae)

2 rubescens *Platanus glabra* pedunculis pedunculisque villosis, racemis bracteatis

Habitat in India occidentali

Stipulae exacte praecedentis et foliorum, rami vero fere impunetati  
Flores minores, bracteaque lanicolata ad basin pedicellonum.

ambrosiaca Amygd foliis pternatis pennatisque, foliolis subovatis oblongis  
acuminatis integerrimis glabri racemuli axillares brevissimus

*Tecoa heptaphylla* Aubl.

Habitat in India occidentali & Boho.

Rami angulati glabri cortice fusco folia alterna  
terna <sup>cum pari</sup> vel trijuga cum impari pennata petioli  
nervi perfoliati striati glabri. pariter semina quinque  
Racemuli foliola bi- & tripollucaria venosa. racemuli axilla  
res 2-3.

religiosa vide in auro

amyni gileadenfis. Balesan Brui: d. pag. 16 folis quunatis ternatisque

Sassa pag. 20. sid. esp. memora pulcherrima

Pract. p. 44. Sicca maxima pag. mala

Kantuffa - pag. 49 Memora

Wanze cordia p. 87

Walhuffa Ben arsonia Hammbus 5 Penlibus 76

Wozynos Brucia anti dyf. p. 69

Kusjo Bankpai pag. 73

Larch 12 p. 57. Bauhinia

ad Gatroph. gossypifol. adde tri f

~~Confiteria non pulch. h. d. anal. 10. 8. 5. 0  
Ricinus Bregma naga cant. Alcedo Mar. 10. 7. 26 pag. 157  
Hyg. 3/40.~~

p. 7. 273 pag. 83

Solutio folis magnis an Pract. Thana. Alcedo

19

Pyrenus periporus Brucia. d. vol. 5. p. 1. Tab.

Corrigenda

- pag 60 Aastr. glob. erectis scapis Ceye Scapus erectis  
bin obfer: ib. -- differ scapo nudo Ceye scapo nudo differ ib florif: Ceye  
53. Ononis vaginalis stipulis -- dele Knato in altero loco in florentia  
72. Gustacia fastuosa in Syn: lin adda post Gust: fastuosa  
73 - linea 7. hoc Ceye huc  
74. Gust. bivalvis in Syn n. lin. post Gust. adde bivalvis  
p. 82. linea ultima dele ramis -- indicantibus dele non  
77. Ochra lin. ult. obf. patuit pat Ceye patuit  
82. Prot. micro 7. belone Ceye beloneana  
ib. Obf. serrata in differentia adde (serr) ternatis  
54. Adyanum violaceum multetur nomen triviale  
67. linea 1. Coni videatur quod pterit  
69. Parth: dentatus linea ultima Earth. Ceye P. Pap: Ceye pap  
70. Tanacetum. Monast. lin: Ceye foliol: Ceye foliorum  
May. 3. linea ultima intenus polypp. Ceye neat aphyllum

balsamifera Amyris foliis bipugis ternatisq; ovatis attenuatis integerrimis glabris

Amyris balsamifera: foliis bipugis <sup>3</sup>lin S. V. pag 361.

Habitat in Montserrat In Ryan 7

Rami teretes glabri, cortice fusco - cinerascete, punctati, vasisque quoniam per

Folia petiolata, opposita, plerumque pennata cum pari bipuga, (versus apices <sup>apices</sup> ramorum ternata. Foliola opposita, petiolata, pollicaria, vel parum ultra, ovata, attenuata, apice acuta vel obtusiuscula, integerrima, utrinque glabra, venosa, punctato-perforata, nitida.

Petoli tereti a sculi terni

Pedunculi terminalis, bipollicares, interdum ex axillis ultimis;

pariales racemosi, oppositi, unguiculares, biflori: flores pedicellati.

fructus subobovatus, magnitudine Pijenis nigri



polygama Amyris foliis simplicibus, pinnis lanceolatis ovatis in  
gemmis. Caran. Hi: vol. 3 pag. 20 Tab. 239

Habitat Chili

Schinus repens. Cist. dec. pag. 102.

ancisa. Amgri folus ternati inaequaliter incisè serratis

Habitat in Senegal herb. Tourt.

Rami cortice griseo-fusco, spinescentes, remotè tuberculati, glabri. juniores villosuli.

Folia plura ex eadem gemma, petiolata. Scoliola pollicaria, oblonga, utrinque acuta, obtuse serrata, supra glabra, subtus villosula. Petioli pollicares canescentes.

Habitus, cortex ramorum, modus crepenti copobol samis. Resina hujus arboris 2 libras  
sciam adportavit Adansonius



1. *elemyfera* Amygd. foliis ternatis quinatis pennatis que subtus tomento fo. v.  
n. 361.

*Cornus* racemosa trifolia et quinquefolia, foliis foraminulatis

Plum. Spec. 19. t. 100

Guiana Mangr. Brof. 90.

*Frutex* trifolius repens floribus tetrapetalis albis racemosis Cal.

Carl. r. p. 33. t. 33. fig. 3.

Habitat in Carolina



*Syzygium* *Almyris* foliis ternatis cernatis acutis Lin. l. V. pag 361. Jacq. Amer.

107.

Habitat Carthagens in sylvis,  
arbor quindecim pedalis. Scoliola nitida bipollicana, ovata vel lanceo-  
lata sive cordato ovata vel rhombus. Racemi compositi, erecti  
terminales et axillares. Drupa magnitudine pipi.

3 mantima Amyris <sup>(w. 1007. pag. 140)</sup> foliis ternatis crenulatis obtusis Lin. S. V. p. 361. Gaeyh.  
Amyris <sup>fruticosa minor</sup>, foliis orbiculatis venosis pennatis ternatis,  
racemis terminalibus Brown. Jam. 209.

Habitata America

arborescens caule ramoso scabro. folia petiolata: foliola subrotunda  
elliptica cum acumine brevi interdum obtusa nervosa, utrinque  
glabra, pinnatis pellucida perforata, racemi compositi, cymosi  
ramulis oppositis multifloris. Flores conferti cymam mentientis  
baicæ drupacea magnitudine pepeni nigri Sw.

\_\_\_\_\_ pennatis quinatisque

an varietas Sylvaticæ

non

gileaden sis Amyris foliis ternatis, integerrimis, pedunculis unifloris terminalibus  
(Catechibus Lin) Lexi mant. 65. s. V. pag. 361. Amon. Ai. 7. pag. 68

Amyris opobalsamum, foliis ternatis, integris, pedunculis unifloris Boiss.  
- Desf. r. pag. 79. ubi Desf. r.

(Tab. XI) sicut ramum foliis et floribus instructum magnitudine naturali  
sua flores lente acciti



*Amyris*

2-4 Kataf Amyris foliis ternatis apice serratis, peduncululis confertis bifidis  
Amyris kataf; foliis ternatis, apice serratis; peduncululis dichotomis Borh.

Desf. pag. 80.

~~Differt ab Am:~~ *sylvatica et maritima*, foliis *minime nitidis, apice tantum serratis* panicula terminali brachiata. *Pelegia Borh. habet l. c.*  
Differt ab Am: *Kataf crenatis*

Prothium Amyris foliis pennatis; folioli petiolatis undulatis Mart. 657  
L. V. p. 367.

Tingulony Kumph. amb. 7. p. 54. t. 23. fig. 1.

Prothium javanicum Burm. Gard. P. P.

Habitatio India orientalis

Folia opposita: folioli 5-7. glabris, petiolatis laevibus. Stomum panicu-  
la multiplex. Calyx subquadridentatus, obtusus, persistens. Petala  
4. sessilia ovata, acuminata. Nectarium e Receptaculo marginato,  
cingente germen intra stamina. Anthera oblonga quasi ex 4 connata  
to. Filamenta subulata, petalis breviora. Germen ovatum.  
Stylus cylindricus, longitudine staminum. Stigma simplex l. l. i.

5- gileadensis Amyris foliis ternatis cuneiformibus integerrimis, pedunculis unifloris  
- Amyris gileadensis foliis ternatis integerrimis, pedunculis unifloris lateralibus  
Cin. Mant. 654 S.V. p. 361.  
Amyris opobalsamum foliis pennatis: foliolis p. plebeis Lin. l. V. pag 361  
Balsamum, balastan ab aegyptiis vocato Alpen. Aegypt. pag. 40. fig. pag 60  
Habetur in Arabia felix:

Rami teretes cinerascetes, <sup>obtusif.</sup> acuti, remote tuberculati. Folia petiolata  
parva plura ex eodem tuberculo, glabra. foliola lateralibus minoribus  
Pinnis 3. 4. et tuberculis lateralibus et apice ramulorum. Fructus  
magnitudine pisi, mucronatus pedunculo triflori  
Feyum Alpeni habet folia 3 nata braya et traya cum unguen.

foliis ternatis pennatisque  
pinnatisque ~~quasi~~ ~~pennatisque~~ glabris integerrimis cin  
natis pedunculis unifloris

Alp.

6 Toxicifera Amyris foliis pennatis: foliolis petiolatis planis L.V. p. 361

Toxicodendron foliis alatis, fructu purpureo pyriformi Spach Car.  
car. 1. p. 40. t. 40

Elemifera foliis pennatis Hort. Cliff. 406.

Habitat in Carolina 5

Rataf Am: folius Ternati apice serrati pedunculo conferti bifidi

Amigns Rataf. folius Ternati apice serrati; pedunculis dichotomis  
Lapp. de pr. pag 00

Habitat in ambr. <sup>circum</sup> ~~triacati~~ <sup>triacati</sup> opposit

Rami teretes. Folia petiolata ~~in apice ramulorum~~ <sup>obtusiuscula pubescentia</sup> ~~conferti~~  
ternata foliola lat glabra ex trospum serrata lateralibus pubescentibus  
vix pollicaria ovata latere superiora parum angustiora intermedi-  
um obovatum parum magis breve petiolatum Peduncululi in  
apice ramulorum cum foliis junioribus conferti pollicariis et ultra  
~~semel~~ <sup>se</sup> bifidi pedunculus parialis alter triflorus alter multifo-  
rus forte ultimus est cespicius pedicellus intermedius primum florens  
longior bracteae villosae cinereo-purpureae ad basim pedicellorum  
Rataf fructu vix diversa Rami unexi glabri rigidi apice obtusi  
obscure angulati folia e nodulis parvis lateralibus remotis 3-4  
petiolata supra oblonga magnitudine Cerasi.

