

Anacyclus

1. creticus A. foliis decompositis lineari-bus: laciniis divisi planis
2. orientalis A. foliis compositis setaceis acutis rectis
3. aureus A. foliis bipinnatis teretibus sulis incanis, exarato punctatis
4. valentinus A. foliis decompositis lineari-bus: laciniis divisi teretibus sulis acutis,
floribus glomeratis
5. valentina A. caule ramoso, foliis pubescentibus bipinnatis, calycibus villosis
collis anfractis

2 orientalis Anacyclus foliis compositis foliis acutis rectis Hort Cliff. 417. L. V. pag. 775

~~Chamomelum orientale, foliis pennatis Tournefort. Carol. 37 Boeck. Lignit. t. p. 110. Tab. 110~~

Habitat in Oriente

Receptaculum nudum Vaill. ergo dubii generis. Descriptio deficit. Lin. L. V. l. c.

~~Chamomelum orientale~~
Folia pennata, semipollicaria. Pedunculus elongatus, uniflorus herb. Roye.
Planta spithamea. Caulis basi ramosi. rami in pedunculos elongatos de
scentes, uniflori. Folia frequentis pinnata, rigidiuscula, ut semipolli-
carii, subpilosi: pinnulae in spem terminatae, basi dentate
subulato, interdum bifido. Pedunculus glaber, striatus; superne pro villosus.
Calycis foliola margine lato membranacea. herb. Rus.

+ est Santolina hispanica chamomeli foliis Boeck. ac hinc retinet
mibi ignota

3 aureus Anacyclus foliis bipinnatis teretibus inanis, excavato-punctatis Mart. 287# S. V. p. 775.
Chamomel Chrysanthem Dod.

Anthemis Chrysanthemum herbariorum Lob. Ic. 771.

Chamomelum luteum capite cyphello Bauh. Pin. 135.

Chamomelum aureum peregrinum, capite sine foliis Bauh. hist. 3. p. 110

Habitat in Europa Australi oriente. 04

Caules plures, spithamei, erecti, sculi, substriati, villis obsolete canescentes. Folia bipinnata, teretibus, linearia, subcaneiscentia, villis decumbentibus: pennulae patentibus micronato, excavato-punctato: infima caulem amplexantur. Supremum folium simpliciter pinnatum. Peduncululi terminales, solitarii, longitudine caulis, uniflori, aphylli, similiter subpubescentes. Calyx hemisphaericus, pubescens, imbricatus squamis apice parvis obfcurioribusque. Corolla difflua semiobovata. Sepala difflua quinquefida: Radia feminei plurimi, parvi absque limbo (in Santalana anthemoide simili sunt nulli floretuli feminei). Receptaculum conicum: paleae lanicolatae, conicari luteae. Lin. M. C.

an Santalana hypoxia Bauh. hist. 1. p. 110
#ob 110 huc pertinet

q valentinus Anacyctus foliis decompositis linearibus: laciniis divisis teretibus acutis, floribus

profundis

Chrysanthemum Valentinum Clus. h. 1. p. 332. Lob. Ic. 723

Buphtthalmum lanuginosum, foliis millefolii Bauh. Pin. 135

Buphtthalmum tenuifolium simile Bauh. h. 3. p. 125.

Habitat ad Regni Valentini agros et vias. ⁱⁿ Cypri

Caules plures, ramosi, teretes, ⁱⁿ glabri, diffusi. folia bipinnata
remota, sesquialtera, pubescentia mucrone minuto terminatis, pubes non
summa inanis. Pedunculi terminales ramorum. Longi teretes
ternati, solitarii, villosi versus florem inevasati, uniflori
Calyx ^{pubescens} ~~pubescens~~ squamis lanceolatis, margine membranaceis
versus apicem fusco viridibus. Flores flabi

~~Santales lanuginosus~~ ~~lanuginosus~~ foliis Tournes. Cor. 37. Bauh
Luzd. 1. p. 102. tab. 110

Alio duo sub nomine Anacycli accepi, dubius vero adhuc sum an distincto a reli-
quis Anac: vel si tantummodo radiis differunt. Semina in utrisque apparent proppro mem-
branae colorato laevio inaequali

1. Ex horto Ups: sub nom. Anacycli Valentini

— Caulis frutescente rami supreme aggregati erecti subtilissimi striati caule albescente in
pedunculato elongata sub flore crispore, tomentoso ter minutati. Folia sub bipinnata
carnosiuscula glabra ^{teretia}, pollicaria, pinnis ^{teretibus} lacinate, glaucescentibus
albida. Flores magnitudine matricariae proceritate ante Anthema nutantes
Calyx scanopus niger, radius albus.

2. Ex Bononia secund. Thoin potius ex Europa Australi

^{Radice}

Annua. Caulis Habitus anthemidis Cotula. Caulis simplicissimus super ramulo
1-3 caputibus glaber uti tota planta striatus ^{filiformis} ^{teretibus}. Folia pennata sequipol-
licaria. pinnis pinnis trifidis. ^{pedunculibus} Pedunculis terminalis sequipollicariis nudis
unifloris. foliola calycina scanopa forte nil nisi matricariae Chamomille

Creticus Anacyclus foliis decompositis linearibus: laciniis divisis planis
Cotula cretica minima, Chamomeli folio, capite inflexo Tournef. Corol. 37.
Santolinoides annua procumbens, Chamomeli folio Vaill. act. 372. C

Habitat in Creta

Caules plures ascendentes parvis ramis ^{rigidi} inferne laxes nitidi superne villis pubescentes. Folia
bipinnata pollicaria. pinnis lanceolatis planis interdum divisis. Pedunculi flores ramulos
terminant, solitarii, pedunculati villosi incurvi ratione floris crassi floris globosis
foliolo calycina subaqualia, linearia villosa