

Anagalli

1. arvensis A. foliis ovatis ^{pedunculo brevioribus} caule procumbente
2. latifolia A. foliis cordatis ^{amplexibus, caule} ^{oppositis verticillatisque} bracteato ^{erecto} patente
3. monelli A. foliis lanceolatis, caule ^{erecto} ^{ascendentibus}
4. lineifolia A. foliis linearibus, caule ^{erecto}
5. pumila A. foliis subrotundis ^{fessilibus}, caule ^{erecto}.
6. tenella A. foliis subrotundis ^{subpetiolatis}, caule ^{repente}.

mantima Anagallis

Anagallis mantima lusitania perennis Tournef. G. R. 4

Caulis fere Habitat in Lusitania herb. Lus.

Caulis fere plures, ramosi, erecti, diffusi, tetragoni, glabri. Folia opposita, oblonga
vix unguiculata, crassa, glabra, arena, enervia. Pedunculi axillares, solita
ni, fructifer folio longiores, recurvi. Calycis laciniis subulato

linifolia A foliis linearibus, caule erecto Lin. spec. p. p. 212 + S.V.

Anagallis lusitana, *linana* foliis angustioribus Tournef. 4. R. 44. 143.

Habitat in Lusitania, Hispania C

Caulis tetragonus erectus palmari, rugulatus: rami alterni eriguntur. Folia
opposita, sessilia, acutiuscula linearia. Pedunculi filiformes oppositi
uniflori, foliis duplo longioribus. Eruuntur cornu calycis brevioribus
affinis *monelli* an *epicraneta*? ad omnibus partibus multo
minor

ovalis *Canagallis* foliis oblongis, floribus axillaribus sessilibus

Canagallis ovalis: foliis ovalibus cum brevi acumine, caule erecto, floribus
sessilibus. St. Per. 2. pag. 8. Tab. 115. fig. a.

Habitat in Peninsula collibus arenosis

Caulis vix palmari, angulatus, paucum ramosus. Folia sparsa, sessilia, ovalia
cum brevi acumine, integerrima, glabra. Flores axillares, solitarii, subses-
siles. Corolla minima. St. Per. l. c.

folia alterna in figura

3 monelli A foliis indivisis, caule erecto Lin. l. v
Anagallis tenuifolia monelli Planch. App. alt.

Anagallis compta, foliis binis ternisve ex adverso nascentibus Bauh. pin. p. 252

Habitat Verona O

foliis ^{lanceolatis} ~~marginatis~~ pinnatifidis

Caules plures vel rami basi ramosi, tetragoni glabri adscendentes pithu-
m. Folia opposita, suprema ternia, ^{et angustiflora} crassius firmiora quam in
reliquis glabra sex anguitulana suprema parum longiora et
latera fere cordato-lanceolata, acuta, margine membranaceo ovale
armato videntur, scabro. Pedunculi axillares ^{superiores} oppositi foliis longiores
fide forme. ~~foliis~~ ternis majoris quam in reliquis. Pedunculi fructi
fere reflexi

3 Anagallis verticillata All. fl. ped. p. n. 518 tab. P. 4. fig. 4
foliis quaternis et quinis

2 *Latifolia* a foliis cordatis amplexicaulis, caule compresso Lin. Sp. pl. p. 212 & 1. v
pag.

Anagallis hispanica latifolia, maximo flore Tournef. F. R. 4. 143.

Emiciata montana minor, flore coeruleo Barr. Ic. 504.

Habitat in Hispania Barbana ☉

Caulis tetragonus glaber ramis rami oppositi diffusi interdum pitha
moi. Folia unguiculata obscure transversa, arena integri
ma glabra. Pedunculi filiformes solitarii oppositi folio pa
rim longiore. Flores magni comulci. Capsula longitudine
fer calycis

folia superiora
interdum ternata

an rariata anervi

anguli caulis oppositi triplo latioribus angustioribus vero
marginis acutis utraque septis folia obtusiuscula, subtus
pallide punctata.

coerulea A.

anagallis coerulea foliis ovato-crenatis nervosi longitudine pedum
caulium, floribus coeruleis La Mart.
Habitat in Europa ☉

1 arvensis A. foliis indivisis caule procumbente Lin. S. V.

Fl. Lon. Tab. 88.

Anagallis phoenicea flore Bauh. pin 152.

Habitat in Europa arvis O

Similis latifolia ut per sanctos: folia subtus ~~per~~ nigro punctata Pollut
folia ovata sessilia opposita et ternata obtusa vel acuta
unquiculana - Pedunculi foliis longiores axillares oppositi
uniflori

Anagallis johannica foliis ovatis acutis pedunculo brevioribus: floribus
coccineis ha Mart

foliis ovatis pedunculo brevioribus, caule procumbente

humilis Anag. caule erecto, foliis subrotundis acutis sessilibus in. prodr. pag. 40
Habitat in Jamaica O

non vidi.

Stenella A foliis ovatis acutiusculis caule repente. Lin. l. V. Flora Dan
nimmularia minor, purpurascens flore Bauh. pin. 310. Prodr. 139. Mon. hist.
2. p. 567. f. s. t. 26. fig. 2.

Lysimachia Stenella foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio longioribus, caule re
pente Lin. Sp. pl. p. 211.

Habitat in Gallia, Anglia, Italia, donec erit etis humidis

Caules filiformes glabri ramosi palmati. summi alterni. folia subpetiolate
ovato-subtriangula glaberrima avenia, venosa integerrima, sex fere
unguicularia. Pedunculi axillares oppositi pollicares vel parum ultra
uniflori. Calyx post florescentiam contractus. petala lineari-oblonga obtu
susculata incarnata.

Virasifolia Smith.

petiolatis