

Anagyni

foetida A.

fetida Anagynis Lin. 392. Haselquiter. pag. 466.

Anagynis Dodon. Clus. hist. 1. p. 93.

Anagynis fetida Bauh. Pin. 391.

Habitat in Hispania, Italia, Sicilia, Barbano montibus &

Rami cortice tenero, ^{velut pubescente} superne pubescenti; Verber. Folia alterna, petiolata
terma. Siliola lanceolata, ~~est~~ sessilia, lateralibus parum minoribus, obtusa

cum mucronulo, arena, sesqui polliciana, subtus ^{pro} pilosa. Stylula ova

la acuminata ^{retro} villosa. Racemi terminales. Pedunculus articulatus villo

amplexicaulis petio
lo opposita

sur, articulis superne dilatatis. Pedicelli ~~Pedicelli~~ 3-4 ad fructum articulum

Calyx campanulatus fereus

inodora Cinagyni foliis pennatis, calycibus inflatis coloratis, racem
inis terminalibus oblongis, leguminibus compressis lous
fl. Cochinch. pag. 260.

at abbat in sylvis Cochinchinae
Arborescens. rami saepe scandentes. folia impari pinna
sa foliola oblonga acuminata, glabra inodora. Flores
arbor. Calyx brevis. lanna vexillo longior. Legumen
polyperumum

non vidi

Loureni. Anagyris foliis pinatis foliolis lanceolato - ovatis saevius
terminalibus cassis, leguminibus verticibus

Anagyris foetida Lour. fl. Cochinch. pag. 260

Habitat prope Cantonem Sranum.

frutex v. pedalis ligno duro foetido. folia multijuga
foliola integerrima glabra. flores albi. Calyx cyathi
formis. Petala omnia unguiculata. Legumen polyper
mum

non vidi