

Alnasfer

borbonis Anas fer. Guss. gen. pag. 150

non vidi

Borboniana ser

66

Habitat in insula Borbonia Commeson herb. Mus.

Rami teretes, glabri, cortice cinereo, superne fusco-purpureascentes, compressi, articulati. Folia petiolata, opposita, bis tri-polliciana, oblonga, basi sessilem vix semiunguiculari. Stipula uncinata, membranacea, truncata. Pedunculi minuti, crati. Fructus unguiculari. Pedicelli racemosi 1-2-3 flori. Bractea

borbonico Anasser

Habitat Commafor Herb. Musci

Rami teretes glabri, cortice cinereo, superne fusci, ad articulos parum crassiores.  
Folia superne, petiolata, bis. Tripollitana, elliptica, obtusa, int. egermina, glabra,  
arenia. Pedunculi infra foliacei, brevis sumi, oppositi, bis vel ter trifidi.  
Calyx persistens, <sup>5</sup>dentatus. Stigmata duo obtusa, longitudine corollae.  
Corolla glabra, parva. Emittit mucronatus pappi duplo major

Moluccana Anas per folia lanceolata acuta corymbis subterminalibus

La Mart F. L. 2 pag 40

Cortex foliorum Rumph. herb. amb. 7. p. 12. tab 7.

Habitat in India orientali. 5

Borbonica Anaseta foliis ovatis, obtusiusculis, corymbis lateralibus - La Mark

T-E. 2. p. 40.

Habitat in Borbonia 5