

Anchusa

1. officinalis A. foliis lanceolatis strigosis spicis secundis imbricatis calycibus
quinque partitis
2. angustifolia A. foliis oblongo lanceolatis integris, floribus spicatis, caly-
bus quinque partitis
3. Italica A. strigosa foliis lanceolatis integerrima, panicula dichoto-
ma ^{racemis} ~~diversis~~ paniculatis, calycibus quinque partitis laciniis
subulatis (idem cum italica)
4. Boreali A. foliis lanceolatis, inferioribus scaberrimis subundulatis, caly-
cibus incanis, corollis calyce six longioribus
5. undulata A. strigosa, foliis linearibus undulato dentatis, calycibus
multifloris inflatis laciniis ovatis.
6. tinctoria A. strigosa, foliis lanceolatis planis integris, spicis foliosis laciniis

per latic

m. ciliolata

7. *peruviana* A. foliis lanceolato ovatis petiolatis, pedunculis axillaribus
diphyllis, floribus capitatis.

8. *hippida* A. ^{foliis} lanceolato repando - dentatis strigis, pedunculis axillaribus
diphyllis.

Saxatilis

9. *virginica* A. floribus parvis, caule glabro.

10. *vernifolia* A. ^{foliis} lanceolatis dentatis, pedunculis ^{caulibus} caulique
strigosis, pedunculis lateralibus unifloris aphyllis.

Ceylanica Anchusa

Habitat ad littora maris in arenosis Zeylone inter Gale et Mature minus frequens

^{herb. Royeni}

Caulis herbaceus, erectus, pilosus, pubescens, teres. Folia petiolata, ovata, bipollicana, acuta, integerrima, avenia, villosula, supra scabra. Racemus terminalis indivisus, pedalis, secundus. Calycis laciniis ovatis, obtusis, cinereis. Corolla parva, calyce vix longior. Semina feti nigra glaberrima vestita

carnea

Anchusa hispida, foliis lanceolatis basi attenuatis denticulatis undulatis,
caule erecto, seminibus oblongis.

Habitat in Aegypto O

Tota hispida e pilis longis patentissimis. Caulis epithemous, simp-
lex, teres. Folia inferiora pollicaria remota, inferiora pollicaria
in petiolum attenuata, superiora breviora, sessilia, aerea, nerv-
osa, supra extorsum, praesertim verso margine adspersa tuberculis
minutis. Pedunculi axillares foliis breviores, bi- & triflori saepe
florentes, interdum supra axillares, terminales tri- vel quadriflori
saepe folium lineare pedicello opposito. Calycis foliola lineari-
lanceolata, longitudine tubi. Corolla albedo incarnata. Tubus albi-
dus, fornicis faucis flava: Corbi laciniis subrotunda.

multiflora U. nectans petio obtuso pedunculis racemosis remotis flore
longioribus

Habitat in Zeylona

Stamini digitales flores sepe 6-7. Squama minuta ovata pedunculis
angustulatis

Buglossum lusitanicum, foliis angustioribus, bullis minimis exasperatis Tournef.

Infr. r. herb. pag. 135

Habitat in Lusitania herb. ~~Tournef.~~ Tournef.

Caulis pedalis. Solia inferna inferne attenuata

7 *Sempervivens* A. pedunculis diphyllis capitatis Lin. S. V. p. 1067

Muglosium latifolium sempervivens Bauh. pin 256. Monf. hist. 3. p. 437.

p. 11. v. 26. fig. 2.

Habitat in Anglia, Hispania &

ovato lanceolatis ^{longis} ^{attenuatis} ^{petiolatis} ^{bas} ⁱⁿ ^{petiolis} ^{attenuatis}, nervos utraque
pediculis rariorebus oblique denticulata bipolliciarum superne
versus seorsum ^{bravum} ^{superior} ^{foliis} ^{longiora}. pedunculi ex axillis supremi folio
breves flores ^{supremi} ^{folio} ^{geminis} ^{sub} ^{pagula} ^{capitatis}
sic in primis partibus ^{supra} ^{terre}. in culta folia oblonga
et utriuscula

Sempervivens foliis lanceolatis ovatis petiolatis pedunculis axillaribus
basi diphyllis floribus subcapitatis

3 Italica A. foliis lanceolatis undulatis, summis acuminatis, squamulis faucibus peni-
celliformibus Lin. - V. pag. 186. Trac. pl. rar. Dec. 2. p. 14. t. 28.

Buglossum italicum flore conules Bess. Eyst. Op. ord. 8. fol. 5.

Buglossum angustifolium Lobel. obs. p. 310. ad. 246.

Buglossa Italica major et foemina Bauh. pin. p. 130.

Buglossum vulgare majus Bauh. hist. 3. p. 520.

Anchusa italica foliis lucidis strigosis, racemis bipartitis di-
phyllis, floribus subsaequalibus. fauce barbata Retz. obs.
1. p. 12.

Habitat in Italia Europa australi inque Barbana & valde
Pauli erectus bi- tripedalis ramosus, uti tota planta, strigosa.

Folia ^{concolora supra} radice et inferiora ^{pubescentia} pubescentia, in culta pedalia,
in petroleum desinentia, integerrima, suprema ^{longa} attenuata

strigosa

septa. Pedunculi ad eam altis supremis et terminalibus
bifidis interdum ter terminalibus ter dichotome divisi

Pedicelli ad distantes unguiculato bracteae subulata

Calyx quaque partibus longitudine pedicelli laciniis subu-
latis inaequalibus

italica foliis lanceolatis ^{racemis dichotomis floribus laciniis concoloribus}
multis faucibus penicelli formibus limbi lacinis inaequa-
cer

6 *Urtica* A. tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, flaminibus corolla brevioribus

Lin. S. V.

Urtica purpurea floribus Bauh. pin. 255.

Urtica monepeliaca Bauh. hist. 3. p. 584

Habitat monepeliacae Barbana locis apricis 2

Radix multiceps. Caulis plures ³ ~~se~~ ³ ~~introdum~~ ³ ~~caespitosa~~ ³ ~~caules~~
plures vel rami decumbentes palmas horti uti folia
prospertim ad marginem et costa subtus. Folia frequen-
ter uaginulata semibasi ovata semiamplexicaulem
nec terminales simpliciter vel gemini sicut pollicum
bractea longitudine calycis. Calyces quinquepartiti semina
rugosissime glabra

^{vela subtomentosa}

^{in exorimus planis}

Urtica A. hispida, foliis lanceolatis, ~~seme~~ ^{seme} ~~amplexicaulem~~ ^{caulem}, caulebus
decumbentibus ~~flaminibus~~ ~~corolla~~ ~~longioribus~~ ~~brevis~~
foliis calycibus hispidis ~~flaminibus~~ ~~corolla~~ ~~brevis~~ ~~subis~~
seminibus rugosis

1 officinalis A. foliis lanceolatis strigosis spicis secundis imbricatis calycibus quin
quepartitis Hort. kew. 1. p. 170

Buzelosum angustifolium majus Bauh. pin 256

Anethusa officinalis: foliis lanceolatis spicis imbricatis secundis ken.
S.V. pag. 105. 8l. Lan. Tab. 572

Habitat in Europa moderata, vras, azor 2.

Caulis bis. trigonatus erectus hirsutus uti folia et Calyces
Folia inferiora utraque attenuata petiolo & saepeosa
Petalia. Spicae secundae conjugatae

Strigosa

Undulata A. frigosa, foliis linearibus undulato dentatis, pedicellis bractea
minoribus, calycibus fructiferis inflatis Lin. S. V. p. 106. Mill. Dict.
4.29.

Buglossum lusitanicum, ceteri foliis undulato Tournef. G. R. 4: 134.

Anchusa, angustis dentatis foliis, hispanica Barr. ii: 570. Boic. mus 4.77.

Habitat in Hispania, Lusitania, Barbantia pratis et agri

Caulis plures digitales vel pedales, simpliciter, decumbentes

Folia ^{linearia} linearia obtusa sesquipollicaria valde frigosa, uti tota
planta, infima per petiolum attenuata, undulato-subre-
panda margine parum reflexa. Spicae terminales solitane
compactae. Calycis 5 fidi fructiferorum ^{remotiores} lacinis ovatis, flori-

ferorum linearibus lanceolatis. bractea lanceolata calycis
brevior, nivescens ^{oblonga} altero latere convexo altero planiusculis

sepe habet in plicionibus in cultis vero et pinguionibus
caulis saepe pedales et sesquipedales interdum erectioris

folia minus imbricata tamen frigosa lanceolata tri et
quadripollicaria viridia nec canescentia utraque attenu-
ata, repando dentata, juniora undulata, petioli remotiores

Boic. mus 4.77 ^{spica} minime margine revoluta. floribus copiosis: bi fidi
vel bi trifidi

frigosa cythra

— lanceolata

inferioribus

4 *Barbeleni* A. foliis lanceolatis ^{inferioribus} sibiricis subundulatis, calycibus in
caulis floris corollis calycis via longioribus

Buglossum sylvestre minus flore aureo, radice perenni Itali
cum Banel. u. ~~23~~. 344

Buglossum Barbeleni foliis ovatis lanceolatis, caule erecto
axillis foliorum florigeris, racemis florum uni lateralibus
all. fl. pedem. n. 164. Bellard: 411. pag 19

Habitat in Italia 4

Caulis fractus angulatus, ramosus: rami interdum ramu-
losi. Folia radicalia petiolata, lanceolata elliptica
eximie albi sibirica subundulata obscure denticula-
ta: caulina semi amplexicaulea lanceolata integer-
rima. Pedunculi axillares & terminales. Terminali-
bus bi dichotomi. floris racemosis parvis

Folia suprema
molleia

paniculata Anethusa foliis lanceolatis angustis integerrimis, panicula dichotoma
divaricata, floribus pedunculatis, calycibus quinque partitis: laciniis subula-
tis Hort. Kew. 1. p. 177 *

Habitat in Madaga

Facile dignoscitur calycibus usque ad basin quinquepartitis, et quod reli-
quum magis angustum est
a Petrii Italiae via diversa.

nihil non nota

fructu A. fructus subinde geminati calycibus ovatis 5-fidis. La Mart. 402
an *Andropogon angustifolia*?

Habitat in Europa australi oriente &

Folia integra

michi ignota

2 angustifolia *Achusa* racemis subnatis conjugatis Lin. spec. pl. 191. N. p. 106. *grecifolia*
Buglossa minor Trag. Hort. kew. 1. p. 170

Echii facie buglossum minimum, flore rubente Lob. Ic. 576.

Buglossum angustifolium minus Bauh. Pin. 256. Monf. h. 3. p. 430. f. 11. t. 26. fig. 4

+ Borago sylvestris perennis, flore niso Hermesino Zan. L. 49. t. 20.

+ Habitat in Italia, Germania &

Smellima Ar. officinale, sed folia caulina margine subdentata, spinulis aspera
et basi attenuata, nec ovato-lanceolata Lin. spec.

+ *achusa officinalis angustifolia* racemis subnatis conjugatis Lin. spec.
pl. pag. 191. f. v. p. 106.

5-6 hispida Anethusa ^{anethusa} fl. pedunculis axillaribus diphyllis, foliis lanceolatis ^{repando-} ~~dentatis~~

hispida
Anethusa hispida; pedunculis axillaribus bremibus, caule retrospum
hispido, foliis inferioribus petiolatis. Boiss. Desf. pag. 40

Caulis diffusus, ramosis, hispidus, uti tota planta

Folia superiora sessilia, approximata, pollicaria, lanceolata,
obtusata, ~~acraspioida~~, punctis callosi albidis ad ^{peris} ~~apicem~~, obtuse

dentata ~~de hispidis~~ ~~longis~~ ~~bracteis~~ ~~uno~~
pedunculis ~~axillaribus~~ ~~brevibus~~; foliola duo lanceolata ad basin

axillares, gemini
nales

calycis
semina oblonga, glabra, subnigresc.

parviflorum Ait. Folia lineantibus cauleque ramisq; hirsutis
vicinis parvifloris confectis Willd. Spec. pl. pag. 559.

Buglossum orientale angustifolium fl. parvo caeruleo.

Tournef. Cor. 6.

Habitat in oriente

non vidi

lanata. Anthisa.

Cynoglossum veticum argenteo angusto folio flore albo ex monte calpe
Her. Tournef

quore ~~off~~ Cynogloss

caespites C. hirsutus foliis quinatis-digitatis dantatis, ~~pedunculatis~~
pedunculis pedunculatis, foliis brevioribus, calyce hirsuto. Caus
Habitat in Cayenna

non vid.

4 virginica Anethusa floribus parvis, caule glabro L. P. V. p. 106

Lithospermum virginianum, flore luteo duplici ampliore Monf. h. 3. p. 447.
f. 11. tab. O. fig. 4. Raii suppl. 273.

Anethusa minor lutea virginiana, huc eam indigenis dicta, qua se pingunt Ame-
ricani Pluk. alm. 30

Anethusa lutea minor, quam alii Patoon vocant. Gron. Virg. 19.

Habitat in Virginia 4

Amocna A. foliis undulatis nervis triquetris ~~g~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~o~~ ~~d~~ ~~l~~ ~~f~~ ~~r~~ ~~u~~ ~~s~~ . s. t. 67.

fig. 2.

Monf. hist. 3. t. 20. fig. 2

Habitat

Cespitosa a. pumila subacaulis cespitosa, foliis linearibus hirsutis
angustissimis
Habitat in Creta 4

non vidi

~~echinata~~ A. peti candido subpinnatifido echinata, calycibus 5 partiti
bracteosis. La Mart pag. 403

Habitat

Folia lanceolata sessilia

Caperis Arab. folus lanicolatis callojis villosis, racemis trichotomis
Thunb prod. fl. Cap. pag. 34
Habitat in Cap. b. Spei

Coryifolia A. foliis longis linguiformibus apice basi que latioribus
pilis parvis nudi subpaniculatis Lamour. pag. 402
Habitat in Italia?

michi haec nota

macrophylla A. foliis radicalibus maximis caule debili calyce
subpentaphyllo, bracteis lineariibus minutis La Martre pag

202

an *Anethum japoniculata* ?

Habitat in Africa ?

michi non nota

Saxatilis A. pelosissima foliis lineari-lanceolatis floribus
prope axillaribus subsessilibus longe tubulosis Ha Mart.
pag. 403

Pallas d. 3. tab. f. 45. 1.

Habitat in Sibiria

non vidi

^{perugo aegyptiaca}
Aegyptiaca A. calycibus fructus ventricosus Spec. pl. p. 198 Mont. 334. Gaerth. hort 3. 7. 21

Habitat in Aegypto annua

anthera flava: calycibus proceris, pedunculis lateralibus decurren-

9 Vermicosa A. ^{supra ad axillas} foliis lanceolatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris.

Tota hispida

Caulis diffusus ^{ubi nota planta} subramosus, ramuli albi nigrescunt, siccis
si, scabi subramosi. Folia radicalia et inferiora petiolata
superiora sessilia basi utraque acuta lato lanceolata ven-
cis callosi albi hispida remote denticula bipollicaria sca-
berima. Pedunculi oppositifolii vel supra foliis, unguicula-
ri, calyci foliolo ^{superioribus} lineari inaequali. Corolla flava. calycis
fructiferi penduli, semina anthera

calyx diversus a fructiferis diversis ab aperuginis semina anthera

variegata Lycopsis foliis repandis dentatis callofis, caule decumbente, corollis cernuis
Lin. l. v. p. 109

Buglossum annuum ²²humile, bullatis foliis, flore conules eleganter variegato
Monf. h. 3. p. 439. f. 11. t. 26. fig. 10.

Buglossum creticum semicopum Scop. Bot. 57. t. 57.

Habitat in Creta O

Caulis uti tota planta frigida scaber rima, folia peltata lanceolata
Racemi ex apice superioribus et terminalibus. Pape geminis
breves valde strigosi. Semina rugosa. Lacinis calycis lanceola
to

Lycopsis bullata: foliis lanceolato-ovatis hirsutis, bullatis caule
procumbente Cyril. plant. rar: f. 1. pag. 34. tab. 11.
fig. 3
ut nifi varietas

retata Anethusa ramosa decumbens foliis ovato-oblongis sub
dentatis semicopis fructu foliis terminalibus La Mark
pag. 407