

Andrachne

telephoides A. procumbens herbacea
fruticosa A. erecta arborea.

Telephoides A procumbens herbacea Lin. L V. p

Glauc. procumbens, myrti Tarentini folio Boer. mus. 2. p. 168.
tab. 114.

Telephoides grœcum humifusum, flore albo Tournes. Cor. 80
Dill. Elth. 377. t. 202. fig. 364 Benth. cont. 2. p. 20. t. 12. fig. 2.

Lamentum humile Eoiff.

Crucis p. Eoiff.

Habitat in Italia, Grœcia, media &

Caules fruticulosi prostrati diffusi superne pubescentes
folia petiolata subrotunda integerrima videntur in senem
quiculae in crispifolia avena, alterna. rudimenta ramulorum
in axillis. pedunculi plures axillares parvi. Calyx penta-
phyllus folioli ovatis margine membranaceis

— folia subrotunda

Telephoides Androsifne procumbens herb. aca. Lin. t. V. pag. 871.
Timeum humile Coste. Desf. r. pag. 79.
Emcliofa hexagyna Lynd. t. b. pag. 200.

fruticosa. A. erecta herbacea. arborea Lin. Spec. pl. pag. 1440*

15. *Plectra androgyna* Mart. 120

~~Alta~~
Habitata in China

Rami laxes pubescentes. Folia fere myrti interdum longiora breviora
sine petiolata integerrima glabra. Flores axillares masculi
et foeminei bini quasi e gemma minuta globuliformi. Alii
masculi calyce monophyllo orbiculato plano obtuso, parum
quinq. fido. Alii in eadem planta quinq. fida

— foliis oblongis . . .

refert Phyllanthi varii Capsula baryulata angulis unisulcatis