

Conf. *Dubamel* nova  
Ed. 1810

Anomoda

1. *Adragora* A. pedunculis lateralibus solitariis, corollis campanulatis foliis ovatis obtusis  
quadripariam imbricatis
2. *hypnoides* A. pedunculis solitariis terminalibus, corollis confertis campanulatis, foliis confertis  
subulatis
3. *calyculata* A. pedunculis solitariis axillaribus secundis, bracteis binis, foliis ovalibus  
squamoso-punctatis obsolete serratis.
4. *Cerca* A. pedunculis axillaribus solitariis diphyllis unifloris, foliis alternis ovatis  
serratis
5. *nigrescens* A. floribus solitariis axillaribus subsessilibus, foliis oblongis acutis ~~superne  
serratis~~  
~~videtur microphyllis~~ ramis angulatis, calycibus squamis imbricatis
6. *polifolia* A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis lanceolatis revolutis
7. *caerulea* A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis sparsis linearibus obtusis  
plana
8. *feruginea* A. pedunculis axillaribus aggregatis, foliis oblongis integerrimis sub  
tus canescentibus
9. *fasciculata* A. pedunculis aggregatis axillaribus, foliis lato-lanceolatis superne  
serratis, obtusis semper viventibus, corollis ovatis

10. octandra A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis quadrifidis, foliis alternis ovato-lanceolatis integris membranaceis
11. jamaicensis pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis; foliis alternis lato-lanceolatis obtusis integris, subtus venosis membranaceis
12. manana A. pedunculis aggregatis racemis, corollis ovato-cylindricis, foliis oblongis ovatis integerrimis deciduis
13. lucida A. pedunculis axillaribus aggregatis, foliis ellipticis integerrimis semper viventibus, corollis cernis
14. byantha A. floribus corymbose, foliis ellipticis, caulibus prostratis
15. droseroides A. racemis secundis, foliis linearibus pilosis viscidis
16. Sabicea A. racemis secundis, flenibus quadrifidis ovatis, foliis ellipticis pubescentibus tomentosis
17. coracca A. racemis axillaribus simplicibus, foliis ovatis integerrimis nitidissimis ramulis Inguetris
18. acuminata A. racemis axillaribus simplicibus, foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis
19. axillaris A. racemis axillaribus bracteatis secundis, corollis cylindricis, foliis ovato-lanceolato-ovatis semper viventibus superne serratis
20. racimosa A. racemis terminalibus simplicibus bracteatis, corollis cylindricis, foliis lanceolato-oblongis serratis

21. paniculata A. racemis terminalibus paniculatis, corollis subcylindricis, foliis ovatis serrulatis
22. foliis: foliis racemis terminalibus simplicibus secundis, corollis cylindricis, foliis lanceolatis integerrimis <sup>semp</sup> perennantibus supra bifurcatis
23. anastomosans A. foliis ovatis serrulatis subtus anastomosatis punctatis
24. basi-folia A. racemis terminalibus secundis simplicibus, foliis ovatis mucronatis integerrimis semper virantibus, corollis oblongis
25. nyctagini A. foliis oblongis alternis serrulatis
26. arborea A. racemis paniculatis terminalibus secundis, foliis ovatis acuminatis serrulatis, corollis ovato cordatis tomentosis internodiis
27. pedicifera racemis terminalibus compositis pedicellis subsimplicibus, foliis lanceolatis serrulatis decedentibus, corollis globosis
28. japonica A. racemis paniculatis cylindricis bracteatis, foliis ellipticis reflexis apice serratis.

nul semulata Marten et Wed. ex Cassinifolia Venten  
 Hort. Pelsi  
 numera mucronata } 22 Thunberg  
 B

24 Globulifera <sup>gutturifera</sup> Andromeda  
pelulifera Racemis terminalibus compositis pedicellis suffoculatis Colis  
+ ellipticis lanceolato-femulatis dec. duobus, Corollis globosis.

Valinum fructu parvo quinque capsulari bot. Pluk. Almat. app. pag. 216. pl. 16. Tab.  
452. fig. P.  
legustinum hab. in Am. sept. 4

Can

Rami teretes cortice fusco  
Folia petiolata, albata, elliptico lanceolata, minutissime femulata  
supra viridia subtus glabra subtus pallidiora, pilis vix conspicuis adpre-  
sis, pollicaria. — Petiolus brevissimus erectus

Folia juniora supra subullosa Racemis terminalibus, plerumque compositis ~~ternatim ramis~~ teres pedun-  
culis communis teres ~~fusca~~ purpureo fusca Pedunculi pollicaria  
ni pedunculi erecti, pollicares, pallidiores, subangulati, pedicelli  
plures ex eodem puncto raro solitarii patentes semi  
bractea nulla Calyx minutus calicis ovatis acutis glabris.

Pedicelli et germina subullosa Corolla globosa glabra carnea  
Filamenta corolla breviora, antheris mixta  
Stylus longitudine corollae  
variat foliis lat. aca. minoribus acuminatis plus vel minus glabris subtus

Nota in plerisque Andromedis frangia corolla breviora, stylus longitudine eam  
aequat hinc floris tempore florentis nutantes

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

452-f. de ann. app. p. 16

Andromeda

Habitat in Pen herb. Fusca:

Frax myrsinitis. Calyx sive pediculus. Corolla oblonga

*Andromeda*

Pl. Linn. tab. 236. fig. 3

Habitat herb. mus.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, pollicaria, oblonga, acuta vel obtusa, integerrima, venosa utrinque glabra. Petiolus brevis. Pedunculi aggregati, plures, unguicularis, uniflori. Flores cylindrici. Calycis foliicola squelancolata, acuta.

aliam vidi in herb. mus. sub eodem synonymo at diversam  
paniculata Brant. secund. Syn.

*Fernynea Andromeda*

Habitat in Georgia

Rami teretes, superne angulati, pulvere fernyneo. Tomentofi, uti folia subtus;  
pennosa utraque. Folia petiolata, pollicaria, oblonga, venos pinnatifida, basi  
acuta, apice obtusiuscula, integerrima. Peduncululi axillares, plures, uniflori,  
semiunguiculares.



integri folia Andromeda

Habitat in Peru herb. Guss 5

Crutivulus repens, glaberimus. rami breves, pubescentes, simpliciter,  
pollicares, ascendentes. Folia sessilia, semiunguiculata, oblonga, acuta,  
avenia, enervia, integerrima, coriacea. Peduncululi axillares, solitarii, uni  
flori, folio parum longiores. Bracteae duae ovatae, <sup>ata</sup> hinc, acutae, aequae  
pedunculo breviores. Calyx supenus, 4fidus, persistens. Corolla ora  
tu glabra

*Andromeda*

Habitat ad fretum onagellanicum Commerf. herb. Musf.

Stem 3 ad 6 pedalis, glaber. rami glabri, oppositi, compressi. Folia rigida, opposita, oblonga, emarginata. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori. Flores albi, nutantes. Cal. 5 fidus: lacinis acuta. Corolla globosa campanulata quinquefida, lacinis revoluta. Stamina 10 corolla inserta.

*anastomosis Andromeda*

Habitat herb. Guaf.

Rami hirti. Folia breviter petiolata, unguiculata, ovata, acuta, serrulata: serris inferioribus seta terminatis, rigida, supra nitida subvenosa, subtus pallidiora, venosa, venis elevatis, piliferis. Racemi terminales. Foliola calycis ovata, margine villosa.

Myrsinites Andromeda <sup>Hombus.</sup> pedunculis solitariis axillaribus subsessilibus foliis oblongis <sup>acutis</sup> super  
ferratis Ramis angulatis Calycibus squamis imbricatis  
Andromeda myrsinites foliis minutis ovato lanceolatis ferratis sparsis; pedunc  
lis <sup>solitariis</sup> axillaribus brevissimis unifloris.

hab. ad fret. magell.

Trait ex humilis. Rami glabri, angulati

Folia sessilia alterna, conferta oblonga, superne serrata, acuta, glabra rigida.

bilinearia petiolus vix albus

Flores sessiles; solitarii axillares squamis plures (v.) ad basin calycis lineares  
glabra imbricatis. ovata

Calycis laciniis ~~oblongis~~ acuta quinquefidis

Corolla subcylindrica glabra

antheris mixta

microphyllus Arbustus **Torsteni** fide herb. Ca. Martii. et Forst. spec. in  
a Torsteno Tabernico commun.

1, tetrayona andromeda pedunculis lateralibus solitariis, corollis campanulatis  
foliis oblongis <sup>ovatis</sup> ~~tri~~ obtusis <sup>quadris</sup> ~~imbricatis~~

Andromeda foliis quadris <sup>angulatis</sup> imbricatis obtusis et alis florens  
Flor. Lapp. 166. t. 1. fig. 4.

Andromeda pedunculis solitariis lateralibus, corollis campanulatis,  
foliis oppositis <sup>by cop. glabris</sup> imbricatis ~~imbricatis~~ obtusis revolutis den. S. V. p. 405  
Habitat in Alpibus Laponiis, Gronlandia &

Stipitibus palmarum ramis teres glaber facie fere empetri.  
Folia sessilia, ~~ovata~~ <sup>obovata</sup> adpressa, convexa supra plana subtus  
lateralibus obliquis, ~~folia~~ <sup>folia</sup> ~~caudata~~ <sup>caudata</sup>, hinc quasi trigona, parva.  
Pedunculi laterales flores nutantes caecis calycis ovato  
Corolla And. hypnoidis

2 hypnoides Andromeda pedunculis solitariis terminalibus, corollis campanula-  
tis, foliis confertis subulatis Lin. S. V. pag. 406. Fl. dan. t. 10  
Andromeda foliis aciformibus confertis Fl. lap. t. 1. fig. 3.

Habitat in Alpibus Norvegiae et Lapponiae, <sup>omni prope</sup>

Caules sicliiformes procumbentes, ramosi. Folica minuta, conferta, in-  
cumbentia, glaberrima, nitida supra plana subtus convexa. Pedunculus  
terminalis solitarius uniflorus unguiculari purpurascens. foliola  
calycina ovata & lobata. Anthera aristata.

4 cerea Andromeda pedunculis axillaribus solitariis diphyllis unifloris, foliis alter-  
nis ovatis serratis Lin. Suppl. p. 230\* l. V. pag. 406

Habitat in Tahiti

Similis And. macrocarpa, sed glabra est. Folia brevia petiolata. Corolla cam-  
panulata - Antherae oblongae, luteae, dorso bicornes. Lin. l. c.

Rami teretes glabri. Folia serrulata, pollicaria, ovalia utroque  
acuta, glabra venosa rigida supra laevia, basi apice integerrima  
Corolla conica

— ovato-oblonga

5 polifolia Andromeda pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis  
lanceolatis revolutis. L. S. V. p. 406. Flor. Dan. t. 54

Vixi idem affinis polifolia montana.

2 Polifolia Burck. Cent. Comment. Petr. 2. p. 345. Cent. 5. p. 28. t. 99. f. 1.

1 Erica humilis rosmariifolia, unedoniiflora, capsula cistiflora  
Plukh. alm. 136. t. 175. fig. 3.

media a foliis lanceolatis, corollis oblongo ovatis rubicundis, laciniis caly-  
cini magis erectis. Hort. Kew. <sup>2</sup>Part. 60. p. 13.

angustifolia foliis lanceolato linearibus, laciniis calycinis oblongis  
imbris Hort. Kew. l. c. p.

latifolia foliis oblongis, corollis ovatis imbricatis, laciniis calycinis pa-  
tentibus ovatis albis: interdum apice rubicundis Hort. Kew  
a. l. c. 2<sup>4</sup> Herbar. Sup. Nov. Tom. 2. t. 11.

Habitat a in Europa frigidioris paludibus turfosis.  $\beta$  in  
Lapponia.  $\gamma$  in America septentrionali

Caulis prostratus sive struthamoi teretes glabri tenues. <sup>aphylli</sup> Prami super  
ne angulati. Folia brevissime petiolata alterna, approximata  
nolligantia utriusque acuta sicuti vix glauca, supra nudo pullo  
in medio etarata, a venis <sup>tercio</sup> terminatis pediculis unistroni



terminales aggregati glabri  
purpurascens. Flores cernui

6 conulea Andromeda pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis sparsis  
linearibus obtusis planis Lin. Fl. V. p. 406. Fl. Dan. t. 57.

Erica folio abietis, flore abuti Boerh. cent. 4. p. 26. t. 53.

Andromeda foliis linearibus obtusis sparsis Flor. Lapp. 164. t. 1. fig. 5.

Habitat in Alpibus Norvegiae et Lapponiae.

~~Erica~~<sup>Erica</sup> procumbens, ramis filiformibus, rabris & saepe foliorum  
folia linearia, sessilia patula, basi cuspidata, mucronata  
subtus linea alba. Pedunculi terminales erecti, plures  
villosi viscosi pollicares. Flores nutantes. Lacinae calycis  
Caniculae<sup>lobes</sup> acuta purpurascens villosa viscosa. Anthera mutica

o fasciculata Andromeda <sup>pedunculis</sup> ~~floribus~~ <sup>aggregatis</sup> axillaribus foliis <sup>lanceolatis</sup> ~~oppositis~~ <sup>superne</sup> serrulatis, obtusis <sup>glabris</sup> ~~perpetuis~~, Corollis <sup>subglobosis</sup> ~~subglobosis~~ cylindricis  
Hab. in Amer. merid. <sup>Guatemala</sup>

Rami inferne teretes superne angulati, ferruginei

Folia petiolata alterna lanceolata elliptica, basi integerrima  
superne serratis remotis paucis, obtusis, rigidis glabris subtus punctis  
minutis <sup>reticulatis</sup> ~~numerosis~~ ferrugineis, venosis, pollicaria, appressimata  
petioli brevis semicircum alaris

Bractea minuta pmo decidua.

Pedicelli axillares fasciculati, plures plures angulati ferruginei petio

lo duplo longiores ferruginei glabri

Calyces laciniis ovato-acutis brevibus <sup>seque</sup> ~~velut~~ <sup>seque</sup> ~~petalis~~ <sup>seque</sup> ferrugineis <sup>et</sup>

Corolla cernua subcylindrica

filamenta corollae breviora. Anthera mutica

Stylus longitudine corollae

Andromeda axillaris pedunculis aggregatis, corollis... foliis  
alternis ovato-lanceolatis obtusis subserulatis coracis  
Schw. prodr. p. 73.

numera fere ut in  
Elaeagnis

*Octandra* A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis quadrifidis, foliis al-  
ternis ovato-lanceolatis integris membranaceis Sw. prodr. p. 73.  
Habitat in Jamaica. 5

non vfd.

7 ferruginea <sup>2</sup> Andromeda pedunculis <sup>1</sup> axillaribus aggregatis, <sup>Corollis subglobosis</sup> foliis oblongis integerrimis  
subtus ~~anice~~ canescentibus subtus squamose scarosis  
~~Habitat in Barbis~~  
Rami angulati subpubescentes. Folia petiolata, <sup>obtusae basi</sup> concava, supra gla  
acuta <sup>bra</sup> subtus squamose canescentibus, unguiculata. Pedunculi foliorum  
breviores, uniflori. Corolla.  
~~arsatur esse andromeda jamaicensis Schw.~~

ferruginosa Gmel. Syst. veg. specie vix differt

Dedit A. W. Wood

Jamaicensis A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis; foliis alternis  
lanceolatis obtusis integris, subtus cineris membranaceis Sw. prodr  
pag. 73.

Habitat in Jamaica

~~Rami angulati subpubescenti. Folia petiolata, obtusa basi acuta~~

non vidi

~~eodem loco cum fernigena~~

nitida. A pedunculis aggregatis axillaribus, foliis alternis lanceolatis  
ovatis integris perennantibus Walt. fl. car. p. 137  
Habitat.

~~in~~ eadem cum lucida La Martini et coraica Hort Ven  
~~nitida~~ D. et Richard

9 manana Andromeda pedunculis aggregatis ramis, corollis ovato cylin-  
dricis, foliis ovato oblongo, ovatis integerrimis deciduis

Arbutifolia manana, brevioribus eunymis foliis pallide visenti-  
bus, floribus arbutis ex eodem nodo plurimis, spicatum uno  
versu erumpentibus Pluk. mant. 25. t. 448.

Andromeda foliis ovatis, pedunculis fasciculatis, capsulis penta-  
gonis apice dehiscentibus. Gron. Virg. 49.

Andromeda manana pedunculis aggregatis, corollis cylindricis  
foliis alternis ovatis integerrimis Lin. S.V. p. 406.

Habitat in Virginia

Rami pallide purpurascetes, glabri, pauci & laxi.

Folia petiolata ovalia vel oblonga ut per quipollicaria  
acutiuscula utraque glabra, sabtu pallidiora magis venos

reticulata. Pedunculi in ramis distinctis aggreg. plures ex  
eodem gemma pollicari patentissimi flores nutantes foliola  
calycina lanceolata glabra. Corolla cylindrico campanula-  
to. anthero mutico

petiolo armato punctis  
reprobi nullique ad  
spicato



10

<sup>pedunculis aggregatis secundis</sup>

*Cucida* *Andromeda* ~~*Racemis terminatis*~~ ~~*foliis floribus fasciculatis*~~  
foliis ellipticis glab integerrimis semperverentibus Corollis conicis  
hab. in amer. sept. Superne Bonqueti

Rami fruticis teretes glabri cortice fuso  
Folia sessilia, alterna elliptica obtusa integerrima, ~~avenia~~  
glaberrima ~~sericea~~ nitida semperverentia pollicaria  
inflorescentia ~~et in calyculato~~

Racemus ~~terminalis~~ foliatus ~~truncatus~~  
foliola lanceolata sessilia ~~fructura~~ foliorum caulis ad  
unum latus unguiculares

Pedunculi fasciculati <sup>bracteati</sup> in alis foliorum 9-10. secundis  
patentissimi foliolo duplo minora glabra bractea nonnulla  
ad basin

Calyx quinquepartitus laciniis lanceolatis glabris  
Corolla ovata glabra  
Anthera mutica

*Andromeda* *Cucida* pedunculis aggregatis, lateralibus, foliis ovatis  
lanceolatis integerrimis conicis supra *Cucida* ramis acutangulis  
et mark. Enigt. nova

3 calyculata <sup>solitaria</sup> Andromeda pedunculis axillaribus secundis, bracteis binis, foliis ovalibus  
squamoso punctatis obsolete serrulatis Hort. kew. 2. p. 70.

Andromeda calyculata racemis secundis foliaceis, corollis subcylindricis, foliis  
alternis lanceolatis obtusis punctatis Flor. Lasei. 357. spec. pl. pag.  
5654 S. V. 407

ventricosa corollis globosis foliis oblongo lanceolatis Hort. kew. l. c.

Chamaedaphne Buxb. in Comm. petr. 1. p. 241. T. P. 1.

latifolia <sup>α</sup> corollis oblongo cylindricis, foliis oblongo ovalibus obtusis  
Hort. kew. l. c.

angustifolia <sup>β</sup> corollis oblongo ovalibus, foliis oblongo lanceolatis Hort. kew. l. c.

Andromeda Gmel. Sib. 4. p. 119. n. 4.

Habitat <sup>α</sup> in Bussia <sup>β</sup> Newfoundland; <sup>γ</sup> America septentrionalis  
et Sibinia

Inde ex ramis heretibus purpurea fentibus floriferis flexuosis  
foliis brevissime petiolata, coracis lanceolato ovalia  
obscura serrata, margine vix <sup>flexo</sup> retusato, adspersa, proferim subtus  
punctis numerosis ferrugineis et imprimis in <sup>α</sup> inferiora  
polluciana: floralia menora vix <sup>flexo</sup> minoribus, secunda  
floris <sup>utiq</sup> superne in ramis, racemiformibus. Bractea ovato  
acuta lanoso. lacino calycis. Anthera mutice

reticulata A. racemis ovatis axillaribus, foliis ovatis acuminatis crenu-  
latis petiolatis subtus reticulatis perennantibus. Wol. fl. car. p. 13 ed.  
Habitat.

est prostrata Lamartini et acuminata. Host. New-  
~~radi~~

14 myrtifolia  
+ integerrimis

~~Andromeda floribus axillaribus capsiculatis foliis ellipticis sempervirentibus  
nitidissimis, Corollis cylindricis  
habita Amer. sept.~~

Rami superne triquetri, glabri florati

Folia alterna, brevissime petiolata, elliptica, integerrima ac utraque  
acuta, glabra nitida, venis <sup>marginem</sup> non attingentes pollicaria

Racem<sup>is</sup> capsicatis florum axillares basi bracteis linearibus intermixtis

Peduncululi Petiolo duplo longiores semper utraque glabri

Tubercula calycina lanceola corolla duplo breviora glabra

Corolla cylindrica glabra cernua tubo superne parum angustior

Stamina brevissima basi corollae inserta. Antheris muticis

Germe globosum glabrum stylus linearis longitudine corollae

Conacea Andromeda racemis axillaribus simplicibus, foliis ovatis integerrimis  
nitidissimis, ramulis triquetris Hort. kew. 2. p. 70. L'heret.  
florp. nov. Tom. 2. t. 15.

ellipticus

4. *acuminata* andromeda racemis axillaribus simplicibus, foliis ovato-lanceolatis  
acuminatis serratis Hort Kew. 2. p. 70. L'Heret. Sup. n. 2. t. 16.

*Andromeda lucida* Jacq. coll. 1. p. 95.

Habitat in America septentrionali;

Glaber ramis flexuosis. Folis petiolo <sup>perennantia</sup> ovata attenuata utraque  
ex latere venosa reticulata rigida sesquipedalia ov. Racemi  
foliis brevioribus

— attenuatis.

Lucida A

Andromeda lucida Gaerq. coll. 1. pag. 95

Habitat in Amer. sept. 5

Arbustula quadrupedalis erecta glabra omnino Vesetibus. Folia lanceolata  
acuminata alterna, petiolata, 2 pollicaria integerrima vel obsolete spinosa  
et inaequalis nervi serrulata, coriacea, rigidula subtus glaberrima, supra per  
lucida, ore latis venis reticulata. Racemi axillares solitarii multi  
flori. pedicelli penduli. Corolla nivea subcylindrica. Capsula subrotunda  
sive sphaerica foveolata Gaerq.

acuminata Hort. Ven.

catechovi A. racemis ovatis axillaribus, foliis alternis petiolatis ovato-  
lanceolatis serrulatis perennantibus Walt. fl. lat. p. 137  
Habitat.

~~non vidi~~

non differt ab A. axillari

16 axillaris Andromeda Racemis axillaribus bracteatis, <sup>sebandi</sup> corollis tubulosis, foliis  
 lanceolatis <sup>ovatis</sup> ~~ellipticis~~ <sup>sebandi</sup> semper venis bus superne serratis  
 Andromeda axillaris foliis subserratis glabris corollae racemis axillari-  
 bus, foliatis brevissimis. La Mart.

Hab. in amer. sept.

Index. Rami <sup>ser</sup> viri glabri, flexuosi ~~et~~ apicem subterquendi  
 folia petiolata, alterna lanceolata oblonga elliptica, serrata basi  
 integerrima, glabra levia, aluminata, venosa, rigida bipollita  
 na.

Petiolus brevissimus supra planus, subtus convexus fuscus.

Racemi axillares foliis triplo breviori solitarii

Flores subsessiles, secundi patentissimi approximati

Bractea <sup>condato</sup> ovata, concava acuta, glabra longitudine pedicelli  
 foliola calycina ovata acuta glabra ovula triplo breviora.

Corolla cylindrica lobis dentibus acutis

Andromeda axillaris racemis axillaribus simplicibus  
 corollis oblongis, foliis ovatis acutis serratis ~~et~~ <sup>sebandi</sup> ~~et~~ <sup>sebandi</sup> ~~et~~ <sup>sebandi</sup>

Abrutus laeviflorus 60. caule arbores, foliis oblongis utroque acuminatis  
 filamenta plana laevia subulata, acuta serratis glabris, racemis axi-  
 lantibus secundis sessilibus solitariis

antheris muticis

nis Lin. Suppl. p. 230. \*

eadem axillaris  
 Andromeda  
 confer cum lucida  
 La Mart.  
 folia lanuginosa  
 serrata basi  
 fusca  
 fere

bractea adhuc desi:



17 racemosa Andromeda racemis terminalibus simplicibus bracteatis, corollis cylindricis, foliis ~~oblongis~~<sup>secundis</sup> lanceolatis oblongis serratis Hort. kew. 2. p. 69.

L. Herbar. Prop. nov. Tom. t. 13.

Andromeda <sup>racemosa</sup> racemis secundis bracteatis, corollis cylindricis ~~bracteatis~~<sup>gibbosis</sup>, foliis ~~oblongis~~<sup>alternis oblongis</sup> serratis Len. Spec. pl. p. 564 f. 5.

V. pag. 407.

Habitat in Pennsylvania, maritima  
Rami teretes superne angulati, glabri, folia petiolata sesquipollicaria utrinque acuta, glabra venosa tenera anaia. Racemi terminalis simplices interdum basi ramo uno alterove, & n. pollicares. Flores secundi pedicelli breves bractea <sup>brevis</sup> ~~bractea~~ <sup>us</sup> ovata <sup>us</sup> acuta ~~obovata~~ ad basin floris calycis longiore anthero apice aristato

an racemosa Len. forte speciosa Bolanderi specimen hujus uti et paniculata  
non dubio determinari

10 paniculata Andromeda racemis terminalibus paniculatis, corollis <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ <sup>subrotundis</sup> ~~subrotundis~~ <sup>foliis</sup> ~~foliis~~ <sup>oblongis</sup> ~~oblongis~~ <sup>semitatis</sup> ~~semitatis~~

Vitis id ea americana, longiori mucronato folio et renato folio  
floribus unicolatis racemosis Pluk. Alm. 391.

Andromeda foliis ovatis acutis crenulatis planis alternis, floribus  
racemosis Hort. Cliff. 152. Gron. Voy. 4 p.

Andromeda paniculata racemis secundis nudis paniculatis,  
corollis subcylindricis, foliis alternis oblongis crenulatis Lin.  
S. V. p. 406.

Habitat in Virginia antea apud apud ut in racemosa  
brevitate de quo. Similis racemosa diversa racemis paniculatis  
foliis brevibus.

racemis terminalibus fructiformibus subgeminis corollis subcylindricis foliis  
oblongo-ellipticis semulatis deciduis

erupens Andromeda folis oblongi alternis serrulatis L. Suppl. 237. S.V. 407  
Habitat in nova Zelandia

Rami sparsi tuberculati.  
Frambulus humilis glaber. Folia breviter petiolata, <sup>parva simplicia</sup> ~~acutiuscula~~  
na, rigida, subtus tenuissime venoso-reticulata, obtuse serrata.  
Paniculi axillares et terminales, foliis pernum longioribus, pedunculis  
squamis ovatis acutis imbricatis

19 *Salicifolia* *Andromeda* racemis terminalibus <sup>geminis</sup> ~~simplicibus~~ secundis corollis cylindricis  
foliis oblongo lanceolatis, integerrimis perennantibus supra bilineatis  
*Andromeda salicifolia*, arborescens racemis terminalibus, floribus parvis  
erectis; foliis peracute lanceolatis Lamour.  
Hab. in Insul. Bourbon

Trunk ramis verticibus glabris cortice fusco  
Folia petiolata, alterna, lanceolata, utrinque attenuata integerrima  
arseni supra bilineata, subtus pallida sesquipollicaria  
petiolis brevis semper unguiculatis  
Racemus terminalis <sup>geminus</sup> foliarius simplex bipollicaris, erectus glaber  
Flores secundi suberecti, cylindrici solitarii  
bractea lanceolata decidua ad basin pedicellorum  
Corolla Calyx laciniis ovatis glabris  
Corolla <sup>glabra</sup> 5 dentata dentibus acutis elliptico

*Cestifolia*? aliam prospice forte non nisi varietas distincta tamen foliis oblongo  
lanceolatis racemis terminalibus geminis reliqua vero omnia eadem  
Bractea minuta in pedicellis

*Andromeda salicifolia* racemis secundis nudis, corollis subglandosis,  
foliis lanceolatis acutis integerrimis Smith. plant. ined. 3, pag. 50  
Tab. 50

21 *buxifolia* Andromeda Racemis terminalibus secundis simplicibus, foliis ovatis mucronatis  
sempervirentibus ovatis integerrimis corollis subcylindricis oblongis  
Andromeda *buxifolia* racemis terminalibus erectis, floribus sparsis  
nutantibus ovatis, foliis ab stratis apiculis terminali cordato ovatis  
obtusis h. L. Marti

hab. in Insul. Bourbon +  
Rami veretes glabri

Folia petiolata, alterna, ovata, integerrima mucrone obtuso  
terminata, glabra, subtus albida tamen non tomentosa, avenia,  
rigida, semunquiculae ionicae

pediculus folio triplo longior.

Racemus terminalis solitarius erectus pedunculatus angulatus  
glaber. Pedicelli secundi solitarii. Veretes corolla breviora

bractea decidua

foliola calycina ovata, glabra, acuta

Corolla ovata glabra cernua.

Talces inflorescent et corolla ut in *folia ifolia* differet figura folio  
rum, et nulla linea in pagina superiore

Andromeda *buxifolia*: racemis secundis ovatis, corollis subcylindricis  
foliis cordato ovatis integerrimis mucronatis Smith. Gc. pl.

ind. 3. p. 59 tab. 59.

20 anastomofans Androm foliis ovatis sub serratis subtus anastomofibus punctatis hinc

Suppl 237\* P.V. 407

Habitat in nova granada 5

In dete determinate ramofus: ramis pilosis. Folia alternis, conferta, subpetiolata  
tu, ovata, acuta, lucida, vix manifeste serrata, subtus venis anastomo  
fantibus puncto elevato. Racemi ex gemmulis annothna, conferti, con  
gesti ex racemis foliaceis: foliulis caulinis simplicibus, sed parvis. Corolla  
ovata. Antheris antrudualibus, fingulis iterum bianthatis. Capsula  
obtusis: angulis dehiscentibus her. l. l.

non vidi

23 arborea  
malifolia Andromeda Racemis paniculatis terminalibus, ~~et raris secundis acuminatis~~ foliis ovatis serratis  
glabra Corollis ovato conicis tomentosis internis.

hab. in amer. sept. t  
Rami teretes glabri cortice fusco crassitie penna anserina  
Folia alterna ~~ovata~~ petiolata ovata acuta, serrulata ferraturis uno  
qualibus basi integerrimis, glabris, transversim nervosis, subtus  
pallidioribus bi f. 3 pollicaria, maxima hujus generis.

Pedunculis unguiculatis Racemis terminalis, compositis magnis Pedunculis alternis  
angulatis bipollicares erecti glabri. Pedicelli secundi lineares  
et ~~non summo modo~~ ~~inter~~ ~~in~~ internis. Bractea nulla. Duo minutissimi pedicello

+ pedicellis Calycis foliola ovata acuta internis ~~pedicellis~~  
Corolla ovato conica extrus internis.  
fitameata fusca nigricantia plana compressa cancellata basi corolla  
inferta. Anthera lineares apice bifido laciniis subulatis flavo

~~Corolla~~  
Erit ex foliis oblongis acuminatis, floribus speciatim uno  
versus dispositis Catess. car. l. p. 71. t. 71.  
Andromeda racemi secundis nudis, corollis rotundo ovatis  
An. l. V. p. 407

confer: ~~fol. andr. arb. in Catess~~

29 Japonica Andromeda racemis paniculatis cylindricis bracteatis, foliis ellipticis re-  
flexis apice serratis Thunb. & bot. Zap. pag. 101. Tab. 22. \* B.V. p. 406.

Habitat in Japonia

arborescens Rami terni vel plures, solum bellati, striato angulo lati, glabri &  
cape foliorum nodulati erecti. Folia in ultimis ramulis frequentia, petiolata  
acuta, inferne attenuata, a medio ad apicem crenata, patentissima  
glabra bipollucaria. Racemi in apicibus ramulorum, alterni laxi  
digitales. Pedunculi glabri. Bractea subulata sparse pubes in pedicellis  
caerulis calycis lanceolata. Corolla subglandinea alba Thunb. l. c.



Character habitualis Andromedanum.

Caulis fruticosus Rami inferne Veritas superne Inqueti, si non Rami  
Pedunculique proposita Colum habet in Racemosis

Folia alterna brevissime petiolata, integra, simplicia sempervi-  
rentia vel decidua interdum serraturis minutis plerumque glabra  
Nipula, ne spinis nulla.

Floris, solitarii, fasciculati, Racemosi racemis plerumque  
secundis

Bractea in  
pedicellis pleris  
que

Calycinis lacinis adutis Corolla duplo vel triplo brevior  
Corolla globosa, ovato conica, cylindrica ore quinqueden-  
tato  
Anthera erecta filamentis capis parum supra basin, basi latioris  
versus apicem attenuata

*Andromeda populifolia*  
*Racemi axillares breves.*

*Andromeda norvegica* desdent La Martk

Number / 8350  
Museum  
P