

Andropogon

1. canicifolium A. spica solitaria imbricata, seminibus hispidis: aristis nudis
2. conditum A. spica solitaria, flosculis hinc masculis mutis inde foemineis longissimis crinito conditoque aristatis
3. crinitum A. spica solitaria hispida, aristis nudis geniculatis longissimis
4. brevifolium A. spicis lateralibus solitariis, flosculis alternis remotis aristatis, culmo geniculato-compresso.
5. divaricatum A. spica oblonga, floribus lanatis remotis divaricatis: aristis flo
pallidum
bulosa nuda
6. spicis racemosum A. spicis racemosis, flosculis basi vellosis.
7. saccharoides A. panicula ramis simplicibus, flosculis geminis, hermaphroditis
vto aristato sessili, altero mutico pedicellato tabescente, pedicellis ra
chisque ciliatis lanatis
8. gryllus A. panicula pedunculata simplicispermis trifloris: flosculo hermaphroditico
sessili aristato ciliato basi barbato.
9. nutans A. panicula nutante: aristis tortuosis lanatis, glumis & calycibus hispidis
10. ciliatum A. panicula carnea, calyce exteriori multifloro ciliato, aristis
conditis velosis.

11. serratum A. panicula laxa: flosculo altero sessili, altero pedicellato, pedicellis
 hirsutis
12. cotulifera A. panicula patula villosa, arista tortili nuda, pedicello uni sessili
 pateniformibus
13. cymbarium A. panicula spissa, bracteis cymbiformibus, floribus trans versis
 anfractis ternis.
14. squarrosum A. panicula conferta, glumis subulatis scabris
15. alopecuroides A. panicula laxa, flosculo utraque arista tortuosa.
16. pentuifidum A. spicis subsolitariis, glumis valvula altera pectusa.
17. distachyum A. spicis binis terminalibus, culmo indiviso, floribus gemi
 nis, glumis bifloris altera anfracta.
18. Eymbachne A. spicis conjugatis, valvula eodemque flosculi hermapro
 diti lineari inteni cymbiformi anfracta.
19. Schoenanthus A. panicula spicis conjugatis lineari, flosculis glabris
 geminis sessili anfracta, rachis pubescente
20. melocephum tenuiflorum A. panicula spicis conjugatis lineari, flosculis hirsutis
21. geminatum A. spicis conjugatis divaricatis flosculis glabris geminis basi
 barbatis

22. rognicum A. panicula spicis conjugatis, pedunculis simplicibus, rachis lanata,
flosculis muticis, masculo tabescente.
23. fastigiatum A. panicula spicis solitariis, pedunculis elongatis subsessatis, rachis
lanata, flosculis aristatis, masculo fertili.
24. bicorne A. panicula spicis conjugatis, pedunculis ramosis, rachis lanata,
flosculis aristis caduca, masculo tabescente.
25. luteum A. panicula spicis conjugatis, calycibus hispidis.
26. nardus A. panicula ramis supra decompertis prolixis.
27. prostratum A. pedunculis umbellatis quinque floris et alyculatis, flosculo
hermaphrodito aristato.
28. barbatum A. spicis digitatis, calycibus persistentibus, corollis ciliatis.
29. muticum A. spicis digitatis subternis: flosculis alternis sessilibus ^{muticis}
30. compressum A. spicis fasciculatis, flosculis basi barbatis altero aristato
culmo compresso.
31. sphonum A. spicis digitatis plurimis: flosculis sessilibus ^{aristatis} aristato muticoque
pedicellis lanatis.
32. annulatum A. spicis digitatis plurimis: flosculis obtusis sessilibus an-
statis, pedicellis muticis, gemulis barbatis.
33. acutum A. spicis fasciculatis quous hospitis, flosculis geminis om-
nibus aristatis.

pitofum. Andropogon

Habitat in America meridionali Br. v. Prodr. 64

culmi erecti ⁱⁿ cespitie penno columbino glabri teneri
altero lato ⁱⁿ conseriufi altero pedunculati nodosi
articulis per vaginis foliorum fere secti.

Totia graminea, ^{angustissima} scaberrima apice superne et inferne
pilis longis oculis armato villis copiosissimis brevibus adpre-
sa. Vaginae usque pilis longis albis hirsutissime
spica solitaria ~~pre~~ vix pedunculata solitaria singula
vagina.

Glomeruli duo ad basin spicae sessiles lanceolati attenuato
mutuo acuto, masculi, valiqui ^{ex juniori} vagini usque cetero
usque ⁱⁿ sessilibus hermaphroditi valvula ^{interior} pedunculata
geminis patentibus brevibus sexta tri pollicis antra for-
subsa interior antra fere. masculi utrinque pedi-
cellati lanceolati valvula alba antra sexta
longitudine gluma. Pedum raris et pedicelli pro-
hispit valvula glabra

diffusum Andropogon

Habitat in India orientali Retler

Culmus bipedalis et ultra, rigidus tenax, ramosus. Superne inter pedunculos
semiteres. Folia spithamea, linearia, glabra, ceteroq[ue] margine serrulata
glabra. Vaginae extus atrox et glabra. Panicula besquipedalis, ramosis sumis,

flavo ferruginea

mutand[is]: pedunculi aggregati ~~filo~~ [#] tenax et bingula vagina, inaequales; ramo
si, filo tenuiores: pedicelli ultimi solitarii. Bractea lineari lanceola
ta, vis pollicari, glabra horizontalis. Spicae p[er] geminae, a medio bractea

se duplo vel triplo breviores, triflorae altera per se sola altera brevissi
me pedicellata. Rachis bisuta. Flores [?] hermaphroditici solitarii in Bracula
spicis, duo masculi, basi hirsuti.

* lineares, angustae,
glabrae

Aristae nullae forte cadu
aeffinis Andr. cymbario, at omnibus partibus multo minor.

divaricatum a. spica oblonga, floribus lanatis remotis divaricatis :
anthera flexuosa nuda. An. 1. V
Lagurus humilis, panicula conica laxa natante culmum
terminante Gron. Verz. 135.
Habitat in Virginia

michi ignotum

muticum Andropogon.

Andropogon muticum; spicis digitatis subternis: flexulis alternis
sessili-muticis Lin. spec. pl. 1482.

Habitat in Cap. b. spici.

Culmi spithamasi, multi, sub pilosi etiam vaginæ et foliis.

Folia convoluta-subulata. Spicæ tres-quatuor, lineares, ut secundæ.
Pælytes acuti, virides; Petala contraria, tenera. Anthe nullæ Lin. l. c.

~~gemmae diu persistentes in pediculis muticis~~

Andropogon spici solitarius induratus, gemmae calycum striatis, flexilibus
gemmae

Stratum Andropogon spica Foltaria, glumis calycinis strictis, flosculis hermaphroditi
sessilibus aristatis, masculis pedicellatis aristatis

Habitat in India orientali Rottler &

Culmi inferae repentes, ramosi elongati, geniculi infrae, teretes,
nitidi. Solia Spithamea, bi. Rami plures ex singulis axillis. Solia
Spithamea, linearia, saepe attenuata, laevis, pallida in India, versus
basin puli rarioribus, Vagina teretes, striata, superne pilosa. Spica
terminali, bi- & tripollicariis, imbricata. Flosculi geminati. Rachis villosa
frequenter ad spem. Valvulae calycis floribus hermaphroditis in setam
nervoso striato, hermaphroditis laniatis, attenuatis, superne ciliatis, hermaphroditum
angustiores. Gluma cordata longitudine calycis hyalina,
apice ciliata, altera hermaphroditum in aristam tennem seman desi-
nens, altera arista; masculorum ambo mutica. Arista longa, totum
nuda ad basin semen. Stamina tria.

Gluma uniflor
res; univocal
ves.

juncus Andropogon

Habitat in insula Maria Galante Richard.

Radix junci. Pulmi plures pithamasi, filiformes, rigidi, simplices.
Folia convoluta, filiformia, altitudine pulmi, ~~et~~ ^{et} ~~puberula~~ glabra. Pae un-
culis superne, unus vel alter. Favo lucinum angustura, sesquipollis
re, attenuatum glabrum. Spica solitaria. Flores gemini; sessilibus linearis
of gluma calypina ^{est exterior} glabra, ore latis apice scabra; ~~arista~~ ^{arista} ~~vix~~ ^{vix} basi pilis
longi cincta; arista unguiculata; pedicellatus neuter; ^{mutuus} pedicello herma-
phrodito flore longiore, longitudinaliter hirsuto

~~perj. & et abest in Andra Onorthe.~~

~~foliata. F. foliis oblongis glabris, caulis filiformi caudicibus flumb. cap.~~

Linæus A. Spec. generum lanatis, calycium valvula altera acuminata, altera
truncata & indentata, petalo majore antherato Retz. off. 5. pag. 21
Habitat in India orientali

michi cognoscitur.

nifum

Andropogon

Habitat in India occidentali v. Probo.

ex superne Trigoni.

Culmi, erecti, striati, vaginis foliorum tecti; ^{canaliculati} solum involuta, tri-quadripollicaria, villosula: vaginae hirsutae. Anvolucrum spatheae, perispermium, hirsutum pollicare, apice ^{canaliculatum} involuto subulatum; erectum, flavescens ferrugineum, extus hirsutum, intus glabrum nitidum. Spica polita, involucrio brevior. Brachia glabra. Flores terni, inferne lanceolati; intermedia sessilibus, penum minor, valvulis calycinis in betam adnatis, operculis villosis; arista sesquipollicari, tota, flavescens villosa. Masculorum glumae calycinis fere unguiculares, in betam attenuatae purpurascetes, operculis pubescentes; pedicelli longitudine floris hermaphroditi, compressi, ciliati.

Corolla mixta

~~Cotulifenum A. panicula patula villosa, antha tortili nuda, pedicelli
inrasati pateriformibus Thunb fl. jap. p. 417. l. v. p. 903.~~

~~Habitat in Japonia~~

~~Culmus striatus glaber simpliciter articulatus crassitie digiti bipedali
folia vaginantis, fauce villosa, linearia, nec rasa, marginata, margini
senescente serrulata glabra pedalia. Panicula patula superindeion
posita, flosculis deciduis. Pedunculi capillares flexuosi. Pedicelli bene-
mi apice clavati, pateriformes. rachis flexuosa, dentibus villosis.
Calycis gluma lanceolata, acuminata, striata, villosa, scabra.
Antha tortilis, geniculata, nuda patens calyce duplo longior. Thunb~~

Stoerianus

Andropogon

Andropogon Stoerianus; vaginis villosis: ramis ramosis, elongatis, purpureis =
flentibus, in longam paniculam strictis: spicis simplicibus; floribus di-
stincte alternis, triandris; involuiculis brevis simis: flosculi a ditonia
rudimento neutro, aristato Mich. fl. bor. am. t. p. 57.

Habitat in aridis sylvanum Carolinae. Est herbario Richardi 2.

Culmi plures, bipedales et ultra, crassitie fere pennae columbae,
superne in pedunculos divisi. Folia carinata, semipedalia, carinata
exteriorum margine retrorsum scabra: vaginae compressae, carinatae
exteriori folia pilosa. Pedunculi plures, elongati, inaequales, terni,
pauci divisi. Anvolucrum nullum. Spica solitaria, sesquipollicari.
Pachis pilosa. Flores septem - duodecim parium remotiusculi,
geminati, lineares, laeves, basi pilis cinis. Antha hermaphrodito geni-
culata, vix semipollicari, flava, basi fusca: pedicellatus neuter multius-
pedicello hermaphrodito flore longiora, longitudinaliter piloso.

Sphaerocarpus Andropogon

Habitat in India orientali Rottler. 2

Sequitur ped. ater.

Pulmi basi repentes, inferne valde ramosi, articulis inferioribus infractis;
seor. Tota ca. Spithamea, carinata, basi supra raris pilosa: vaginae
ore barbatae, superne inter strias tuberculis minutis piliferis. Spica terminalis
longe pedunculata, bipollicaris. Rachidis articuli barbati. Flores gemini
facie fere Andr. distachya, lanceolati, basi villi cincti, sessilibus aristatis;
arista pollicaris, flavens, geniculata, flavescens, infra geniculum fusca,
glabra: pedicellatus minutus, valvula exteriora quinque nervi; pedi-
cellus compressus, apice ^{infra} ^{extus} sphaerocarpus, inferne villis, superne pilis lon-
gus ciliatus, apice transversus

† Cretorum glo-
bri

masculus femineo major longior latior

vellosum C. spicis digitatis, floribus anisotici seiphi pedunculatoq; calycis
culmoque velloso Herb. prod. pag. 20
Habitat in C. b. spei

non vidi

macrocarpa

Andropogon

Andropogon macrocarpa; vaginæ foliorum ad marginem valde inani parte
villosis: paniculis latantibus fasciculato-polytachyis in longam confectam
que paniculam constrictis: floribus monandris; arista quadrupla-quinapla
plo glumæ longitudine; valvis interioribus glabris Michx. fl. bor. am. 1.
p. 57.

Habitat in Carolina ad Blenheim, in humidis bosc.

Culmi alti, crassitie pennae anserinae. Folia carinata, superiora altiter
dine culmi: vaginæ compressae, ^{interne} ~~superne~~ maxime pilosis ^{partialiter} ~~glauco-~~
viridia. Panicula pedalis et ultra, contracta: pedunculi ^{partialiter} ~~capillares~~ [#]
vaginae ^{involucrum in} ~~spicæ~~ ^{pollicaris}, subulatum. Spicæ geminae, longitudi-
ne involucri; ^{pedicellares} ~~stachys~~ ^{stachys} ~~tricuspidata~~ ^{tricuspidata}, pilis albis longis hirsutis ^{stima}. Flores
geminii, circiter octo-parium, remotae, in lineares, parvae: hermaphroditi
valvulae, cari glabrae, carina virides ope lentis serrulatae; arista vix
semipollicaris, glabra: masculi decidui mutici, pedicelli flexuoso herma-
phrodito longiores, longitudinaliter pilosus.

#, glabra:

glabri, uti pedun-
culus communis

binatus Andropogon

Andropogon spec. binatum; spicis geminis lanatis, calycum valvula altera acuminata: altera truncata tridentata, petalo majore aristato Retz. obs. s. p. 21.

Habitat in India orientali Noisy

Palmi filiformes. Folia convoluta & tubulata, tri-quadripollicaria; vaginae longae, ore glabrae. Pedunculi a vaginae superioribus, elongati. Spicae geminae, una parum infra alteram, fere pollicares, tetelae, & villis densis flavis lanuginosi. Flores gemini: her ^{nanis} maphroditus aristatus; arista breviter vix semiungularis: masculi pedicellus incurvus, glaber, apice puberulo-lani excavatus.

nudans A. panicula nutante: antheris tortuosis lobatis, glumis calycinis
herpatis Lin. ~~trans. Spec. pl. pag. 1400~~

~~Andropogon folio superiore praethaiceo, pedunculis lateralibus oppositis
unifloris: antheris flexuosis Gron. voy. 133.~~

~~Habitat in Virginia, Jamaica.~~

~~Pedunculi nudi. Pedicella biflori. Flores ambo antherati, altero seiplo.~~
~~lin~~

^{ti}
Dispidiflorus

Andropogon

Penna lateralis spicis bifidis lateralibus solitariis. Bracteis clava
vid plumosis Walt. fl. Car. 59.

Andropogon dispidiflorum; vaginis foliorum glabellis: Culmis strictis
erectis; fere ab imo floriferis; spicis disparte lateralibus, varioribus
erectis: floribus monandris; aristis longa, recta; valvis interioribus
glabris Mich. fl. bor. am. 1. p. 57

Habitat a Carolina ad Londam

Culmi erecti, ramosi, folia convoluta, uti vaginis gla. Involucrum
lanceolatum subulato-attenuatum, spicis sesquipedalibus, exsertis
spicis geminis, sesquis bus in involucri. in petas, pedicellatae, lon-
gitudine involucri. Emergenti, sessiles, lineari lanceolatae, glabris basi
pilis cincti: valvulae ovatae, lente serrulatae.

Bracteis pilosa.

divaricatum Andropogon spica oblonga, floribus lanatis remotis divari-
catis, aristis flexuosa Lin. syst. Veg. +
Lajurus humilior, panicula conica laxa, pediculis Culmum
terminante Gron. Veg. 135.
Habitat in Virginia

perdufum Andropogon. specis solitarius, glumis valvula ~~perdufo~~ ~~et~~ perdufo.

Habitat in Andia orientali

Pedunculis superis et at illis supremis. Spica linearis solita
na, bipollicarij. ^{biparap-} rachis umbriata. Rachis pilosa. flos alter
flosilis astatu alter muticu. Valvula extenori linearis
versus apicem par perdufo. Vg. vaginæ bractea laterae interior
ferugineae

^{Sub}
Holcus perdufus specis digitatus, glumis valvula perdufo Lin Mart.
301. S. v. pag. 906

villosum

Andropogon species digitatis, calyce culmoque villosi Thunb. prodr.

20. +

Habitatio Cap. b. spei

Serratum a panicula laxa: flosculo altero sessili, altero pedicellato,
pedicello hirsuto Thunb. fl. jap. 41. T. V. p. 903

Habitat in Japonia
Calamus simplex ^{steris}, erectus, glaber, tripedalis. Folia venosa, glabra, ore
vaginarum hirsuta, ciliato-serrata. Panicula laxa ferruginea, spitha
mosa. Pedunculi erecti flexuosi, glabri, capillares. Flor alteri sessili
alter basi villosi; alter pedicellati; pedicello villosi ferrugineo
Calycis inferne nigri, pilosi; superne glabri. Antha contorta glabra
flore quadruplo longior decidua Thunb

non vidi

aciculatus Andropogon

gramen aciculatum Pumph. amb. 6. p. 144. t. 15. f. 1.

Andropogon aciculatus; panicula contracta, erecta, pedunculis trifloris, floribus masculis pedicellatis acuminatis; femineo sessile aristato Retz. obs. 5. p. 22.

Habitat in India orientali König &

Culmi pedales et ultra, basi radicantes, adscendentes, simpliciter, flavescens, tri-quadrarticulati. folia inferna plurima, tripollicaria, superiora breviora, linearia, obtusiuscula, margine scabrae glabra: vaginae inferiores ^{inferiorum} articulo longiores, compressi-

Pedunculi verticillati, capillares, simpliciter, et superiora utrinque linea villosa flavo. Flosculi minores quam in Andr. gryllo, subulati, basi villis flavescens, tibus cineti: masculi acuti, triandri

et pedicello longifloro hermaphrodito parum brevior: hermaphroditus breviter valvulis margine ope lentis denticulato, ciliatis aristatis: Arista major flosculo duplo longior, flava, ope lentis denticulata.

Selofus marginicarpus Flor. Peruv.

Empetrum pennatum La Mark.

Habitat in Brasilia et Peru dedit Gusper

nudans

Andropogon panicula nudans, glumae calycinis hirsutis, aristis tortuos
is laevibus. Lin. Spec: pl. 14 80 +

Andropogon foliis superiore spatulatis, pedunculis lateralibus oppositis
unifloris: aristis flexuosis Gron. voy. 133.

~~Pedunculis nudis. Flores gemini, ambo aristati Lin. l. c.~~

Habitat in Virginia, Jamaica

Pedunculis nudis: pedicelli biflori. Flores gemini, ambo aristati
Lin. l. c.

Erinaceum A. specia solitaria hirsuta, aristis nudis geniculatis longissimis
Thunb. fl. jap. pag. 40 ^{L. V. pag. 903.}
tab. 7.

~~Habitat in Japonia~~

~~Pulmoni formi ramosi glabri. Folia vix breviora etrospum
lobatis. Sagina superiora ciliata ramuli paniculae b. geniculatae
lobatis axillis barbati pedunculi et apice ramulorum filiformi
conulati. Specia longi pollicari glumis hirsuti calycis glabri
cauli villosi.~~

apice villosi

Sacharoides A. panicula ramis simplicibus; flosculis geminis, hermaphro
dito aristato sessili, altero mutico pedicellato tabescente, pedicellis
rachisque ciliatis lanatis Sw. prodr. pag. 26.
Habitat in Jamaica

Culmi glabri tenues vaginati, folia convoluta. Flores parvi basi et
rachide pilosi gluma glabra nitenti aristata brevis calyce parvo
longior
Culmus 2-3 pedali ardens simplex folia spithamea linearia lanata
lata striata erecta, scabruscula. gemmuli villosi. Panicula subita
aristata, spicae flosculi aeterni rachis adpressi siglumae ovato
lancoletae vel basi villosi villi albi longitudine valvularum
velae aristae valvulae quadruplo longis ovulo armato serratis.
Semen oblongum. pedicellus masculinum longitudine hermaphro
vel granum villosus. Valvulae lineares minutis & muc. Sw.
fl. Ind occid. 1. P. 205

ciliatus Andropogon

~~at~~ Andropogon ciliatum; panicula cernua, calyce exteriori multifloro
ciliato, aristis contortis villosis pilosis Thunb. fl. jap. 40.

Habitat in Japonia.

Caulis bipedalis, simplex, erectus. Folia longitudine culmi, pilis longis
sparsi imprimis prope genicula. Panicula longa. Involucrum
convolutum, basi ciliatum, acuminatum, floribus duplo longius,
glabrum. Flores mutici, ~~la~~ villae, lanuginem extra calycem fern
ginea Thunb. l. c.

herbarium A. panicula spicis conjugatis, calycibus hirsutis Loef. A. 1717 P. V

perg.

Setula juniceo folio, spica gemina Bauh. prod. 19. pin. 9.

theatr. 145.

*Gramen dactylon siculum, multiplici panicula, spicis ab eodem
exortu geminis* Pluk. alm. 175. v. 92. fig. 1.

Gramen dactylon spica gemina Scheuch. gram. 95.

Habitat in Europa australi et Barbana oriente.

Gramen bipedale caule ^{ulmo} simplici. Verti. lavi articulis ^{culmo nitido} uniter 5-7.

basi vaginatis. Folia angusta triquetra carinata supra canaliculata
margine scabru scula, ~~selena ad rad.~~ Pedunculi ex ax. illis superioribus

filiformi articulo unico. Vagina bractea vaginalis ad ax. geminam
cum longitudine spicarum. Spica gemina sequi pollicis.

Flores gemini ad singulum dentem, alter sessilis, alter pedicellatus ^{sessilis}
longis albis mollibus verti. hirs. anita torta basi ore lentis
vellosa

pedunculatus *Andropogon* *spicis solitariis*

Holcus pedunculatus; *spicis digitalis*, glumis valvula pedunculata Linn. mant 301.

Habitat in India orientali König

Rubri filiformes, inferne articulis in fractis, ^{ramosus} folia angusta, vaginæ parum
longiora. Pedunculi e vaginæ supremis, elongati. Spicæ solitariae,

vel geminae ~~quinguae~~, breviter pedicellatae, saepe sesquipollicares, lineae

~~longae~~. Rachis pilosa. Flores gemini hermaphroditi basi villosi, valvulis lineari-
^{acutis} nituis. hermaphroditi valvula exterior medio puncto impresso; [#]arista semi-
pollicari; masculinae valvulae absque puncto impresso.

Saepe colorata

Quamvis planta mea recedit a Linnæi specie paucioribus, punctoque
tantum excavato nec pedunculo differre tamen non credo, cum in reliquis
optime convenit. Si vero Linnæi ^{Holci pedunculatus} ~~specie~~ diversae, species tamen
Andropogoni nis erit, uti palam est ex tota descriptione Linnæi

Compressum
anæxi

And. culmo fissis subsæpiulatis flosculis basi barbati altero anfrato,
culmo compresso.

Habitat in Cap. b. pæi

Tæcis omnino And. ^{andecoratis} 4 phœmi et forte eadem, ff flosculi ma
jores majoris nitida, genicula ferruginea

in compressi ope lentis unina ciliatis

Cotuliferum Andropogon.

Andropogon cotuliferum; panicula patula villosa, aristis totili nudis, pediculis
latius crassatis pateniformibus Thurb. fl. jap. 41.

Habitat in Japonia

Culmus ^{hypodalis} simplex, teraspidie digitis, folia linearia pedalia, linearia, ^{nervosa,} marginata,
tenuis pime & erdulata, glabra. Panicula supradecomposita, patu-
la. Pedunculi capillares, flectuosi. Pedicelli brevis pime, apice clavati.
Rachis flectuosa, denticuli villosis. Calycis gluma lanceolata, ac-
uminata, striata, villosa, & labra. Arista totilis geniculata, nuda,
patens, calyce duplo longior Thurb. l. c.

H. V. a. quina ore
villosae

Phragmites A spicis digitatis plurimis flosculis sesquibus anfractis muticis aequis,
pedicellis lanatis Lin. Spec. pl. p. 1483. Mart 500 Jacq. fl. Austr. 4. 7. 384
Schreb. gram. 2. p. 66. 4. 33.

Gramen Pluf. pl. var. pag. 498.

gramen dactylon spicis villosis Baur. per O. theat. 116. Schenck
gram. 94.

Gramen dactylon spicis anfractis geniculatis Barr. u. 753. 7. 2.

Habitatio Europa australis andis, collibus saxosis.

Caumi bipedales. Venuis superne altero latere excavati glabri.

Folia venosa spicis plures circiter novem pedunculata.

lineares a ped. bi-pollicares: pedunculi gemini ad ^{anfractu} ~~angulum~~
oppositi conferti (nec digitata) flos alter flosculus alter pedicella
vis muticis lanceolati. rachis villosa.

Serratus Andropogon

Andropogon serratum; panicula laxa: flosculo altero sessili, altero pedicellato,
pedicellis hirsutis Thunb. fl. jap. 41.

Habitat in Japonia

Culmus tripedalis, simplex, erectus. Folia glabra, ciliato serrata: vaginæ ore
hirsutæ. Panicula laxa, spithæ longa, ferruginea. Pedunculi erecti, flexuo-
si, glabri, capillares: pedicelli ferrugineo-villosi. Flores gemini. Calyces
inferne glabri nigri, pubescentes, superne glabri. Arista contorta, glabra,
flores quadruplo longior, decidua Thunb. l. c.

virgineum a. panicula spicis conjugatis, pedunculis simplicibus, rachis lanata,
florescens mutua masculo habescente
Gramen dactyloctenone tomentosum minus Sloan herbar. 1. p. 110.
f. 60. fig. 2.

Andropogon panicula spicis conjugatis, pedunculis medio villosis,
spicis lana brevioribus. Royen-herbar. 534 Gron Virg. 132.

Habitat in Virginia. Sub Royeni
Culmus superne subtomentosus. Panicula contracta, spithamea - pili albi
longi hispidespina. Florescens lanedolati attenuati gemini, alter sessilis - An-
to longo, foetile. Pedunculi, rachis platanis

contortum Andropogon

Gramen secalinum indicum, spica gracili tomentosa: longioribus
aristis ad se invicem intortis Plukn. alm. 173. t. 191. f. 5. Moiss.
hist. 3. p. 100. b. 8. t. 4. f. ult.

Aegilops Maderazpatana, glumis pilosis aristatis Schenck. gram.
92.

Andropogon contortum; spica solitaria, floribus inferioribus masculis
Lan. Spec: pl. 1400. Allion. fl. ped.

Andropogon contortum; spica solitaria, flosculis hinc masculis mu-
tici inde foemineis longis simis unito contortoque aristatis Lan.

Suppl. 422.

et occidentali

Habitat in India orientali, Pedemonti &

Sulmi pes qui pedales, erecti, juncti, camosi. Solia vaginis parum
longiora, glabra, margine scabriscula: vaginæ longae, com pres-
sae. Pedunculi axillares, solitarii, elongati, filiformes, solis an-
gustissimis vaginante stipati. Spica bipollicaris: flores infimae et

Cuticulis quam hermaproditis

† acta altero latere masculi sessilis, mutici; valvulis lanceolatis, apicem versus praetegla
te gla pedina prope marginem manib. tuberculis piliferis muciculis; altero latere
briom hermaproditis sessilis; arista spica ipsa longior, erecta fusca, basi pilosa
Rachis

Ischaemum Andropogon.

gramen Clus.

Gramen dactylon specis illius Bauh. theatr. 116. Scheuchz. gram. 94.

Gramen dacty ~~lon~~ Andropogon *Ischaemum*; specis digitatis plurimas, flosculus per
lon specis arista ~~lon~~ gilibus aristato medicinae den. spei. pl. 1483. Mant. 500.
Ar. geniculatus. Schreb. gram. 2. p. 66. t. 33. Faicu. fl. austr. 4. t. 384.

Barr. ic. 753. f.

2.

Habitat in Europae australioris ardis, collibus p. arosis &
Cap. 6. spei 2
Culmi bipedales, tenues, panum ramosi, superne altero latere
excavati, glabri. Folia angustissima #. Spica sope novem, pedicel
latae, 1/2 pollicares, lineares, oppositae, nec ex eodem centro. Flores
lineari-lanceolati, compressi, glabri: valvulae ope latius can
na dilicata; sessilis arista glabra; pedicellata mitica. Rachis
hirsuta

#: vaginae com
pressa.

Specimen quoddam Capite 6. spei habui vix differre videtur
nisi culmo simpliciter, foliis panum latioribus et floribus
panum majoribus

virginicum Andropogon.

^{bidone}
Gramen dactylon tomentosum minus Swan. cat. hist. 1. p. 110. t. 69.
f. 2.

Andropogon paniculae spicis conjugatis, pedunculis medio villosis,
spicis lana brevioribus Gron. v. 132. Royen. Lugd. 53. Gron. v. 132.

Andropogon virginicum; paniculae spicis conjugatis, pedunculis
simplicibus, rachis lanata, fasciculis multioribus; masculo tabescente.
Lin. Syst. veg. 945

Habitat in Virginia. Est herbario Royeni 4

Culmus altitudine hominis, ramosus: Panniculus e singula vagina.

Pedunculi gemini, filiformes. v. Royen. l. c.

Culmus superne subtomentosus. Panicula contracta, spithamea,
e pilis albis longis hirsutissima. Pedunculi pariales solitarii. Flores
lanicolati, atheruati: sessilibus aristis longa, tortilibus.

hirsutus

Andropogon

Disticha juncea folio. Spica gemina Bauh. theatr. 145. prod. 145

Gramen Dactylon Siculum, multiplici panicula, & pennis ab eodem autor
tu geminis Pluh. alm. 175. t. 92. f. 1.

Gramen Dactylon Spica gemina Scheuchz. gram. 95

Andropogon hirsutus; spica conjugata, calycibus hirsutis Loef. d. 171.

Habitat in Europa australi, Barbaria, Oriente

Palmi bipedales, erecti, simpliciter, teretes, laeves, nitidi, quinque-
septem angulati, basi vaginis foliorum vestiti. Folia angusta, carina-
ta, ex culmo breviora, margine scabriuscula, glauco-virentia.

Peduncululi e vaginis superioribus, saepe plerumque gemini, alter
longior, petalacei filiformes, superne uncinulati. Bractea vaginalis

ad geminum peduncululi, longitudine spicarum. Spicae pollicares
et ultra, sessiles. Flores gemini, ^{luteo-rosei, gemini uncinulati} pediculis longis albidis mollibus hirsutis: peris-
tis aristata; aristata contorta, inferne villosa, pedicellatus mucosus
rachis hirsutus.

Compressi

Andropogon erinurus; spica solitaria hirsuta, aristis nudis geniculatis longis
primis Thunb. fl. jap. 40. t. 7.

Saccharum panicum; floribus spicatis aristatis, culmo ramo so polysta-
chys Lamarck. illustr. t. p. 155. t. 40 f. 3.

Habitat in Japonia, India orientali Java, insulae Borbonicae

Rami genic-
lis et axillis
bibratis
Culmi plures, ramosi, per 9 pithamae - pedales filiformes, virgati,
glabri, ^{pauci} flavescentes, nitidi. # ^{pauci} folia vaginis breviora, linearia, glabra, retor-
sum scabruscula: vaginae paperae. Pedunculi ex apice ramulorum,
capillares. Spica pollicari, # ^{res} floruli ^{res} duo ^{res} an? an? solitarii? an duo
ambo sessiles aristatae. Calu glumae bivalves lineares, ^{glabra} apice villosae
Arista flavescentis longitudine fere ipsius spicae. Rachis hirsuta.

imbricata

Castus Andropogon

Habitat in India orientali Rottler 24

Culmi prostrati, sesquipedales inferne radicantes, sesquipedales, basi ramosi, multi articulati: rami longitudine culmi, flo inferne vaginis foliorum vestiti, flavescens, nitidi, superne compressiusculi. Folia frequentia, pro sesquipedalia, linearia, acuta, glabra, margine scabra: vaginæ foliis breviores, compressæ. ~~Panicula~~ Panicula patens; pedunculi verticillati, uniflori capillares, Pili fulvi ad basin flosculorum; mascula breviter pedicellati aristati: hermaphroditi valvula altera dorso ciliis ferrugineis, ceterum glabris, laevibus. Aristae duae, altera brevior recta; longior geniculata, infra geniculum fusca et villosa

prostratum a. pedunculis umbellato- quinquefloris ecalyculatis; flosculo
hermaphrodito aristato Lin. Man. 304. t. V. p. 904.

Habitat in India orientali

Radix multi, ^{et ultra} pedales, ramosi ^{multi, articulati, geniculati} ^{glabro} ^{laevi, prostrati,}
radicans. Solum ^{plura} alterna, ^{laeva} ^{marginata} ^{fiava}

inferne
infusidi

vaginae ^{super} ^{longiora}; ^{se} ^{que} ^{pollinaria}. ^{lagina} ^{compressa}
foliis ^{inter nodis} ^{brevis} ^{latiores}. ^{pedunculis} ^{filiiformis} ^{et} ^{alis} ^{ultimis}

rami ^{pupera} ^{ramo}
comp. ^{superiori}

foliorum ^{ramorum} ^{apice} ^{busque}, ^{terminatis} ^{umbella}
multiflora, ^{parva} ^{quinque} ^{flora}. ^{Calyx} ^{communis} ^{nullus}.
sed ^{epi} ^{lo} ^{ca} ^{barba} ^{brevis}. ^{flosculi} ^{centralis} ^{umbello} ^{her}

folio breviorer

maphroditi ^{gluma} ^{bivalvis} ^{oblonga}, ^{arista} ^{contorta}

tripl ^m ⁱⁿ ⁵⁰
flosculi ^{masculi} ^{quam}

longiore. ^{masculi} ^{et} ^{flosculi}, ^{simillimi}, ^{muti}; ^{pedicella}
^{inferiores} ^{basim} ^{hermaphrodit.} ^{pedicellis} ^{longioribus}

peni ^{duo} ^{longius} ^{pedicellati}
ram ^{ne} ^{mediis} ^{valvula}

ne ^{flosculi} ^{hermaphrodit.} ^{flosculi} ^{laterales} ^{umbel}
lo ⁴ ^{aequalis} ^{pedicellati}; ^{masculi} ^{gluma} ^{exterior}

calycis ^{nervoso} ^{striatae}
tn

strata ^{glabra}, ^{ultrata}

canicosus Andropogon spica solitaria hirsuta imbricata hirsuta, aristis nudis

dis contortis

Græver. canicosum Rumph. emb. 6. p. 17. t. 7. f. 2. a ?

Andropogon canicosum; spica solitaria imbricata, seminibus hirsutis, aristis nudis contortis des. spec. pl. 1480.

Habitat in India orientali

Culmi filiformes, geniculis infractis, glabri. Folia vaginis breviora, angustioribus
pilis raris adspersa. Spica bipollicaris. Flores gemine sessilibus et
pedicellatis aristati: valvulae lineares, truncatae. Arista flore
triplo longiore, geniculata

Synonymum Rumphii dubium mihi videtur, a Loureiro ad Saccharum
speciatum amandatur, ab illud vero omnino discrepat.

prostratus } Andropogon

Andropogon prostratus; pedunculis umbellato quinquefloris et alyculatis,
flosculo hermaphrodito aristato Lin. mant. 304. Syst. veg.

Habitat in India orientali König &

Culmi plurimi, pedales ultra, prostrati, ramosissimi, multiaarticulati: gemiculi
inferioribus infractis, radicanibus: Gram. filiformes, compressiusculi

internodiis bre-
vioribus

Folia plura frequentia, sesqui pollicana, margine & abro, glabra: vaginae
longitudine foliorum fere foliorum, compressae, folio latiores, compressae.

Barba brevis, albida.

Pedunculi ex vaginis foliorum superiorum & apice, plures, ^{capillares} folio breviores,
tuis. Calycis glumae nervoso-striatae, acutiusculae ^{capillares} oblongae, masculi linearis

Barba brevis,
albida

tello flosculis flosculo hermaphrodito brevioribus: Glumae calycis glumae
mae masculorum, acutae, nervoso-striatae; ^{mutae} superne Corolla corollae valvula
exteriori superne ciliata: foemineorum lanceolata, laevi flavescens. Arista
torta, flosculo triplo longior, & ciliata, fusca

gryllus A. panicula pedunculata simplicissima triflora: flosculo her-
maphrodito sessili anfrato ciliato basi barbato Lin. Am. ac. 4.

pag. 332 +

Oxylops bromoides, uba purpurascens Bauh. hist. 2. p. 436.

Scheuchz. gram. 267.

Gramen sparteanum festucum s. *Oxylops spartea villosa* Barr. u. 10.

ses. 2.

Habitat in Helvetia: Verona, Monipeli & ^{geniculo infimo infra,} ^{rare piloso.}

Culmi plures ^{aggregati} simplicissimi pedales glabri ^{triflori} binodes. Folia plurima, radi-
culea, ^{sub mb brevis} ^{in ultimo, angusta, villosa.} flosculi absque calyce ^{communis}
subulati, vix unguiculati, lori glabri nudi. Antha basi geniculata
infra geniculum villosa.

Cona helvola

Pedunculi sub verticillati, ~~sub~~ simplices, infimi interdum ^{cor.} inis vel
altior ex infimis bifidus capillares. ~~Flor~~ pilosi. valvula hermaphro-

ad basi-
valvulae calycis laevis
retulae ambal onistata.

diti ~~major~~ flavens, dorso margine que ^{interdum. Eandem} ^{marginem} ^{subulato} tuberculis ⁱⁿ ^{pede}
hyalinum ^{laevius} pilosum, valvulae masculin. rare pilis

antha flosculo

duplo longior, ^{laevior} pedicelli masculin. ~~foeminae~~ ~~hermaphro~~ flore duplo brevior.

genicula infra geniculum villosa

34. polydactylon A. fructus saffordensis