

Androsace

1. maxima A. perianthii fructum maximo, ¹umbella involucri ²equante, involucri longitudine pedicel
longior
2. Lytharibus A. foliis lanceolatis dentatis, ^{ovatis}perianthiis glabris, involucri um
belle involucri longiore, corollis calyce longioribus
natis
3. elongata A. foliis subdentatis, pedicellis longioribus, corollis calyce
aequalibus
4. obtusifolia A. foliis lanceolatis obtusis integerrimis villosis, perianthiis
sub
angulatis corolla brevioribus glabris
5. villosa A. foliis linearibus subincurvatis obtusis pilosis perianthiis his
sub
ulatis
6. tomentosa A. tomentosa - hispida, incurva, foliis linearibus lanceolatis acutis
7. lactea A. foliis subulatis propeque glabris, umbella involucri
multo brevior longiore
8. carnea A. foliis subulatis ciliatis, scopis villosis, umbella involucri
multo brevior longiore

2-3. filiformis a foliis ovatis dentatis petiolatis; corollis calycem exte-
rioribus
odorata a.

Spathulata Androsacea

Habitat in montibus circa Peking herb. Nicotit. apud Fus/

Folia radicalia, spathulata: lamina ovata ut semper angulata, profunde
ferrata, oculo armato pilifera. Scapi sesqui pollicares, filiformes villosi
incani. Umbella terminalis, simplex. Rami ^{stipulae} capillares, canescentes, uti caly-
ces. Involucrum brevissimum, uti calycis foliola ovata

Filiiformis *Cladropis*

Habitat in alpebus altioribus herb. Ventenat.

Folia radicalia, petiolata, semiconiugulosa, ovata, basi acuminate, acuta, glabra, utraque dentibus 2-3. Scapi plures, filiiformes, digitales. Involucrum plura minuta. Umbellae simplicis, radii circiter 8, collicis. Flores parvi. Calycis laciniis ovatis

odoratissima Cl. foliis Inquet non ciliatis, perianthis hispatis Schreb. Dec: 1.V.4
Habitat

non vid.

brevisfolia a foliis lanceolatis petiolatis hispida, pedunculis involucrio
quadriplo longioribus Vill. fl. Delph. 2. p. 426 8-15
Habitat in Delyphnate

non vidi

1 maxima A. penanthus fructuum maximis Linn. S.V.

Gaius fl. aust. vol.

4. T. 331.

Androsace altera Lam. epit. 639. Pluf. bot. 2. p. 134.

alpine affinis Androsace dicta major Bauh. pin. 251.

Habitat inter Austriam legetes ☉

Stem radicalia lanicolata, basi attenuata sesquipollicaria dentata
nervosa, pilis raris adpressis. Stipulae digitales vel palmari inter
dum pilis brevissimis villosa. umbella 6. 8 flora; pedicellis villosis
unguiculatis. Protheca foliola cuneata, remote dentata longitu-
dine pedicellorum. Calicis ovata acuta basi villosa super-
ne raris pilis saepe subdentata

involucris longitudine pedicellorum

2 *Septentrionalis* A foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthis angulatis corolla brevioribus.
Fl. Dan. tab. 7 Gmel. pb. 4. t. 43.

Alpine verna androsæcis Caputulis Bauh. prod. 110. p. 251.

Alpine minor, androsæcis alterius facie Bauh. prod. 110. p. 251.

Alpine adfensis Androsæcis dicta minor Bauh. p. 251.

Androsæcis montana, flore minore Buxb. det. 2. p. 369. t. 23. fig. 2.

Habitat in alpium Lapponia, Russe apud Glasofis O

Folia in rosam expansa unguiculata vix villosa remote dentata
scapi teretes digitales vel palmares. Pedicelli plures et pollicares
inaequales filiformes. Calyx glaber involutum folioli brevissimi
lanceolatis

3 Elongata a foliis subdentatis pedicellis longissimis, corollis calyce brevioribus. Linn.
R.V. p. 192. Gmel. fib. 4. 744. 744. Galqu. fl. austr. v. 4. 7330.

Habitat in Sibiria austriaca

foliis lanceolata plerumque integerrima rarius dente uno vel
altero, glabra pollicaria. Scapi plures filiformes acuti
vix villosi. ^{scapales} Pedicelli elongati capillares, sesquipedales
inæquales, pubescentes. foliola involucri linearia. calycis
vetroculo armato subvillosi. Corollis subulatis
umbello interdum prolepta

Androsace elongata foliis lanceolatis dentatis, umbella florifera
elongata, corollis calyce angulato brevioribus Petr.
obj. 2. p. 10. *

subdentatis

culta

2-3 filiformis A. foliis ovatis dentatis, petiolatis; corollis calycem excedenti-
bus

Androsace eadem (septentrionalis) foliis rotundioribus petiolatis

Gmel. Sib. 4. p. 81. T. 44. fig. 4

Androsace filiformis foliis ovatis dentatis petiolatis, umbella
mediis capillaribus; corollis calycem campanulatum exce-
dentibus Retz. obs. 2. p. 10.

Folia glauca - Scap. 2-4. fruct. filiformis. foliola involucri
filiformis brevissimi. umbella 6-16 flora radiis inaequalibus
Calyx pentagonus. lacinae corollae integerrimae

4 *obtusifolia* A. foliis lanceolatis obtusi ^{subulatis} angulatis, nervis ^{subulatis} pennatis
angulatis calyce longioribus
Arctia foliis ellipticis lanceolatis glabris, scapis umbellatis Hall.
herb. n. 621.

Androsace obtusifolia All. fl. pedem. Tab. 46. fig. 1

Habitat in alpibus helvetiae &

Folia unguiculata basi attenuata, triplo latiora quam in A.

caulibus, copiosa, anervia. Scapi plures erecti digitales ^{**} subulati

ut i pedicelli & calycis si. flori unicus 2-3. 4. 5 in umbella. pedicelli involucri subulati
lato dimidio longiores erecti. Calycis vellosi laciniis subulatis
4

punctata ^{glaberrima}
A. foliis linear-lanceolatis ^{integerrimis} glaberrimis, calycibus umbella-
tis angulatis corolla brevioribus
an Androsace brevifolia Vill.?

Habitat in Bellandi

affinis obtusifolia allionii et non villosa pubescens. ^{infructibus} pediculis
umbello 3-6 nervis

β Carnea A. foliis subulatis glabris, umbella involucria equante. Lin. L. V. p. all. fl. Ped
Hab. 9. fig. 2.

β Sedum alpinum angustifolium flore folio flore carneo Bauh. pin. 204.

Sedum alpinum eisdem Colum. cypr. 2. p. 64. t. 65. fig. 2.

Tanicula alpina angustifolium folio Plukh. alm. 332. t. 108. fig. 5.

β. Arctica foliis ciliatis linearibus, floribus umbellatis Hall.

Habitat in alpebus pyrenaeis, Helvetiis &

Arctia foliis crassis rugosis, gramineis, scapo multifloro Hall. bot.
n. 619. t. 17.

Folia radicea ~~in ramis~~ aggregata, coriacea, vix pollicaria, plana
ciliata denticulata sicut ut in Draba arctica, flexilia Tenore. Sape
folia ^{opaca} plurima. Scapus teres digitalis. Flores cincti quinque
involucri foliola lanceolata longitudine pedicellorum
pubescentium. Calycis foliola ~~lobata~~ lanceolata longitudine
capsula

Carnea A.

te

ciliatis, scapo villosa, involucrio radii umbella equan

7
Cactea A. foliis lanceolatis glabris, umbella involucri multothes longiore L. V. p.

7. dequ. fl. austr. v. 4. p. 333

Sedum minus XI. Plaf. hist. 2. p. 61.

Sedum alpinum germanico L. folio flore Cacteo Bauh. hist. pin. 204.

~~Cactea glabra obtusifolia umbellifera Otton. pedem. 1. p. 22. t. 4.~~

~~fig. 2~~
Habitat in austris alpebus 7

Planta cespitosa, ^{2. in foliis vel ultra} rari folia rigidiora quam in carneosa glabra
margine parum revoluta. Scapi ^{brevis} seseter. pedunculati 1-3. in umbel
la bipolli cavi. foliola involucri lanceolata. Calycis gla
bri laciniis ovatis

obiter nini

Cactea foliis subulatis glabri - scapo glabro

5-villofa A foliis pilosis perianthiis hirsutis in l. v. Paeyu fl. austr. v. 4. p. 332.

Collect. 1. p. 193. Tab. 12. fig. 3

Sedum minus Delinum alpinum l. v. Pluf. hist. 2. p. 62.

Sedum alpinum hirsutum, Lactes flore Bauh. pin. 204.

Habitat in alpebus Rhodici, pyrenaeis, Carnolicis &

Folia in rofam expansa lineari cuneata unguiculata vel minor
pilosa v. v. Scapus digitalis hirsutus uti calycis umbella 5-8
floru Pedicelli ⁴⁻⁶ capillares involucrio dimidio longiore. foliola involu-
crii obtusa, linearia. Petala emarginata calycis laciniis obtusa

villofa foliis lineari subcuneatis obtusis pilosis, perianthiis hirsutis corolla
terioribus

incana A. pelop-incana, foliis lanceolatis minimis sericeo glo
merato-cespitosi: pedicellis in volucribus Congonibus La Mark
pag 432.

Ab Androsace Gmelin sub. 4. p. 81. n. 27.

Habitat in Sibiria

non vidi