

Andryala

1. ^{lanata} ~~integrifolia~~ A. foliis oblongo-ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis
2. latifolia A. foliis inferioribus obovatis caulinis et leptis pentatis ^{caule} ramosis
3. rugifera A. foliis lanceolatis indivisi denticulatis ^{solitariis} tumentosis, floribus
4. ^{solitariis} integrifolia A. foliis inferioribus uncinatis, superioribus ovato-oblongis tumentosis
5. Clusii A. suffruticosa, foliis lanceolato-oblongis serrato-dentatis, floribus
6. ^{solitariis} cheiranthifolia A. foliis uncinatis, summis lanceolatis integris, vello glandulifero
7. anthemifolia A. foliis pinnatis linearibus tumentosis
8. pinnatifida A. foliis pinnatifidis tumentosis, calycibus tumentosis pilosis: pili rigidifolii

Canata A. foliis oblongo ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis
her. Am. Acad. 4. p. 200. S. C. p. 770

Thermium montanum tomentosum Dill. Elth. 101. t. 150. fig. 100. Miller
40. 97. 7. 146. fig. 1.

Habitat in Europa australi

Caulis erectus ramifus utriusque tota planta lanata tomentosa
unicolora. Folia radicalia petiolata elliptica basi in petio-
lum deponentia remote paucis dentata: caulina sessilia
foliolum lanceolatum sub pedunculis. foliola calycis
linearia. —

Catifolia A. caule ramoso foliis inferioribus obovatis caulinis ellipticis
dentatis

Habitat in Barbano cultis

Caulis erectus pedalis basi ~~lyngosus~~ simplex superne ramosus
erectus lanato tomentosus. Folia radicalia suprapetiolata
palmata inferne sinuato dentata extropium integerrima
sequentia nonnulla similia ad sesilia, superiora elliptica
summa lanceolata, ^{caulis longioribus} floralia ultimae integerrima
Pedunculi ramosi uti calycis valde lanati. Flores magnitud.
andryala lanato.

ragulina A. foliis lanceolatis indivisi denticulatis acutis tomentosis, floribus ^{positivis} ~~pubescentibus~~
Lin. Spec. pl. pag. 1136 & S. V. p. 720

Heracium incanum lanuginosum ragulinum pilosella flore Herm
Lugd. 672. & 673. Mill. 90. 97. & 146. fig. 2.

Habitat in Insulis Antipelagi 4

Stola fructura acutiora, acutius dentata quam in reliquis
superiora lanceolata integerrima Pedunculi & illarum uniflori
folio duplo longiore

integrifolia a foliis inferioribus mucronatis superioribus ovato-oblongis tomento
suis lineis l. v

Sonchus lanatus Dalech. hist. 1116.

Sonchus villosus luteus major Bauh. pin. 124.

pinuata β . Sonchus villosus luteus minor Bauh. pin. 61. pin 124

Andryala pinuata foliis mucronatis Lin. spec. pl. p. 1137

Habitat in Hispania, Gallia, Sicilia, Barbaria

α) foliis ^{remota & ciliata} lanceolata inferiora ~~obovata~~ ^{scapulae infera} latiora basi in petiolum
attenuata subpinuata Calyx uti pedunculis pilis apice glandu
lofi

Clusii *Q. suffruticosa* tomento foliis lanceolatis oblongis sinuato dentatis
floribus solitariis.

Chondrilla prior Deocondis Clus. hist. pag. • Dalech. hist. herb.

Chondrilla foliis cichorei tomentosis Dalech. pin. p. 130

Habitat passim in Hispania

Caules pedales erecti; ramosi mollesque viridissimi uti tota planta
Folia inferiora petiolata, ^{obtusiuscula microgona} superiora sessilia acuminata omnia
dentato sinuata dentibus utriusque 3. 5 obtusiusculis sub pedun-
culi ultimi setatis. Calyx minimus pili glandulosis adpressis

Synonyma huius minus recte a Tournefort a Jouan. et Gerardo
ad Tragopogon Dalech. referuntur dicit Tournefort et Magnolius
† ab ipso enim Dalech. Clus. et Bauh. pro recte pro diversis
habitu

Cheranthifolia A. foliis multinatis; summis lanceolatis integris, villo glandulifero

Hort. Kew. 3. p. 129. Hort. Prop. p. 35. t. 18.

Andryala glandulosa La Mart. Encyclop. 1. p. 154

Andryala tomentosa Scop. del. Inf. 2. p. 12. tab. 6

Habitat in Madera 4

Caulis utriusque folia superiora adpressis pilis longis conopsea apice glandulosa
lanato tomentosa. Folia radicalia pennatifida, caeteris alternis
linearibus integerrimis obtusis; ^{implete tomentosa} superiora caulis et floralia integra
ovato lanceolata acuminata

folia inferiora sinuata subpennatifida herb. 4us

Cithmifolia A foliis pinnatis linearibus tomentosis Hort. Kew. 3. p. 129

Habitat in Madaga ♂

pinnatifida A. foliis tomentosis pinnatifidis, calycibus tomentosis pelosis: pilis rigidi:
in Sculis Hort. kew. 3. p. 124

a.) foliis pinnatifidis: Pinnis distantibus dentatis

15. foliis profunde pinnatifidis: pinnis brevibus integris

Habitat a in Madeira β. in Canariis & Tuneti

Caulis erectus simplex superne ramis nonnullis glomeris, tomentosus
molliter tomentosus ubi tota planta ^{pedalis}. folia inferna petiolata ses-
silia pinnatifida summo sub flo pedunculis parvulis indivi-
sa lineari lanceolata. Calicibus alternis linearibus dentatis vel
integerrime obtusis inaequalibus superiorum acutiora Pedunculi
ramosi. Calycibus tomentosis inter tomentum pilis nigricantibus prostratis
glandulosis