

# Anemone

x Hepatica, flore subcylindrico

1. hepatica A. foliis trilobis integerrimis

xx Pulsatilla pedunculo involuato,

2. patens A. <sup>seminibus caudatis</sup> foliis <sup>radicalibus ternatis</sup> digitatis <sup>multifidis</sup> <sup>foliolis bipartitis laciniis dissectis</sup>

3. Halleri A. foliis pennatis <sup>involucro multifido</sup> triplicatis <sup>laciniis linearibus</sup> subtrifidis <sup>laciniis linearibus</sup> Caucasiensis involucri multifido laciniis

4. sulphurea A. foliis <sup>radicalibus ternatis</sup> triplicatis <sup>foliolis bipennatis</sup> pennatis <sup>involucro multifido</sup> pennatis <sup>laciniis linearibus</sup> floribus subovatis, involucri multifido

7 ~~Baldensis~~ A. foliis <sup>radicalibus ternatis</sup> biternatis, <sup>intermedio subternato</sup> intermedio <sup>junioribus subternatis</sup> subternatis, <sup>junioribus subternatis</sup> junioribus <sup>subternatis</sup> subternatis

5 ~~Baldensis~~ A. foliis <sup>radicalibus ternatis</sup> radicalibus, pennatis, ternatisque Corollis pentapetalis erectis, involucri multifido laciniis linearibus

6 ~~Baldensis~~ A. foliis pennatis, flore cernuo

7 ~~Baldensis~~ A. foliis bipennatis, petalis rectis flore erecto petalis rectis

8. patens A. foliis bipennatis, flore cernuo, petalis apice re flexis

9. baldensis A. foliis biternatis, intermedio subternato, junioribus subternatis, flore suborto petalo

biflorum veloratum cum ante edent inna <sup>supra</sup> vel  
10. alpina A. foliis caulibus ternis connatis <sup>supra</sup> decompofiti multipidis, feminebus

herpatis <sup>collocantur prope</sup>  
11. apifolia A. foliis caulibus ternis connatis <sup>supra</sup> decompofiti multipidis ternis  
mi

xxx Anemones, caule foliofo, feminebus <sup>caudatis</sup>.

12. coronaria A. foliis radicalibus ternatis multipartitis incisifi, involucrio foliofo  
13. hortensis A. foliis ternatis tripartitis, involucrio foliolis lanceolatis indivi

his trifidis que.  
14. palmata A. foliis cordatis sublobatis, involucrio triphyllis basi connatis trifidis

xxxx Anemoneideo, flore nudo, feminebus <sup>caudatis</sup>

15. fibinea A. caule unigloro, involucrio foliofo <sup>caulibus</sup> ob tripartito obtuso  
16. sylvestris A. pedunculo ~~trifloro~~ <sup>trifloro</sup> foliolis <sup>caulibus</sup> petiolatis tripartitis bifidis  
~~pedunculo trifloro~~ <sup>connatis</sup> incisifi, feminebus subrotundis herpatis mutuis

17. fragifera A. foliorum laciniis acutis lanceolatis feminebus subrotundis

<sup>bas herpatis</sup>  
18. virginiana A. pedunculo a ternis longissimis fructibus cylindricis, femini

19. pennsylvanica A. caule <sup>bas herpatis</sup> dichotomo, foliis sessilibus amplexicaulis  
inferius ternis trifidis incisifi, feminebus glabris



20. Dichotoma A. caule dichotomo, foliis pinnatis omnibus oppositi am-  
plexicaulis trifidis incis, seminibus globosis

21. Decapetala caule uniflora, flore decapetala, foliis ternatis lobatis  
radicalibus.

22. tritemata A. foliis ternatis foliolis cuneatis <sup>pub</sup> incis, caulibus multi-  
fidis

23. subbiflora A. foliis ternatis bipartitis multifidis, caulibus ternatis  
non fraxiferam trifidis, caule subbifloro

24. trifolia A. foliis ternatis ovatis integris serratis, caule unifloro

25. quinquefolia A. foliis quinatis ovatis serratis, caule unifloro

26. nemorosa A. foliis ternatis, foliolis lanceolatis serratis incis, <sup>acutis</sup>  
petalis oblongis

27. apennina A. foliis ternatis foliolis lanceolatis — incis  
<sup>acutis</sup> serratis petalis lanceolatis numerosis obtusis

28. ranunculoides A. foliis tripartitis <sup>obtusis</sup> cuius incis  
to incis, petalis obovatis

29. nanosiflora A. foliis ternatis involucrique ternatis trifidis bifidis  
floribus umbellatis

30. *foliiculata* A. foliis tripartitis trifidis, floribus umbellatis  
31. *thalictroides* A. foliis caulinis simplicibus verticillatis, radicalibus  
bis ternatis, floribus umbellatis

xyxy seminebus cinatis 15-16-17-18

an folia caulina potius involucri?

~~differt brevem ad huc emendat agit~~



fasciculata a. floribus umbellatis congestis, foliis multifidis  
Pranunculus orientalis, aconiti Lycotonia folio, flore magno  
albo Tournef. com. 20. itin 3. p. 92. t. 92.

Habitat in oriente.

Similis monisiflora foliis tripartitis trifid. D. J. Anobacimum  
trifidum laciniis subinduratis. pedunculi 2 in petala  
oblonga

---

Tripartitis trifidis

Subbiflora Anemone foliis ternatis bipartitis multifidis, involucri foliis  
ternatis trifidis, caule subbiflora

Habitat ad fretum magellanicum ad Thoun.

Planta palmarum pilosa.

Folia radicalia, ternata: foliola lateralibus bipartita interme-  
dium tripartitum, lobis omnium lobis trifidis idemque <sup>sub</sup>bifidis  
linearibus.

Scapus foliis triplo altior

Involucrium foliis ternatis, petiolatis, tripartitis, trifidis:  
laciniis saepe subbifidis.

Pedunculus tomentosus, interdum gemini

Corolla magnitudine Anemone nemorosa, extus villosa, intus  
flava. Petala 6. alterna angustiora.

an eodem cum anemone baldensi



palmata a. foliis cordatis sublobatis, calyce hexaphyllo colorato ten. Spec.

N. pag. 759.

Anemone hortenfi latifolia l. Clus. hist. 1. p. 240.

Anemone latifolia flava Bauh. pin. 176.

Anemone cyclaminis f. malva folio lutea Bauh. pin. 173. Monj.  
hist. 2. p. 425. 4. 425. fig. 3.

Habitat in Lusitania et Hispania et

res. pilei aequid. in  
maxime

radice radice, petiolata subconata, glabra, subtus ner

basi interdum  
sine interdum  
nullo

folia radicalia, petiolata vel sequi polliciana triloba lobi  
rotundati oblongi vel rotundati, for. dentati serrati.

Petiolus bipollicaris vel ultra filiformis canaliculatus  
pilosus pilis sub folio panum erapor.

capitulum erectum palmatum, superne versus sub involucrio intras  
digitales  
latus striatus inferne glaber superne saepe pilosis flo  
flos solitarii vel gemini pedunculatus alter ex altilla  
involucrio alterius etiam involucriatus, sicapo dimidio

longior angustior superne vix crispior pilei flavis aureis  
sub tomentosis prope stem. sub flore

involucrium triphyllum sessile basi subconatum extror  
sum dilatatum trifidum glabrum nervosum trifidum  
laciniis linearibus lanceolatis lateralibus interdum bifidis

Corolla epinepithala frutalis oblonga flavis integris, s̄ exterioria  
caulis pilosa nuda

Cum involucris a flore remotum ad diversitatem insyuen-  
tem hujus generis amandatur



Anemone

Habitat in montibus Carolinae Herb. 4usj. Michaux.

Species anem. nemorosa. Folia radicalia ternata, oculo armato pilis adpressis: foliola lateralibus trifida, incisiva, intermedium inciso-serratum. Siliqua fere filiformis, quinque pollicaris: Involucrum foliaceum, biterminatum: foliola oblonga, utrinque acuta, incisiva. Pedunculus pilosus. Petala 5que, oblonga, obtusa. var. spec. diversa

alba Anemone

Habitat in Siberia Herb. Rusf.

Valde affinis A: sylvestri. Solea radice alba ternata, pollicaria: foliola tri-  
da; laciniis in iis acuta, utraque pilosa, uti petoli et scapi. Scapus  
perthamorus, supra involucrium tomentosus. Pediculi uterque gemini, in-  
cani: involucrium ternatum, foliosum: folia petiolata tripartita: lacina  
trifida, in iis. Corolla pentapetala.



*Caperis Anemone*

*Anemone caperis* dea Mark cum synonymis

Habitat in Cap. b. p. c. heb. fusf.

Folia longe petiolata, radicalia, bipinnata. Soliola petiolata basi pilosa, in  
termedia sessile, incisa: laciniis serratis, utrinque acuta, rigida, venosa,  
venis exstantibus, glabra. Siliqua erecta, supra involucrium lanatum in  
involucrium diphyllum. Petala plura, oblonga, ciliis pilosis, nitida, ger-  
men lanatum. an *Atrazine caperis*.

Cuneifolia Anemone

Habitat ad fretum Hudsoni Michaux herb. Musf.

Folia radicalia petiolata, semipollicana, glabra, arena, tripartita: latius obovato; laterales inciso, intermedia subtrifida, lobis obtusis: lateralibus obtuse dentatis. Petiolus pollicaris vel parum ultra. Scapus erectus, struthamorus, teres, oculo armato pilosus. Involucrum foliaceum triphyllum: folioli subsessilibus, trifidis: laciniis <sup>linguae alantidis</sup> obtusis; lateralibus 2-3. obtuse dentatis; foliolum 3<sup>ium</sup> brevius et minus divisum, usque Pedunculus folietarius scapo longior, uni floris, superne canescens. Semina lanata prope sylvestrem colloquenda.



parvifolia Clemone

Habitat in Carolina herb. Aucti

Caulis herbaceus, erectus, pedunculo unifloro elongato & multinatis; semipedalis villosus. Folia radicalia petiolata & ternata: foliola cuneata, unguiculata glabra, apice integra crenata, vel subtrifida: lacinae obtuse, intermedia interdum emarginata: lateralia interdum profundius bifida. Caulis ternatus, sessilis, trifidus, subtus villosus: lacinae integre vel apice & indentato. Sepala lanata

napellifolia Anemone.

Ranunculus orientalis, napelli folio lanuginoso; flore albo Tournef. Cor.

Habitat in oriente et alpebus altaicis herb mus.

Facies Anemon. napelliflori. Folia ternata, trifida: laciniis 2 fido lan-  
colata, obtusifida margine, uti petioli hispida. Scapiulis longis his-  
pidi



Anemone.

Habitat ad fructum Mazellanum Commar. herb. Mus.

Radix crassè penno cyanea. <sup>lyrosa</sup> Folia radicalia <sup>semipollicana,</sup> ternata, tripartita, multifida, petiolata; laciniis linearibus, acutis, albedo pilos. Petioli tripollicares uti caulis pilis albidis adpressis. Folia caulina ternata, tripartita, trifida, bifida, basi in petiolum attenuata. Laciniis lanceolatis - linearibus. Pedunculi terni, intermedii altior absque involucrio: laterales versus medium involucriati. Involucrium diphylla, trifida: laciniis incis. Pedunculi canescentes. Corolla ochroleuca, 6. petaloida. Semina lanata. Scapi semipedales, erecti.

Therophylla Anemone

Habitat in Oriente herb. mus.

Radix bulbosa. <sup>radicalis,</sup> folia ~~prostrata~~, vix pollicaria, radicalia tripinnata: pinna lineari  
ser, brevis, integris vel dente uno alterove incisa, crassiuscula, glabra. Petioli  
villosi. Scapus altitudine digiti intermedius, saepe geminus, villosus. caespitiosus.

Involucrum ~~triphylleum~~ : foliis trifidis laciniis pinnatifidis; lobis lineari-  
involucrum diphyllum sub flore, inferne uti alterum basi latum, apice mult  
lucidum. Corolla magna. Petala semipollicaria, oblonga, basi versus parum  
angustata. Anthera coerulea  
an An. coronaria?



Anemone

Anemone geraniæ rotundi folio purpurascens.

Habitat in herb. Quæf. Meuf

ternata

Radix bulbosa. Folia radicalia longe petiolata: lobi subrotundi sublobati  
crenati, subavenia, c. rarsiuscula, basi cordato, unguicularia: alia lobi parti-  
ti multifidis: laciniis lanceolatis acutis integerrimis, supra ad costam pilis non  
nullis: alia foliolis profunde fissis. Scapus palmatis erectus, villosus, superne  
cinereus. <sup>In involucrium</sup> In involucrium <sup>in phyllum</sup> In involucrium <sup>foliolo lanceolato</sup> In involucrium <sup>fere semi pollicentibus</sup>  
<sup>interdum cum velt. al. tenui. in p. dum</sup> indivisis, acutis. Petala II. lanceolata

*Dubia Anem.*

Bellon. - Oppend ad fl. Ped. pag. 26 Tab. 5.

Habitat in alpebus

ab An. fragifera differt flore minore involucris brevioribus foliis radicalibus lobatis pappi non petiolati. Petala pubescentia

non vidi



*Hepatica A foliis trilobis integerrimis* Lin. S.V. fl. Dan Tab. 610

*Trifolium hepaticum*, flore simplicii et pleno Bauh. pin. 339.

Habitat in Europa nemoribus ~~fabulosis~~ <sup>capidosis</sup> &

caulis radicalis, petiolata, cordata triloba, lobis ovatis obtusis  
integerrimis <sup>maxis</sup> fultus pilis longis <sup>trispicillis</sup> hirsuta proferens <sup>trispicillis</sup> pinnis, avenae  
Stipule plures ovatae. Petioli <sup>trispicillis</sup> hirsuti. <sup>trispicillis</sup> Capsulae <sup>trispicillis</sup> trifolles  
aliquantum longiores. involucrium triphyllum approximatum  
folioli ovatis integerrimis. petala oblonga, plura

patens A. pedunculo involucriato, foliis digitatis multifidis Lin. Spec.  
pl. pag. 7594 S. V.

Pulsatilla folio anemones secundo s. subotundo Bauh. prod. 44. Pin.

<sup>177</sup>  
Pulsatilla polyanthos violacea, anemones folio Breyn. cent. 132.  
Helv. pulf. 5. 2. 4. 2. 3.

Pulsatilla anemones folio dissecto, Canadensis, flore magiore dilute  
luteo patente Amm. nith. 104.

Habitat in Sibira, et Lusitania inferiore 2

Folia radicea ternata foliola bipartita, iterum plures  
bifida laciniis lanceolatis attenuatis <sup>2x</sup> mucronatis glabra.  
Petiulus striatus pilosus. Scapus erectus foliis <sup>crispis</sup> albis crispis  
pennis columbinis striatus pilosus. Involucrum multifidum  
laciniis linearibus remotis, valde pilosum. Peta-  
la 5 alba fultus villosa canaliculata



Halleri A. foliis pennatis pennis trifidis bibrifidis involucri multifido  
Anemone Hebis caudatis involucri multifidis, foliis hirsutis penna  
tis, pennis acute lobatis Hall. bot. Helv. n. 1140.

Anemone Halleri All. fl. pedem. n. 1722. tab. 30. fig. 2.

Habitat in Helvetiis et Sabaudis montosi.

maxime affinis A. patenti a modo vendita. Tota hirsutis  
lanuginosa. laciniis foliorum laciniis lanceolatis pennis  
quinque. involucri multifidis laciniis  
corolla extra hirsutis prima

vernalis A., foliis pennatis flore recto Linn. V. Fl. Dan. t. 29

Pulsatilla ex valleja

Pulsatilla, apii folio, vernalis, flore major Bauh. prod. v. 94. p. 177

Helv. pulf. 63. t. 9.

B. Pulsatilla apii folio, vernalis, flore minor Bauh. prod. v. 94. p. 177. Helv. pulf. 64. tab. 10

~~V Pulsatilla lutea apii folio hortenjis folio Bauh. p. 177.~~

Anemone tubis caudatis in reflexis multifidis folio pennatis

pennis lateri

Habitatio. Isei: Helv. sylva penultima subalpina &

Hall-hist n. 1147. tab. 21

Folia radicalia pinnata vel ternata: foliola consistentia unguiculata  
4 vel quae 6 apice subnatis <sup>et</sup> hirsuta prostrata subtus  
scapus folio parum longior ut involucrium et corolla exte-  
rius albi longis subsericeis hirsutissimum. Involucrum mult.  
quidem distans lacinis subulatis. petala quinque oblonga 3.  
angustiora exte hirsutiora

add. Hall



*Cernia* A. foliis pennatis flore cernuo Thunb. fl. jap. pag. 238 & 11.  
pag. 510

Habitat in Japonia.

Caulis radice alba, petiolo, digitalia. Scapus tomentosus medio in  
volucratu, uniflorus, apice geniculatus. penna foliorum  
opposita profunde incisae. pennula alterna sub serrata, ac  
se villosa in primo subtus a vernali. Differt flore cernuo  
foliorum penna pluribus majori incisae.

non vidi.

pradensis A. petalis apice reflexis, foliis bipinnatis Lint. D. Fl. Dan. Tab. 611.

Pulsatilla vulgaris, saturatioris flore. Clus. hist. 1. p. 246.

Pulsatilla flore minore nigricante Bauh. pin. 177. Helv. p. 157.  
66. 8. 12.

Pulsatilla foliis decora profertis pinnatis, flore pendulo limbo reflexo  
Hort. Cliff. 223x

Habitatio Danica, Germanis campis pratensibus apricis undis v  
differt a Pulsatilla quodammodo alior flores <sup>duplo</sup> minores.



alpina A: foliis cauliculis ternis connatis supra decomperti multifidis  
eminibus hispidis Lin. Sp. pl. p. 760 Mant. 406 Gaerq. fl. austr. 4. 89.  
Cinemon sylvestris 2. Claf. hist. 1. p. 245.

Pulsatilla flore albo Lobel. ii. 202. Bauh. pin. 177.

B. Anemone alpina alba major Bauh. prodv. 94. pin. 176.

Habitat in alpebus Styraei, Helvetiis &

Folia radicalia ternata: folioli pennati <sup>nitidi</sup> pennis lanceolatis  
inciso pennatifidis apice fernigato fascis obtusifusculis scapulis  
pilosis prope in sub flore pili tamen rari quam in balden-  
si: Corolla et in basi pilosa petala 6 duplo majora quam  
in baldenfi pallide flava Involucrum ut in foliis radicali-  
bus

varietas caule sesquipedali foliis pedalis uti involucri  
ternata folioli bipennatis pennis lanceolatis incisi  
ultimis confluentibus laciniis seta fusca terminatis  
<sup>ad sulphuream petala</sup>

Folia ut in alpino et multo angustiora

apud folia Gaerq. nisi haud diversa mihi videtur

apii folia A. foliis caulinis ternis connatis suprae compositis multifidis  
tenuissimis P.V. p. 510 Gaig. Misi. 2. p. 47-48

non vid.



Coronaria A. foliis radicalibus ternato decompositis, involucri folioso  
Lin. h. v.

Anemone tenuifolia, simpliciflora Bauh. pin. 174 no 2-12.

β Anemone Cam. epit 386

Anemone tenuifolia multiplex aurata Bauh. pin. 176.

V Anemone angustifolia multiplex, mutata florum facie quotan  
ni nova H. B. K. mill. det. 8. 31.

Habitat in oriente, constat in opoli allata & nunc in <sup>Barbano</sup> <sup>Cam</sup> <sup>Barbano</sup> <sup>Cam</sup>

Folia radicalia ternata, foliola multipartita, incisiva.

glabra petioli villosi. Capis longitudine foliorum invo-  
lucrium & multifidum. Pedunculus brevis tomentosus inia-  
nus. Corolla pentapetala extra villosa subpericla rola

ica

extrosam  
delatata

multipartiti incisivi

Rodensis A. foliis digitatis, seminebus lanatis Lin. l. V.

Anemone hortensis latifolia 3. Clus. hist. 1. p. 249.

Anemone geranii rotundo folio, purpurascens Bauh. pin. 173.

Anemone l. Dod. pempt. 434.

Habitat ad Athenum in Italia 2

\* radicalia folia radicalia ternata foliola sessile tripartita laciniis  
interdum quoque trifida lobata triloba subcoriacea subtus venosa flava  
trifida laciniis trifida lobata triloba subcoriacea subtus venosa flava  
trilobis triphyllum folio remotum folioli lanceolatis integris  
vel uno altero trifido corolla polypetalata basi villosa

lib 4<sup>to</sup> (Anemone italica latifolia purpurea folus 3. Clus. Bauh. hist. p. 402  
Anemone stellata purpurea et alba Tabern. 40  
Anemone parviflora Tabern. p. 90  
ternata tripartita, involucria folioli indivisi trifideve  
Canceolati



Sibirica A. caule unifloro, involuero folioso obtuso Lin S.V. pag 570

\* Spec. pl. pag. 763 \*

Habitat in Sibiria \*

Folia radicalia digitata multifida, marginibus profertim  
hirsuta. Petioli pilosi basi saginantibus. Scapus nudus  
pilosus. Involucrium sub flore tripartitum, lobatum  
laciniis lanceolatis. Pet. patens petalis 6 rotundis  
~~et~~ fulvis stamina flava.

non vid.

Anemone

palmata

Anemone foliis cordatis trilobis, in volucri triphyllis trifidis; corollis  
~~sub~~ ~~petalis~~  
~~Anemone~~ ~~hordensis~~ lat. folia l. Clus. herb. 1. p. 240. Karst. ic. 792  
Anemone palmata foliis cordatis sublobatis, calyce hexaphyllo

Lin. S. V. pag

Folia radicalia, petiolata, firmiora quam in reliquis speciebus  
hujus generis; glab. pilis aequot in margine, coeternum glabra,  
subtus nervoso-venosa, pollicaria vel <sup>ultra</sup> pollicaria, basi in  
terdum sine ad petiolum interdum nullo, triloba: lobi oblongi  
vel rotundati, serrati.

Petioli bipollicari vel ultra, feli formis, canaliculati,  
pilosisculis sub foliis paucis proaspor.

folia radicalia  
familia foliorum  
radicalium non  
nullorum in  
a hortic. ad hujus  
per dentata illius  
integerrima

Scapus erectus, digitalis, superne versus sub involucri stria  
~~sub~~ ~~petalis~~  
~~sub~~ inferne glaber, fur. sursum pilosus.

Flores solitarii vel gemini. Pedunculus alter ex axilla  
involucri alterius, si apud dimidio longior, angustior, super  
ne vix crispior, pilis aureis tomentosis proferim sub flore

Involucrium triphyllum, etiam in altero pedunculo p. adit,  
foliis sesquialter, basi subinnata, ext. osum dilatata, glabra

205



nervosa, trifida. laciniis linear-lanceolatis, lateralibus interdum basi

di  
Corolla enneapetala, Petala oblonga, flava integra, externa sive  
extus pilis aureis vestita.

~~Calycem hexaphyllum coloratum a flore remotum  
quid intelligit Pedunculum involucreatum esse jam quodque figura  
descriptio Elusii sicuti apparet meliora sunt igitur Anemones Tournef. a foliis  
tunc quam Hepaticas Dillenii~~

Quid Linnæus per  
Calycem hexaphyllum coloratum a flore remotum intelligit, haud per  
specie quam nunquam quidquam tale in hac planta vidi:  
Pedunculum involucreatum esse tam e descriptione quam figura  
Elusii satis apparet, meliora sunt igitur Anemones Tournef. a foliis  
tunc quam Hepaticas Dillenii

Sylvestris A. pedunculo nudo, seminebus subtundis hirsutis mutis linn.

S. v. pag.

Anemone sylvestris L. Clus. hist. 1. p. 244.

Anemone sylvestris alba major Bauh. pin. 1. 26. prod.

β Anemone sylvestris alba minor Bauh. prod. 93. pin. 176.

Habitat in Virginia Germana. 4

Folia radicalia, ternata <sup>pedicellata</sup> foliolis cuneatis trifidis serratis  
incisive venosi venis margine raris pilosis. Scapus erectus semi  
pedalis striatus pilosis involucri folia tripartita bifida  
serrata incisive. Pedunculus tomentosus - petala 5 alba  
semina lanata tomentosa

α nemorosa diversa sicuti altiore, flore majore pedunculo  
tomentoso seminibusque lanatis



*Fulphura* A. foliis triplicato pennatis pelosi planis acute incis. Lin.  
Mant. 10. p. 1. v. p. 509.

*Pulsatilla lutea* Dum. epist. 393. ~~per vestri folio~~  
<sup>radicibus</sup>

*Pulsatilla lutea*, apud ~~radicibus~~ <sup>radicibus</sup> ~~folio~~ <sup>folio</sup> ~~Bauh.~~ <sup>Bauh.</sup> ~~per.~~ <sup>per.</sup> 177.

*Pulsatilla alpina* Dalech. ~~herb.~~ <sup>herb.</sup> 150

Haller

Habitat in Helvetia alpina & c.

accidit ad A. ut purpurea planta palmatis vel pithamora pulis  
albis <sup>comp. pithamora</sup> ~~herb. mus.~~ <sup>herb. mus.</sup> ~~foliis~~ <sup>foliis</sup> ~~tripennatis~~ <sup>tripennatis</sup>  
pennis pennatis fissis laciniis lanceolatis. involucrium foliis  
femellimis. Petala uniter novem ciliata villosa intus glabra

*Pulsatilla lutea* ~~lutea~~ <sup>lutea</sup> ~~alpina~~ <sup>alpina</sup> ~~herb. mus.~~ <sup>herb. mus.</sup> ~~per.~~ <sup>per.</sup> 177. ~~herb. mus.~~ <sup>herb. mus.</sup>

*Pulsatilla lutea* ~~anemone~~ <sup>anemone</sup> ~~alpina~~ <sup>alpina</sup> ~~no~~ <sup>no</sup> 1149 Hall. ~~varietas~~ <sup>varietas</sup> ~~B~~ <sup>B</sup>

*Pulsatilla lutea* ~~anemone~~ <sup>anemone</sup> ~~myrrhida~~ <sup>myrrhida</sup> ~~folia~~ <sup>folia</sup> ~~foliis~~ <sup>foliis</sup> ~~triangulariter~~ <sup>triangulariter</sup> ~~decompositis~~ <sup>decompositis</sup>  
411. ~~herb. mus.~~ <sup>herb. mus.</sup> ~~laciniis~~ <sup>laciniis</sup> ~~confluentibus~~ <sup>confluentibus</sup> ~~petalis~~ <sup>petalis</sup> ~~acutis~~ <sup>acutis</sup> ~~tubo~~ <sup>tubo</sup> ~~rectis~~ <sup>rectis</sup> ~~Will.~~ <sup>Will.</sup>

*Leguminosae* ~~herb.~~ <sup>herb.</sup> ~~flor.~~ <sup>flor.</sup> ~~delph.~~ <sup>delph.</sup> ~~3.~~ <sup>3.</sup> ~~pag.~~ <sup>pag.</sup> 27 <sup>27</sup>

~~nona~~ <sup>nona</sup> ~~hujus~~ <sup>hujus</sup> ~~ad~~ <sup>ad</sup> ~~vernalem~~ <sup>vernalem</sup> ~~refertur~~ <sup>refertur</sup> Hall 1147 male  
ab alexonio huius

*Folia* ~~radicalia~~ <sup>radicalia</sup> ~~triplicato~~ <sup>triplicato</sup> ~~pennata~~ <sup>pennata</sup> ~~pennis~~ <sup>pennis</sup> ~~pennatis~~ <sup>pennatis</sup> ~~refertur~~ <sup>refertur</sup>

Pulsatilla a petalis rectis, foliis bipinnatis L. V

Fl. Dan. tab. 153.

Pulsatilla Cam. epit. 390.

Pulsatilla folio crassifore et maiore flore Bauh. pin. 177. Helv.  
puls. 52. tab. 0.

Habitat in Campis sylvestribus exaridis collibusque apricis Europa

boreali &

Tota <sup>nili</sup> ~~vallis~~ <sup>nili</sup> ~~vallis~~ pennis congis herpeticissima. Folia radicalia bipinna

Haec pennis alternis lineari-bifere trifidi ultimi indivisi

capiti <sup>palmaris</sup> involucri <sup>palmaris</sup> involucri multijido laciniis lineari-  
arguti

Anemone rubra non nisi hucus unctis differre videtur laciniis foliorum

laciniis, sed Pulsatilla hoc modo quoque inter se ut plurimum differunt  
in herb. Lus. ord.



baldenfis A. foliis biterminatis hirsutis <sup>in</sup> Mant. 78. & S. V. p. 509

anemone alpina alba minor Bauh. pin. 176.

Habitat in Baldo in Astanis

Planta palmarum  
vel pythamosa

folia radicalia petiolata, biterminata, foliolis intermediis  
num. serim. sive ternatur foliolo interiora juniora subtus  
velosaestate glabra (folia apice. Petiolus canaliculatus  
suis striatus velosus estate nudus. Stipulae radicales lan-  
ceolatae apice hirsutissimo tomentosae. Scapus foliis  
altior, in densis striatus velosus. Involucrum  
folio remotum triphyllum foliolis tripartitis multifidis  
caudice foliorum. Peduncululus sub flore tomentosus intra  
nus petalatae uniter octo oblonga emarginata

Anemone alpina Scopoli fl. Carn. Tab. 26. no. 662.

ob male locatam <sup>in</sup> Wulferi frugiferam differat

Hall. hist. no. 1151 a <sup>to</sup> Wulferi ad frugiferam relata

biflora A foliis radicalibus ternatis in tripartitis multifidis caule  
sub biflora

Habui a Thonino uti incola fiesi magellanica an recte  
nam faciem omnino habet An baldensium nisi quod folia  
magis dispersa latius aequo multo angustioribus



Caroliniana a foliis radicalibus hibernatis bi-3partitis truncatis  
dentatis involucrio campanulato bifido. Walt. fl. Car. p. 157  
Habitat in Carolina  
Retala 6-21

non vidi

quinquefolia a. foliis quinatis ovalibus serratis, caule unifloro. Lin. S. V.

Ranunculus nemorosus, fragrans foliis virginianus Plukh. alm.

510. V. 106. fig. 3.

Habitat in Virginia, Canada &

non nisi varietas u. nemorosa am. sept. foliolo interdum ternis, unde  
rari ex tropem serrata, interdum lobata bifida, interdum quinata oblon-  
ga foliolo indiviso: foliolo interdum quinata lanceolata subtrifida  
indiviso serrata



virginiana a pedunculis alternis longis, fructibus cylindricis, seminibus  
refutis mutis Lin. Sp. pl. pag. 761\*

Anemone virginiana tertio similis, flore parvo Herm. Leg. 645  
pand. 18. 10.

Habitat in Virginia 4

Caulis nudus terminatus foliis ternis, ternatis medio trilobo  
acuto serrato, lateralibus bipartitis, lobato serratis. Pedun-  
culus a centro petiolorum longus nudus. Flores parvi  
petalis ovatis undibus. Extra pedunculum basi exit caulis  
ulterior terminatus pedunculo florifero et foliis duo-  
bus oppositis et sic ulterius Lin. folia juniora sub-  
tus villosa subtomentosa juniora. petalis 7-8

ex lat. a perphyranico dweff

pennsylvania a caule dichotomo, foliis sessilibus amplexicaulis: infemister  
nis trifidis incis. Lin. S. Nat. 9. p. 231. & Mant. 247. S. V. pag. 510 &  
(canadensis)

Habitat in Canada

Smilax dichotoma differt foliis ternis ad primum dichotomiam  
cauli magis venosis, minus horizontalibus, floribus albis subtus non  
nubeculis. Anthera flava non fulva. Fructus seminum  
apicibus subulatis, mucrone minuto recurvo. Semina glabra  
ut in dichotoma

~~floribus in maiori altissimis, minima in altissimis minore.~~  
~~folia subtus villosa pubescentia. pilosiora~~  
~~quam a dichotoma revera diversa~~



fragifera pedunculo nudo, seminibus subrotundis canatis muticis, foliorum la-  
cineris acutis lanceolatis saepe. Musci. 2. p. 55. L. V. pag. 510

non vidi

baldensis est  
descript. in Wiltm. Sem. pl.

Decapetala A. caule unifloro, flore decapetalo, foliis ternatis lobatis radi  
calibus Lin. Mant. 79 \* S.V. pag. 510

Anemone foliis ternatis: folioli trilobis pinnatis, pedunculo  
simplici, flore unico decapetalo Ard. spec. 2. p. 77. t. 12.

Inlobata a montis  
red eo Thorus  
venata, <sup>venis</sup> mucronatis  
venosa glabra  
lucis internum  
nolmani

Habitat in Brasilia & radice bulbosa  
Planta digitalis. folia radicalia ternata, <sup>crenatis</sup> foliola petiolato  
subovatis obtuse trilobis f. incisi. Caulis simplicis semis  
semipedatis. Involucrum uniflorum, tripartitum multi  
sedum lineare acutum, lobis. Pedunculus longitudine  
involucri hinc <sup>tomentosus</sup> & albus parvis, albis. 10 petalae. petala  
nunc lanceolata intemora minora. Germina villosa.

mea frontanea Landi paucum differt  
Planta digitalis folia non ternata sed tripartita  
lobata lobis ovato subrotundis. venis raris pilis minutis  
restituatur  
adpersis obtuse dentatis dentibus mucrona minuto calloso  
obtusis lobis majoribus sublobatis. Involucrum  
tripartitum lobis extus latioribus trifidis laciniis  
bifidis subulatis spicis calloso. pedunculus tomentoso  
si tomentosus. petala extus villosa



10-19

Internata Clione foliis Internatis: folioli cuneati subnitisi,  
involueri multifido, ab. LXV

Habitat in Brasilia in Thomi

Folia radicalia, petiolata, ternata supra eorum posita, glabra  
foliola parva, sesquiquincuplana, bis trifida, obtusa  
scila: laciniis bis tridentatis uniglous,

Caput digitale, altitudinis foliorum, sub involucrio et floribus  
incrassatus, inferne glabriusculus <sup>intra</sup> sub involucrio pelosus  
sub floribus villosus incanus.

Involuerum foliis ternis, basi connatis, bis trifidum: laciniis  
lineantibus.

Corolla dodecapetala. Petalis <sup>longioribus</sup> lanceolata, exteriora parum  
longiora

206

192

\_\_\_\_\_ florum

*Trifolia* A foliis ternatis ovatis integris serratis, caule unifloro Lin. l. V.

*Anemone trifolia* God. pempt. 436.

*Anemone trifolia* flore albo Bauh. hist. 3. p. 412.

Habitat in Gallia &

radicalia biter  
nata

Caulis <sup>caulibus ternis</sup> prostratus glaber. Folia <sup>caulibus ternis</sup> petiolata. folia  
ca petiolata basi cuneata gemma bipollicaria venis villosis  
ca lateralibus basi versus obliqua. pedunculis villosis  
foliis brevior pubescens. petala 7 gemma villosa.



Dichotoma A caule dichotomo foliis sessilibus omnibus oppositis amplexicau-  
libus trifidis incisi An. dec. 29. t. 15. Mant. 406. S. V. pag. 511.  
An. am. acad. 1. p. 155 + Spec. pl. pag. 762 +

Habitat in Canada, Sibiria &

Caulis pedalis, crassitie penna asserino pubescens dichotomis  
tribus. Folia opposita horizontalia, ultra medium trifida  
lobis aequalibus lanceolatis, apice profunde serratis, trinervi-  
is utraque pelosi. Pedunculi et dichotomis ramorum  
solitarii pubescentis. flos magnitudine a. nemoroso.  
Semina nuda compressa terminata stylo apice inflexo  
hinc

non vidi

nemorosa A. seminibus acutis, folioli incisi, caule unifloro  
fl. Dan. t. 549

Ranunculus sylvorum Bauh. pin. 176. Claf. h. t. 247.

Anemone nemorosa, flore majore Bauh. pin. 176.

Habitat in Europa aperiens, nemoribus &

caulis digitalis striatus folia caulina ternata ternata  
lanceolata lateralibus bifida superne profunde  
ferrata velis rarisimè & pappo. Pedunculus filiformis  
pubescenti

---

folia ternata folioli lanceolata serrata  
to incisi petala oblonga

quod petala



ranunculoides A. seminibus acutis, folioli incisi, petalis subrotundis cau-  
le subbiflora L. V. Fl. Dan. Tab. 140

Ranunculus nemorosus luteus Bauh. pin. 170.

Ranunculus phragmites luteus nemorosus Bauh. hist. 3. p. 413.

Habitat in Europa boreali. pratis nemorosi &

fundis antecedenti foliolo obtuse serrato incisa petala  
obovata flava

apennina a. seminibus acutis, foliis incisi, petalis lanceolatis numerosis

Len. P. V.

Anemone robertiana Tenouifolia simplicis flore l. Clus. her. 1. p.  
254.

Anemone geranii robertiana folio, flore coeruleo Bauh. pin.

<sup>174</sup>  
Ranunculus nemorosus, flore coeruleo, apennini montis  
Mentz. pug. 7. P. fig. 2.

Habitat in apenninis, Neapoli, Roma, Anglia &  
pmitinemoso at corolla petalis pluribus coeruleis  
lineari lanceolatis obtusis interdum caulis biflorus  
foliola acute serrato incisa



nanisiflora A. floribus umbellatis, seminibus depresso ovalibus nudis Lin  
L. V. Mant. 406. f. v. pag. 511. Faeg. fl. austr. 2. 7. 159.

Ranunculus montanus hirsutus albus elatior Bauh. pin 103.

Ranunculus montani 2. species altera Clus. hist. 1. p. 235.

Coryophyllata alpina quinquefolia Bauh. pin 322.

Ranunculus montanus hirsutus humilior, marisiflora.  
Bauh. pin 102.

Habitat in alpinis Helvetia, Austria, Graecia, Sibiria &

Tota planta  
vires longis molli-  
bus hirsuta

folia radicalia, ternata. foliola lateralia bipartita  
lobis tri fidi semel vel bis bifidi. Laciniae intermedium  
bifidum. Laciniae bifidae omnibus laciniae lacinio-  
lae attenuatae. involucria basi connata, bis trifida  
Laciniae bifidae vel integris lacinio-latis pedunculati  
circa septem involucrio parum longioraque

folia ternata trifida

quosdam  
retia

bifida

fasciculata Anemone floribus umbellatis congestis, foliis tripartitis trifidis  
Anemone fasciculata floribus umbellatis congestis, foliis multifidis  
Lec. I. V. pag.

( Similis An. nanosiflora ut non mirum quod Hallerus dubitavit nec  
diversa sit nec ne, differre videtur foliis tripartitis trifidis

Involucro trifido laciniis subindivisi, petalis oblongis  
Paniculus orientalis aconiti lycortoni folio, flore magno  
albo Tournef. cor. 20. ita 3. p. 92. t. 42.

Habitat in oriente

Pedunculi saxe 2-3 pollicum diversa a mea quo species distincta  
transferatur et differentia ad illam

207



biflora P. foliis ovatis serratis floribus calycibus solitariis. oppositis decem  
dentatis

Habitat in India Orientali

Caulis herbacaeus, <sup>rarnosus</sup> ut videtur prostratus tenuis debilis villosus  
Folia petiolata unguicularia obtuse serrata, obtusa ad  
caetera rase pilosa. Pedunculi brevissimi solitarii oppositi  
uniflori bracteas duas terminans ad basin singuli calycis. Calyx  
striatus decemdentatus. Corolla galea hispida spina

Leucas foliis rotundis serratis flore albo Burm. Zeyl.  
ney. 140. Tab. 63. fig. 1.

Lamium indicum, foliis oblongis, flore albo, graveolenti

Repeta biflora  
Burm. Zeyl.

Herm. Mus. Zeyl. 65

Ghotha tumbu Herm. Zeyl. 65  
cauli replent pubescent

an eadem ac Stachys decemdentata

Tsjaden bot. Mal. 10. 7. 80. p. 175 ed. Repeta  
indica

Radix Surtka huius relata a Burm. diversa planta  
ad se lavand. carnosam praeterea  
repeta indica fci. Burm. indica.

Thalictroides A. floribus umbellatis, foliis caulinis simplicibus verticilla-  
tis, radicalibus biterminatis Lin. Spec. pl. p. 7634

Prænanthulus nemorosus, aquilegia foliis, virginianus apphodeli  
radice Plukh. alm. 810. t. 106. fig. 4.

ps. Thalictrum caule unifloro ex eodem puncto foliis quatuor sim-  
plicibus instructo Gron. Voy 62.

Habitat in Virginia Canada.

Caulis filiformis glaber palmari. Folia radicalia petio-  
lis longis, duplicato ternatis. folioli subcordatis angula-  
tis. Scapus foliis alteris terminatis foliis 4-5 simplicibus  
petiolatis oblongis. petioli fere capillares. Peduncululi  
2-3. 5 uniflori squales. Petala ovata alba. Pistilli capi-  
tulum ovatum, mucronatum. Lin  
Species Thalictri secundum Fructum Richard