

# Angelica

1. archangelica A. foliorum impari lobato.
2. atropurpurea A. foliorum extremo pari cordato, folio terminali petiolato.
3. verticillari A. foliis dwariatis pinnis: foliolis ovatis serratis, cauli pedunculis verticillatis
4. lucida A. foliolis equalibus ovatis unis serratis
5. sylvestris A. foliolis equalibus ovatis lanceolatis serratis distinctis
6. hazulii A. foliis bipinnatis: pinnis lanceolatis serratis confluentibus

lucida Angelica folioli equalibus ovatis mucronatis Lin. S. V. p. 284. Jacq.  
hort. Vol. 3. t. 24.

Angelica lucida canadensis Corn. Canad 196. t. 197. Monf. hist. 3. p. 281. f. 9  
t. 3. fig. 8.

Habitat in Canada ♂

Caulis pedalis fistulosus nitidus. Vagina ample vixens. Folia  
radicis alia tripennata cetera bipennata supra lucida atro-  
virentia subtus nitida extrinis confluentibus. Umbella depresso  
convexa. Petala sordide pallentia Wittm. in Linn. pl. 2. p. 159

Folia bipennata: penna inferior bipartita auriculata, superior decurren-  
ter, omnes ovata, oblonga glabra herb. Royenii

Folia subtripennata: pennula opposita sesquialtera, extrema decurrente  
foliola inferiora bipennata: pennula ovata vel oblonga obtuse serrata  
serraturis mucronatis, venosa, glabra. Umbella radii plurimi, inaequa-  
les, obtuse serrata. Semina oblonga, subrotunda utraque membra  
na sulcis tribus in medio herb. Quisf.

*Angelica A foliorum in pini lobato* Lin Sp. pl. p. 360 fl. Dan. Tab. 206

*Angelica major* Rod. pempt. 310

*Angelica fativa* Bauh. pin. 155

Habitat in Norvegia et Alabus Lapponia, ad rivulos. ♂

altitudo interdum hominea. Folia magna bipinna  
ta foliola opposita sessilibus subtus dilutione impari  
majori. Umbella ampla conica radiis angulatis. Vagi  
na maxima ventricosa. Involucrum saepe phyllem  
lineare reflexum. Petala subordina ovata, acuta  
caduca

Differentia haud sufficiens

in herbano desideratur

*Atropurpurea* A foliorum extremo pari coadunato; folio terminali petiolato  
Lin. Mant. 354. P. V. 284

*Angelica canadensis atropurpurea* Corn. canad. 190. V. 199.

Habitat in Canada

Caulis ~~origalli~~ vix crassitie brachii fistulosis articulatissimis  
levi *Atropurpureus* rose glaucis. Petioli vaginatis  
striati. Stipulae folia radicalia amplissima & superna  
bipinnata folioli ovati aequaliter serrati glabris  
venosis subtus pallidioribus oppositis. Umbellae  
terminalis caulis et ramorum <sup>terminalis</sup> vaginis ~~2~~ purpureis  
apice foliosis. Involucra nulla. Semina con  
vex triannata Lin.

Verticillaris<sup>a</sup> foliis divaricatis pinnis: foliolis ovatis serratis caule pedunculis  
verticillato. Lin. mant 217. 2561. L.V. pag 284. Gaigu. hort. 7. 130  
~~Anglica alpina ad nodos florida Tournef. G. R. 4. 317~~

Habitat in Italia scilicet in torrentibus  
altitudo humana et ultra. Caule glaucescente terribi  
rami floriferi verticillati 4-6. folia radice bipinnata  
(radicalia tripinnata) foliis parialibus inferioribus  
bipinnis sequentibus ternis terminali distinctis  
specimine a Gouanio in inferis pinnate terminali  
(triloba) & inaequaliter profunde et grosse serrata.  
venosa glabra. radicalia amplissima bipedalia  
supra nitida folioli 2-3 lobis extremo via distinctis  
vix umbello terminali ramosum et caulis multum  
flori flavo suspensis. Semina cordato orbiculata  
compressa laeva

Syn. omnia a Linnaeo allata dubia consule Gouan. ill.

austracium 4

*Sylvestris* A folioli aequalibus ovato-lanceolatis serratis Lin. S.V.

*Angelica sylvestris* Sod. pempt 310.

*Angelica sylvestris major* Bauh. pin. 155.

Habitat in Europa frigida subhumida sylvestris

Caulis bi-tripedalis erectus crassitie digiti ramosis stri-  
suis teris glaber. Folia petiolata bipinnata, foliola  
ovata acuta non lobata basi albesc. latera parum  
breviora inaequaliter serrata serraturae mucronati  
lequi pollicana subtus pallidiora venoso tenude  
reticulata veni aliquot pilis adpressis opposita  
<sup>terna</sup> ~~terna~~ ultima ~~conf~~ per petiolum decurrentia  
umbello magna, pedunculi radii umbello  
et umbellula farinosa canescente

Semina diversa ab Ang. Anhanglica

lobata A. folioli inferioribus bitermatis, folioli perlobati orate serratis  
superioribus ternatis Walt. fl. Car. pag. 115.  
Habitat in Carolina

non vidi



*integrifolia* A. foliis integris petiolatis Walt. flor. Car. p. 115.  
Habitat in Carolina

non vidi

*Raruli* A. <sup>pinnis foliis bipinnatis pinnis</sup>  
foliis lanceolatis serratis decurrentibus confluentibus

*Angelica Raruli* foliis bipinnatis, foliolis lanceola-  
tis serratis decurrentibus *Guon* ill. Tab. 6.

*Panax alpina* *Voic* Tab. 99 *Lotii* *Ebuli* laciniatis  
foliis *Voic* Tab. 99.

Habitat in Europa australi &

*Raulis* tripedalis angulata striato levis ramis  
4-5. Folia primordiali facie *Sambuci* *Radicali*  
et caetera foliola bipollicaria subtus pallidiora  
pubescentia, serraturis parvis mucronatis. Umbella  
amplissima hemisphaerica. Involucrum foliolo  
velutis. Squama striata margine perperascent  
petioli superiores vaginantes

*Arg. palestini* Goryun  
*alpina* Bankf.