

Annona

1. *municata* A. foliis ovali-lanceolatis glabris acutis, fructibus mucronatis
petalis ovatis internodiis obtusi brevioribus
2. *amplexicaulis* A. foliis cordato lanceolatis amplexicaulis, Petalis
exterioribus lanceolatis obtusis ^{exterioribus}
3. *grandiflora* A. foliis ovatis petiolatis, petalis oblongis
4. *speciosa* A. foliis oblongis acutis glabris, fructibus obtuse squamatis
petalis exterioribus lanceolatis, interioribus minutis
5. *reticulata* A. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, fructibus ora
reticulatis areolatis, petalis exterioribus lanceolatis
6. *tripetala* A. foliis ovatis acutis subtus pubescentibus, floribus tripeta-
lis lanceolatis tomentosis concavis
7. *palustris* A. foliis oblongis obtusiusculis glabris fructibus areolatis
8. *triloba* A. foliis ellipticis acutis glabris, floribus pediculis lam-
pubescentibus ^{pubescentibus} ^{nanulatis,} calycibus ovatis petalis pluribus

9. glabra A. foliis lanceolato-ovatis, fructibus conoidibus glabris
 10. asiatica A. foliis lanceolatis glabris nervis lineatis. (in ore squam. collic.)
 11. africana A. foliis lanceolatis pubescentibus
 12. hexapetala A. foliis elliptico-oblongis acutis glabris, petalis fructibus
 tri- & equalibus acutis.

cananga

13. macrophylla A. foliis ovato lanceolatis: subtus ramisque vellosis
 petalis aequalibus oblongis

ps. Diifolia Annora foliis oblongis utraque utraque subtus subtomentosis petala
li³ exterioribus ovatis, interioribus linearibus longioribus, fructu sublobato

Habitat in Guinea Thonning. in Senegal herb. Gussonei

Caulis 2. 4 pedalis. Rami teretes, superne ferrugineo tomentosi. Folia
petiolata, tripollicaria, integerrima, supra glabra ut venosa, subtu-
a tomento tenui incano, ^{subtomentosa} intersum basi subcordata, interdum rotundata,

subcostata

venis frequentis obtusissima vel acuta. Pedunculi longiusculares tomentosi, subsolidari-

bus obliquis sub sparsi. Calycis foliola, uti petala incano tomentosa, ovata, parva.

simplicibus inter Petala ^{exteriora} unguiculata, crasso, utraque; interiora parum breviora, basi

costa.

atropurpurea. Baccia subovata, flava intus aurca, ad semina
lucis pime elevato subtuberculato.

affinis videtur ~~ps. patulosa~~ ^{ps. patulosa} Aubl. della gaudat petalis omnibus
ovatis, fructu tuberculato, intus alba

confer cum tomentosa herb. haud ab omni videtur

~~Tetrasperma~~ Indigofera: foliolo lanceolatis, racemis folio longioribus, leguminibus
(Senegalensis) compressis Tetraspermis.

Habitat in Senegal Geoffroy. et herb. Fuscaei. & ^{Thoumieri} ^{junioris} filiforme

Caulis herbaei, ramosi, laxis. Rami elongati, teretes, superne angulati,
pilis raris dispersis ovulo armato videndis. Folia ternata: foliola
linear-lanceolata, opposita, ^{polluciana} semipolluciana, lateralia minor, utrin-

que ^{vel quinata pennata} pilis albidis adpressis. ^{sanep. eg. in} Stipula pedicels. Racemi multiflori. Flo-
res minuti ^{et utrorum} cinerei. Legumina pendula, ungue minore, compressa, tri-
plo angustiora quam longa, raris pilis adpressis conspersa, mucronata.
Semeni interdum 2-3, plerumque quatuor, tetragonis, ferruginea reti-
da.

Indigofera Senegalensis herbaea foliis pennatis ternatisque lanceolatis
linearibus, leguminibus compressis pendulis subtispermis La Mart.

Dict. bot. 3. p. 240

Radunculi frutiferi elongati
caules basi lignosi pedales. Legumen semipollucian. vel pollucian.

^{et utrorum} bubfaliata, mucronata unnescentia 2-12 sperme

variat foliis pinnis longioribus et latioribus et videntibus

pubescens Annona foliis lanceolato-ellipticis subtus ramulisque pubescentibus, fructibus
municatis.

Habitat in Montserrat de Ryas

Rami teretes, griseo-purpureo-flores, inferne glabri, superne, uti ramuli, petiol.
et nervi foliorum subtus, pubescentes.

Folia petiolata, alterna, 4-5 pollicaria, lanceolato-elliptica, integerrima,
utrinque acuta, obscure nervosa.

Petioles semiunguicularis. Tuberculum tomentosum, ferrugineum in axillis
foliorum.

Pedunculi pariter suprafoliares ex altero latere, pollicares, sursum versus
sensim incrassati, subaeriflores.

Calycis foleola ovata, acuta, vix semiunguiculari, tomentosa.

Petala non vidi.

(Fructus immaturos, trilobis: lobis oblongo-cuneatis, obtusifimis, tomentosis,
micans: maturis mucatis secundum de Ryas.

Subcordata Annona foliis oblongo - lanceolatis glabris subcordatis, pedunculis axillaribus solitariis
ramisque pilosis: folioli calycinis cordato ovato - cordati

Habita Capeno de v. Rohr.

Rami teretes, basi, inferiore glabri, superne uti petioli et pedunculi ferrugi-
neo villosi

Folia petiolata, 4-5 pollicaria, sesqui pollicem lata, panem acuminata
basi acuta, integerrima, plana, membracea, utrinque glabra excepto
to margine subcordato, venosa.

Petioli

Pedunculi axillares, pollicares, solitarii, uniflori, sursum versus sensim
ine rasati, basi articulati.

Calyx triphyllus: folioli ovato - cordatis, coriaceis, acutis, uti corolla
ferrugineo - villosi, corolla dimidio breviora

Petala oblonga, ovata, unguiculata, acuta, coriacea

Applenium

1836. affinis cilicifolia
no 290

punctata. ^{non} A foliis oblongis glabri integerrimis fructibus punctatis
Aubl. fl. Gu. 1 pag. 614. Tab. 247

Habitat in Guana. ~~non~~ Rohr no 6.

Rami teretes fusco purpureo scaber apice subulosis folia breviter
petiolata elliptica acuminata ~~in~~ ⁱⁿ ~~the~~ ^{the} ~~remota~~ ^{remota} ~~ut~~ ^{ut} ~~ne~~ ^{ne}
glabra ^{pilosa nigra que apparet rarisime in} ~~non~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~foliis~~ ^{foliis}
Dum nervos lineata subtus venosa, integerrima, petioli
uniquilari crispis. Pedunculis petioli parum longioribus, hirsutis.
Calyx pilosus intus tomentosus folioli ovati acuti obtusi coriacei

ellipticis acuminatis

Tomentosa Annona foliis ovato oblongis subtus ramis que tomentosis, petalis omni-
bus ovatis, fructibus mucicatis

Annona paludosa, foliis villosis, supra viridibus, subtus nerescentibus;
fructu lutescens tuberculato Aubl. fl. Guian. p. 6. t. 246.

Guianensis fructu tuberculato, minor lutescens Borr. fr. Equinox. p. 53.
Habitat in Guiana Richard

Rami teretes, superne villosi tomentosi ferrugineo tomentosi. folia breviter
reticulata, tri-tripollicaria, ^{vel} interdum 8 pollicaria, acuta, supra ovata glabris-
sima, vix mollia, arena ~~vix~~ ^{vix} nervosa, subtus ferrugineo villosa,

torta, subcostata, pulchre venosa. Petala incana ferrugineo tomentosi. Pedunculis
axillaribus, ^{vel geminis} pollicaribus, tomentosis. Calyx ^{lobato} ^{laciniato} ^{lobis} ^{ob-}
obtusis corollae stipulo brevioribus, acuta. Petala tria exteriora ovali-

formata, uti calycis ^{foliola} ^{to-} ^{mentosa} ^{pa-} ^{rese} ^{pollicaria} ^{acuta} ^{con-} ^{ica} ^{ca-}
similem in herbario Gussonei vidi e Peru, diversa floribus vix unguibus
longioribus, cum fructus mihi ignotus, nescio num specie differat nec ne

arbuscula ~~Indigofera~~ micans axillaribus foliis pennatis longioribus, foliolis linearibus
oblongis pubescentibus, Leguminibus subulatis
Habitat in Guinea West O

~~Caulis ramosus, spithamov, densus, teres, pubescentis et villis raris adpressis,
uti foliola subtus. Folio 8-9 paja, impari pennata: foliola opposita, unguic
ularia, petiolata, obtusa, mucronata - Stipula betacea. Pedunculi capit.
lares: pedicelli aeterni, remoti. Flores parvi, glabri. Legumina angustissima
ma, canescentia.~~

Tomentosa Annona?

Habitata in India Orientali herb. frus.

Rami Verber: ramuli flexuosi, tomentosi. Folia petiolata, alterna, basi cor-
data, oblonga, acuta, subtus nervosa, arenia, supra villosa, subtus tomentosa
acuta. Petioli brevissimi. Flores 2-3. axillares, brevissime pedicellati, parvi.
Calycis foliola ovata. Petala oblonga, extus tomentosa

Congosata Annona Aubl.

Habitat in Guiana herb. Jusf.

Rami teretes, apice sordide cernicentes. Folii petiolata, 6 pollicares, lanice
lata, attenuata, integerrima, supra remote obscure nervosa, basi subovata, utri-
que glabra, acuta.

7 palustris A. foliis oblongis obtusiusculis glabris, fructibus areolatis.

Lin. l. V.

Suav. obs. pag. 223

Annona americana juxta fluviorum ripas in nascentis pyriformi
fructu Plukin. alm 31. t. 240. fig. 6.

Annona aquatica, foliis laninis atro-verontibus, fructu minore
conoidae luteo, cortice glabro in areolas distincto Sloan her?
2. p. 169. t. 220. fig. 1.

Habitat in America ad ripas

Rami teretes glabri. Folia petiolata, ovata venosa, vix acuminata,
utrinque glabra, tri vel quadripollicaria. Florae magni-
tudine annonae mucronatae, petala³ concava, crassa coracae
extus venosa, intus glabra basi sanguinea maculata inte-
riora minus angustiora extus alba, intus atro sanguinea
Bacca magna glaberrima, cortice coracae

— foliis ovatis glabris petalis exterioribus subrotundis acumi-
natis, interioribus^{ibus} dentis brevioribus fructu areolato

Paludosa Aubl. D. ad. d. de fort.

Rami tomentosi ferruginei

~~non~~

~~ad d. de fort. descriptionem e Suav. obs.~~

Longifolia A. foliis linearibus integerrimis glabris fructibus punctatis
reticulatis Aubl. fl. Gu. 1. pag. 615. tab. 240

Habitat in Guisana

non vidi

pubescent. A. foliis laniceolato ellipticis subtus pub. villosis sculis, fructi-
bus tripartitis.

Habitat in Ins. Montserrat In. Ryan.

9 glabra A. foliis lanceolato-ovatis, fructibus conoidibus glabris Linn.
P.V.
Anona maxima, foliis latis, fructu maximo luteo conoide: cortice
glabro Latiff. Car. 2. p. 64 Tab. 64.
Habitat in Carolina 5

11 africana d. foliis lanicolatis pubescentibus Len l. V
Cucurbitaceae fructu subgloboso Plum. gen. 43.
Habitat in America 5

non vidi

12 hexapetala A. foliis ellipticis oblongis acutis glabris, petalis spatulatis
aequalibus acutis Hort. Vew. 2. p. 253.

Annona hexapetala floribus hexapetalis Hen. Suppl. p. 270 + L. V. p.

509

Habitat in China &

Calyc. & triphyllus minutus. Petala 6 aequalia oblonga

~~Annonam a China habui an sua petinet ne ne dicitur sum
rami glabri teretes. folia lanceolata attenuata utrinque glabra
4 pollicina. angustiora quam in reliquis. Peduncululi axillares
3 vel quatuor flori sunt ex specimenis corpore licet. Calycis folio
la ovato. Petala lanceolata, 6. aequali resque supra basin
planam conactata.~~

non vidi

Ambotai A. foliis ovalis acutis integerrimis, subtus ferrugineo tomentosis
Aubl. fl. Gu. 1. pag. 616. tab. 249
Habitat in Guiana

non ordi.

muscosa Cl. foliis oblongis, fructibus areolatis, corollis externis monopetalis. Jacq.
off. Bot. 1. pag. 16

non vidi.

Asiatica Annona foliis lanceolatis glabris nitidis lineatis Lin. Syst. Veg. pag. 109 Hort. Cliff. 222 fl. Zeyl. 225

Annona glabra, hesitata, foliis ellipticis fructu glabro Forst. pag. 102. 4e. Tab. 15.

Annona glabra Burm. Zeyl. 21
Habitat in India orientali

[Linn. J. pag. 73]

202

~~Plum. synonymum verbum omni quibus
e collectione Forst. mihi tantum nota
Stenose Campocolla capsulocarpa, foliis lanceolatis induratis
Habitat in India orientali
Cultus in Horto Cliffortiano~~

recurvatas, caule procumbente. Lin. spec. pl. pag. 857

~~Androsaceum procumbens racemosum, foliis alteris ovatis acumi-~~
~~natis integerrimis floribus axillaribus. A. L. Corf. 205. fig. 1.~~

~~Linaria pusilla procumbens latifolia, flos pallido-virens luteo-pur-~~
~~pureo. L. 755.~~

~~Habitat in Barbano Sultis O~~

Ad. Lym. t. 13.

1. *mundata* A. foliis ovali-lanceolatis glabris acutis, fructibus mucronatis,
petalis ovatis: interioribus obtusis brevioribus Hort. New-2. p. 252
Araticu Ponhe Mani q. Bras. 93

+ *Anona mundata*: foliis ovatis lanceolatis glabris mucronatis
planis pennis mucronatis Lin. S. V. p. 500. 7 Jacq. obs. 10
t. 9. Hort. Cliff. 222 +

Anona Com hort. 1. p. 133. v. 69.

Anona indica latifolia, fructu squamopappo Plukh. alm.
31. t. 134. fig. 2.

Anona indica fructu conoide viridi: squamis veluti aculeato
Plukh. alm. 32. v. 135. fig. 2.

Anona maxima foliis latis splendidibus fructu maximo viride
conoide: tuberculis s. spinulis innocuis apertis Sloan
herb. 2. p. 166. t. 225.

+
Folia ovata subovata Habitata in America Calidore t
venosa nitida utrinque dem. Venter glabr. Polia reticulata alterna, integerrima acuminata
obtusissima, ^{base} basi acuta superne parum ^{late} lateficientia nitida obscure nervosa
glaberrima fructus ^{triv. vel quadrijolliculari} ^{maximo mucronato} ^{acuminato} ^{acillari} ^{pedunculis}
tuberculis acutis ^{lateralis} ^{obtusis} ^{angulosis} ^{sub} ^{obtusis} ^{crassis} ^{foliolo} ^{calycis}
bractea herb. ^{petalo} ^{cordato} ^{ovata} ^{acuminata} ^{nocturni} ^{lata} ⁱⁿ ^{valde} ^{crassa}

^{amplexicaulis}
11 Corymbosa Annona foliis cordato-oblongis canalicatis amplexicaulis, floribus

stellata

Habitat in Tupula Francis Florum

Rami teretes, gabri, cutice cinereo, risoso. oblonga attenuata

Folia alterna, amplexicaulia, cordato-canalicata, obovata
et ultra, bifaria, venis reticulata; acutiuscula, subtus
lucida, in supercilium fiavo purpureo-violaceo.

♀ Peduncululi stellati
in supercilium fiavo purpureo-violaceo.
♀ Peduncululi axillares, sub opales, pletari, prolucis vel paucum ultra.

♀ Peduncululi axilla et longe axillares, sub opales, pletari, prolucis vel paucum ultra.
res, bracte, uni flori Petala canalicata, obtus.

(Similem vidi in herbario Forskalii sed absque floribus)

Annona amplexicaulis: foliis cordato-oblongis acutis dissectis amplexi
caulis de la mark. Encycl. 2. p. 1. p. 128.

204

149 189
130

10 asiatica A. foliis lanceolatis glabris nitidis lineatis Lin Hort. Cliff. 2224

flor. zeyl. 2254

guanabano fructu purpureo Plumpei: 43. ci. 143.

Annona sylvestris Burm. zeyl. 21.

Habitat in Zeylona &

Folia ex parte lanceolata, utrinque glabra, supra nitida, scilicet

duo nervos aliquos sulcata. Rami punctis, lobis hinc
Folia glabra. Pedunculi solitarii intemum trii, pollicares teretes
uniflori penduli petala papilla ita reticulata. Hort. zeyl. glo
foliis, magnitudine pignis, velut ex globulis compositum. 807k

Annona glabra, hes. citata. foliis ellipticis sine serris glabro

Burm. deser. pag. 102. 4c. Tab. 15.

~~non vidi~~ adde Synon et figura 10/12

4) Squamosa A. foliis oblongis acutis glabris, fructibus obtuse squamosis,
petalis exterioribus lanceolatis; interioribus minutis Hort. Kew.
2. p. 253.

Guianensis foliis odoratis fructu subrotundo squamoso Plum.
gen. 43.

Annona indica, fructu est viridi luteo, cortice squamato aperto
nucleis nigricantibus parvis Platin. alm. 31. 8. 134. fig. 3.

Annona squamosa foliis oblongis subundulatis, fructibus obtuse
subsquamatis L. S. V. Gaertn. am. tab. 13. 4. 6.

Atanacum Rheed Mat. 3. p. 21. 8. 29.

Annona foliis odoratis minoribus, fructu conoide squamoso
parvo dulci Hb. Kew. hist. 2. p. 160. 427. fig. 3.

Annona tuberosa Plum. amb. 1. p. 130. tab 46

Habitat in America meridionali.

Tota glabra. Calca petiolat tripollicaria. Pedunculi axillares
solitarii uniflori. ~~Ca interdum biflori vel pluriflori~~
^{memorem} ~~ca~~ Calyx minutus corollae ^{ex parvis} ovatis. Corolla clausa ovato attenu-
ta. Petal. ext. hinc pedicell. Petala lanceolata pollicaria

5 reticulata L. foliis oblongo lanceolatis acutis glabris, fructibus ovatis
reticulato areolatis, petalis exterioribus lanceolatis; interiori-
bus minutis Hort. kew. 2. p. 253.

Annona maritima Inhæc mat. 3. p. 23. t. 30. 31.
Guianensis fructu aureo, et molliter aculeato Plum. gen.

43. Annona reticulata foliis lanceolatis, fructibus ovatis reti-
culato-areolatis Lin. S. V. Jacq. obs. 14

Annona maxima foliis oblongis angustis, fructu maximo
luteo conoide: cortice glabro in areolas angulares distin-
cto Sloan. bot. 2. p. 167. t. 226.

Annona Prunifolia Aubl. 1. p. 136. t. 45.

Habitat in America calidioribus

caulis canisquamis folia vero longiora angustiora et venata
calyx et corolla parvi. Peduncululi laterales interdum plures
prospicimus ad apicem interdum biflori

13 macrophylla. A. petalis 6 subaequalibus - foliis ovato-lanceolatis ^{pubtis} ramis
que villosis

Habitat in India orientali?

Rami villosi-tomentosi ferruginei citi costa foliorum pubtis
folia inferne et pedunculi. Folia brevissime petiolata elongata
gata pedalis attenuata. Calycis foliola ^{alt} subrotunda
Petala sex ^{alterna} intermedia angustiora alterna latiora ovata
pallidiora plasmata numerosa imbricata in receptaculo
lo hemisphaerico incurva basi intus excavata latius
circa elevata apice mucronata an pistilli in medio

an hucus generis an species dellensis?

- 6 *Tripetala* A. foliis ovatis acutis subtus pubescentibus, floribus tripetalis:
petalis lanceolatis ciliatis tomentosis Hort. kew. 2. p. 252.
Guarananus Papeo folio, flore intus albo, exterius virescente
fructu nigricante squamato, vulgo *Chirimola* Cavil. per. 3. p. 24
L. 17.
Anona foliis ovatis acutis, flore albedo ungue purpureo, fructu
coniformi tuberoso nigricante Trew. Eret. p. 16. t. 49.
Annona Chirimola Mill. Dict.
Habitat in America meridionali 5