

Anthemis

x radio albo

1. cota A. florum paleis rigidis pungentibus
2. altissima A. erecta foliis pennatis: pennis dentato-pennatis sed ibasi denticulo reflexo
apice apice spinulosis
3. mantima A. foliis pennatis fidis subdenticulatis carnosis nudis, caule prostrato,
calycibus subtomentosis
4. tomentosa A. foliis pennatis dentato-incisi obtusi planis, pedunculis hirsutis
foliosis, calycibus tomentosis
5. mixta A. foliis simplicibus dentato-lacinatis
6. alpina A. foliis dentato-pennatis integerrimis linearibus caule villosi unifloro
petalis ovalebus paleis spheacelatis
7. odorata A. foliis apice pennatis fidis, pedunculis elongatis, calycibus
membranaceis, radio tenili
8. montana A. foliis pennatis incisis trifidisque in radio pedunculis elongatis
unifloris, seminibus nigris

ule corym

ins

9. chea A. foliis pennatis fidei, pedunculis nudis subullosi
 10. punctata A.
 11. nobilis A. foliis pennato-compositis lineari-bus acutis subullosi
 12. sericea A. tomentosa, foliis pennatis lineari-bus, caule ramofo diffuso
 13. oleracea A. foliis bipennatis lineari-bus planis glabris, paleis setaceis semi-
 nudis
 14. arvensis A. receptaculis conicis. paleis setaceis, seminibus coronato-marginati
 15. ^{ti} ~~Tonum~~ ^{fatti} A. receptaculis conicis. paleis lineari-bus cuspidatis, seminibus
 nudis, foliis bipennatis lanuginosis villosi
 16. cotula A. receptaculis conicis. paleis setaceis, seminibus nudis
 17. pyrethrum A. caulibus simplicibus unifloris decumbentibus, foliis pennatis
 multifidis

xx radice flavo

18. repanda A. foliis simplicibus ovato-lanceolatis repando crenatis
 19. trinervis A. foliis ovatis serratis trinervis oppositis petiolatis, receptaculo
 20. americana A. ^{conico} foliis triterminalibus, pedunculis terminalibus ramo longioribus

ovatifolia Anthemis

Anthemis *ovatifolia* foliis ovatis serratis, ramis superne dichotomis, pedunculis uniplo-
nis fistulosis longissimis. Ortega dec: pag. 73.

Habitat in Pen 4.

Caulis erectus, teres, terpedales, ramosi. Rami diffusi, trifariam villosi. Stipulae acutae
subtriplicinerviæ, rugosae, patentia. Petioli folio triplo breviori, marginibus villosi, con-
nati. Pedunculi e dichotomis, solitarii, nudi, superne incrassati. Calyx hemi-
sphaericus, squama duplici serie, linearibus oblongis, acutis, et venosis majoribus. Corolla
lutea. radius 11-16 ^{floribus} ~~floribus~~ ^{dentati} ~~dentati~~ ^{exterioribus} ~~exterioribus~~ ^{inscensentes} ~~inscensentes~~. Germen ~~triquetrum~~ ^{triquetrum} ~~trian-~~
~~forme~~ ~~tetraquetrum~~ semina radii triquetra, exteriori convexa, hermaphroditiis lineari-
formia tetragona. Receptaculi: conicum. Pales linearis, longitudinali flosculorum
apice luteo cinnato

an huius generis non vide

Anthemium lobata foliis cordatis lobato- sinuatis Ort. Decad. pag. 72.
Habitat in nova Hispania ~~et~~

- Anthemis

Chamomelum montanum in aenum alfarthodes italicum Borel. Ic.

457.

Habitat in Italia herb. musci

Caulis plures spithamei, simpliciter. Sola radicea in aeno, 6 yearata.

habes ^{no} 4 vel potius 3

Anthemis

Chamomelum albatini austriaci foliis argenteis Petw.

Habitat herb. mus.

Caules plures, adscendentes, subramosi

Anthemis

Pyrethrum altemum minus

Barrel-off. 110 8. 4c. 52.

Habitat Herb. Musci

Caulis frequentis, ascendente, spithamoi, simplicis

ovatifolia Anthemis

Ortega

Habitat hies La Neu. la Paus

Caulis herbaceus, striatus, ^{dichotome} ramifus, ^{acuta} superne pubescens. folia petiolata, opposita, peltata, subcordata-ovata, venosa, ^{obtus} subtuplinervia, supra villosula, subt. subcanescentia, subinoqualiter serrata. Petioli ^{et dichotomia} vix semipollicares, margine villosi. Pedunculus ex apice caulis, cum ramo utrinque, elongatus, uniflorus, superne canescens. Et crassior. Calyx duplici serie: foliola lanceolata. Corolla flava, facie Helianthi. Stili rudis non vides. Receptaculum paleaceum paleis lanceolato, colorato serrato. Semina Inguetia. Pappus nullus.

Camomelum orientale abpitha folio Tournef. Cor.
Habitat in oriente herb. Mus.

hobes

Anthemis

Habitat in Madagascar Comeneston herb. Musci

Caulis ramosi, repentes, elongati, herbacei. Pedunculi laterales, uniflori, apice
pubescentes. Calyx imbricatus: foliola oblonga, margine minime fimbriata. Stylus
radii unicus. Semina nuda. Receptaculum paleaceum.

repanda Anthemis

Habitat herb. Fus.

Radice Achilleae agerati. Folcia cuneata, radicalia in petiolum attenuata, bi polluciana: caulina sessilia, polluciana, omnia acute dentata. Caulis spithameus et ultra, superne interdum ramulos, teres, glaber.

pedunculata Anthemis

Anthemis pedunculata foliis pubescentibus, decompositis; pedunculis elongatis
uni²floris, aphyllis; semine bracteato. Desfont. fl. Atl. 2. p. 208.

Habitat in arvis Barbano herb. Desfont.

Caulis erectus, villosus, a basi ramosus: rami alterni, simplices. Folia semipollicina,
petiolata, suprema sessilia, bipinnata: pinnae lineares, villosae, subcanescentes, breves.
Pedunculi terminaliter, solitarii, uni²flori, elongati, apice canescentes. Calycis foliola
marginem tenui nunciant

Anthemis

Chamomelum *Leucanthemum inianum* hispanicum minus Bauh.
prodromus 70.

Chamomelum palustre *Lupitanicum*, absinthii minoris folio Tournef. 9.
R. herb.

Habitat in *Lupitania* et *Hispania* folia c. herb. Mus.

Tolia *capillaris*

herb. no 6.

Anthemis

Leucanthemum vernum orientale folio utulo coarso Robart

Habitat in Oriente herb. musci

Caulis ramulosus, in alio specimenne Caulis plures ascendentes

habet no 13 vel 11.

Anthemis

Chamaemelum alpinum abrotanifolium Tournef. Anst. N. herb. p. 294

Habitat herb. musci 24

Radix superne densius in ramos apice cauliferi. Caulis simplicissimus
Folia mediane

habes

Chamaelea

Chamaelum orientale, indianum mellefolii folio

Habitat in Armenia herb. Tournef

Rauis adscendens, villosus. Folia sesipila, bipinnata, incana: pinnae
lineares. Pedunculus elongatus, unguiculatus, uniflorus. Flor magnus. Polyst-
ambriatus, villosus: foliola ovata. Semina striata, linearia, margine cincta

habes

Anthemi.

Leucanthemum abinthii vulgare folio Vaillant.

Bellis abinthifolia Chiasi Nesfol.

Habitat Herb. mus.

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, fructus, villosus, canescens. Folia petiolata, pennata, incana: pinnis lanceolatis, semipollicaribus, basi trifidis, obtusiusculis. Pedunculi terminales, elongati, uniflori. Calycis foliola lanceolata, margine membranacea, villosa. Pappi albi. Paleae subnerventes. Solum unum alterumve in pedunculo indiviso.

Anthemis

Chamaemelum orientale folus pennatis Tournef. Cor. pag.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis plures, herbacei, teretes, glabri, simpliciter, striati. Folia glabra
pennata, sesipia, crispula, filiformia, acuta. Flores terminali ~~spithame~~
~~et~~ solitarii. Squamae marginae fuscae membranaceae, glabrae, radii
albi.

habes no 17.

anthemis

Chrysanthemum ath. utula folio, hispido squamis, capitulum argen-
teis Raji herb. 3. 212. no 32.

Habitat herb. Mus.

Caulis ramosus, rami ascendentes.

habeo.

Arthemii

Bipithalmum orientale, Tanacet. folio ampliore, flore magno, coriuceo
Tournef. Cor. pag. 37.
Habitat in Hispania herb Tournef.

herbes

1 cota *Anthemis florum paleis rigidis pungentibus* L. S. V. p. 776. Mart. 474. *

Bellis montana, Taraxaci foliis, caule singulari annua Pluk. alm. 65. t. 17. f. 5.

Chamomelum annuum ramosum, cotulo foetida floribus amplioribus, capitulis pinnatis
Monf. L. 3. p. 36. f. 6. t. 8. f. 11. p. 12. Tell. pif. 38. t. 19.

Anthemis italica arvensis annua major vulgatissima flore maximo: disco pungente
Muh. gen. 32.

Habitat in Italia arvis. ☉

Pedunculi vix superne incrassati. Calyx artus vix manifesta apice nigricantibus. Flori
fructiferi disco hemisphaericus, calyce plano, magnitudine Pruni, adeoque in genere
maximus L. M. L. C.

Caulis teres, glaber. Folia sesquipedaliter bipinnatifida: pinnae lineares, puberulae. Den-
tato, glabro, mucrone albedo terminato. Pedunculi ex apice ramorum, plic-
toni uniflori. Semina absque ulla corona herb. Gr.

Caulis erectus, fenuatus ramis rami simpliciter folio bipinnatis: pinnae
pinnatifidae herb. Vall.

ex herb. Muspi

non vidi

manitima Matricaria

melle foliata A.

Receptaculum in planta herb. Royeni omnino paleaceum. Solia superiora
retroflexa, omnium ^{caulium} linearis lanceolata, integra vel extropia lacina
pedunculi elongati, uniflori.

Munster Beck.

Pyrethrum Anthemii

pales membranaceo flexile flosculo brevioris infere granis argutis
res superiore dilatata

2 altissima Anthemis erecta foliis pinnatis: ^{dentato-}pinnis pinnatifidis basi denticulo reflexo apicis.
apice spinulosis
Chamomelum Cuius anthemum hispanicum, magno flore Bauh. prod. 70. Pin. 135.

Chamomelo affine Bupththalmum italicum segetum altissimum Bauh. hist. 3. p. 120.

Anthemis foliorum serraturis pinnatis, radiis florum albis Sauvag. Menp. 285.

Anthemis altissima ~~f~~ erecta, foliis pinnatis: pinnarum basibus denticulo reflexo apicis.
Lin. S. V. p. 776. Pres: pl. 1259 * Mant 474 *

Habitat in Italia, Hispania, G. Narbonensis agris C

Caulis segete altior ramosus, striatus, glaber. Folia sesquialia, crassiuscula, glabra,
pinnata inferiora subsimplicata superiora Pinnis pinnatifidis; ~~basibus~~ ~~exterioribus~~
latioribus dentato vel dentato pinnatifidis apice mucrone albo terminato basi
subtus denticulo reflexo, unde folia subtus aspera. Peduncululi ramosi termi-
nant simpliciter uni flori superne parum incrassati. Foliola calycina ovato
dorso linea viridi subvillosa paleis duplo penna longioribus linearibus extrorsum
latis apice subula longitudine C. si terminatus

parthenum matricaria

Corymbosa. Anth. foliis subbipinnatis linearibus acutis, caule simplici erecto
capitulo villosa, corollulis medio obovatis obtusiformi 5dentatis Gaig. collect
2 - pag. 73

non vid.

4 *maritima* Anthemis foliis pennatifidis subdenticulatis carnosis nudis punctatis, caule prostrato
^{procumbente} calycibus subtomentosis

Potula s. Parthenium marinum minimum Lob. 4.

Chamomelum minimum Dalech.

Chamomelum
Madriniana *maritima* Bauh. Pin 134.

Chamomelum *maritimum* Bauh. h. 3. p. 122.

Anthemis *maritima* annua dorata prostrata, flora albo caule purpureo fructu Murr.
gen. 33. Tell. P. f. t. 19. p. 3.

Anthemis *maritima* foliis pennatis denticulatis carnosis nudis punctatis, caule prostra-
to, calycibus subtomentosis L. Sp. pl. p. 1259* L. V. p. 776.

Habitat in Symplicii, Hircania Italia et Barbana ad littora maris in arena. 4

Caules plures procumbentes demum ascendentes simplicis flosi; teretes, striatissimi
folia emplexicaulia, ^{prolonga} ex. versus dilatata, carnosae, glabra, pennatifida, p. laciniis
basin versus perfin menores infinis frequentiores, integerrime interdum dentae uno
alterove. Pedunculus et apice caulis simplicis flosi uniflorus, nudus.
sinuato angulatus ^{in alio} apice subvillosus. Calyx vellosus. Pales oblongae subtri-
angulatae, dorso carinatae, concavae longitudine flosculorum.

cod. & Pichard.

5 Tomentosa Anthemis foliis pennat. ^{inest, dentato incisus} ~~foliis~~ obtusi planis, pedunculis hirsutis foliopsis, calycibus
tomentosis Lin. Hort. 415 * S. V. p. 776.

Chamomelum, coronopifolio, tomentosum Vaill: act. 1720. p. 412.

Chamomelum maritimum incanum, foliis absinthii coarctato Boerh. Lugd. b. 1. p. 110.

Habitat in Graecia maritima

Caulis vellosus ramosus, sulcato angulosus. Rami erecti: tomentosi. Folia pennata pinnis
extrosis majoribus lanceolato-oblongis, dentato incisus obtusis, tomentosis

Pedunculis terminalibus pollicibus incanis subsessilibus. Calyx tomentosus lobis ovatis
lanceolatis. Corollulae discinae laciniis duabus exterioribus parvis majoribus. paleae flexae

Solia artemisa
glacialis fere
et lineares acuti.

ex herb. mus.

6 miata Anthemis foliis simplicibus dentato laciniatis. L. Spec. pl. p. 1266. + L. V. p. 776.

+ Bellis pumila crenata aequali omnia crenis bicornibus aperiens foliis Plukh. alm. 65.
t. 17. fig. 4.

+ Chamomelum annuum ramosum, coronopifolio, flore miato Mon. h. 3. p. 36. f. 6. t. 18. f. 15.
Chamomelum hispanicum latifolium, f. coronopifolio Breyn. Cent. 149. t. 74.

Anthemis montana lanuginosa annua, foliis crassis pyrethri sapore, semi pappuli ac
bis penta diph. in luteis. Mut. gen. 32. t. 30. fig. 1.

Anthemis foliis singularibus pennato-dentatis Guett. Stamp. 346.
Habitat in Italia, Gallia &c.

Si fingitur optima a reliquis foliis lanceolatis opposita obtuse dentatis, vel sub
pennatis laciniis apice integris vel ~~p~~ dentatis. propositum vero Corollulae diffi-
basi obliqua truncatis altero latere ~~femina~~ ~~teperata~~, seminibus altero latere
a procepsu corollulae testis altero nudo, paleisque radii lanceolati plani, diffi-
vero ~~causa~~ marginibus conae ventibus femina ~~et~~ basi corollulae florens. Ceterum
gaudet caule erecto subsimplici pubescenti pedunculis unifloris pollicibus
apice parvis crasporis
varietatem hortulani hesperis tomentosus Anthemis tomentosa All. fl. Peder.

semichastalei
hyalini

7 alpina ^{ovulibus} Anthemis foliis dentato pennatis integerrimis linearibus caule villosa ^{tormenta} uni floro, ^{petali} paleis sphaerelatis Am. Acad. 4. p. 330 & L. V. p. 776 Jacq. fl. austr. vol. 5. t. 30.

Chamomelum alpinum saxatile perenne, flore albo singulari, calycis nigricante
Tull. p. 39. t. 19. f. 1. Sequ. Veron. 3. p. 202.

Habitat in Alpibus Tyrol, Baldi 24

~~Differt ab Anth. montana cui maxime similes folii pluribus in pedunculo calycibus margini lato fusco, paleis catallidif. basi dilatatis, seminibus marginatis paleis apice sphaerelatis~~

~~Tota villosa herbida digitalis simplicifloris folia pollicaria dentato pennatis nervis brevibus attenuis dentatis. Quomo ferruginea folia interdistinguant. Calyx villosus margini lato fusco. Tubus corollae aequalis femina nuda. Paleae longitudine flosculorum apice sphaerelatis~~

Differt ab Anth. montana cui maxime similes folii pluribus in pedunculo calycibus margini lato fusco, corollulis difsi basi dilatatis, seminibus margini coronatis. Paleis apice sphaerelatis

8 montana Anthemis foliis pennatis integris trifidisque incanis, pedunculis elongatis unifloris
^{feminibus}
Absinthium montanum, ~~chamomelifloro~~ abrotani foemina flore Col. phytob. 1. p. 117.

t. 33.
Absinthium montanum chamomelifloro magno Bauh. Pin. 140. Bauh. h. 3. p. 184.
Bellis incana, Chrysanthemum creticum foliis Boiss. mus. 2. p. 136. t. 98.

Anthemis montana perennis incana et sericea, caulis non ramosis Michel. gen. 33.
Anthemis montana foliis pennato-multifidis planis; laciniis linearibus trifidis,
pedunculo longissimo Lin. Spei. pl. p. 1261.

Chamomelum foliis lanceo pennatis, pinis palmatis, caule folioso unifloro Hall.
h. 706.

Anthemis montana foliis pennatis, pinis integris pinatis-fiducis, peduncu-
li longis erectis unifloris Gouan. Fl. Afr. p. 71.

Habitat in alpebus Italiae, Helvetiae &

^{caulis nulli}
Caulis basi lignosus ramis. Rami simplicissimi erecti basi fere tantum foliosi pedunculum
caulem multoties superantem ^{res} reserant, teretes, subnitenti, striati. Folia omnia
fere ad basia ramorum conferta, ^{tenues} pennata pinatis ^{reserantibus} trifidis ^{reserantibus} & s. in inferiori
parte eorum pedunculi simpliciter pennati. Peduncululus uniflorus palmatis
et ultra uniflorus. Folia Calyx pubescens foliosa exteriora ovata dorso viridia
abique margine fusco interiora apice fuscata. Pappus corollula viridi oblonga depicta tubo
cylindrico aequali. Semina angulata, pappo albo supra plana. Pappus oblongus hirsutus intus

montana Anthemis foliis pennatis: ^{lineari} pinnis trifidis incanis, pedunculo longifloris

Chrysanthe modesi

elegans Aat

9 Chica Anthemis foliis pennatis fissis laciniatis, perianthio nudo subullosi L. Hort. Clif. 415. S. V. pag. 776
Chamomelum chium Vernum, foliis crispis, flore magno Tournef. Cor. 37.
Habitat in Ohio

Eschsch. bipinnatifida: laciniis linear-lanceolatis herb. Royeni

non vid.

4-8 punctata Anthemis ^{Anthemis} foliis pennatis laciniatis subtus punctatis, pedunculis elongatis
unifloris, feminebris coronatis, caule adscendente Tab
Habitat in montibus Barbaro Tunetanis haud frequens 4
Caulis inferne lignosus, ramosus. Rami teretes, simplices, vix villosi,
semipedales.

Folia basi confertiora, superne remotiora, amplexicaulia, glabra,
subtus punctis numerosis impressis, crassiuscula pennata: penna
subpennatifida vel laciniata, dentata, acuta, mucrone minuto,
albido terminata.

Pedunculus terminalis, uniflorus, longitudine ramorum, versus medium
foliolo linear-lanceolato, papiraceo panem incrassatus, pubescentia
obtusiuscula magnitudine Anth. altissimo.

Calycis foliolo ovato-lanceolato, glabra, margine fessio, intus aqua
ferruginea.

Semina alula membranacea, oblonga, ab altero latere coronata.
Palea oblonga, subulata, longitudine glomerulorum, minime pergentes

(Affinis Anth. Chia, ut videtur, ^{illa} num. diversa cum vero mihi ignota
limiter ulterius dare nequeo quibus notis ulterius differre
referre nequeo

14 ramosum B. foliis oppositis lanceolatis scabris nervosis denticulatis ^{pub} ciliatis, ~~caule~~
~~ramis~~ hispido. calycibus foliosis, caule hispido

Bupthalmum ramosum, foliis oppositis sessilibus, lanceolatis, serrulatis, veno-
sis; caule hispido, ramoso; calycibus terminalibus solitariis, obtuse
foliosis.

Habitat in Arabia felici ^{Arabia}

Caulis hispido ramosus. Caela sessilibus lanceolata, adpressis punctis minutis
firmis scabra, demum remote denticulata. Pedunculi terminalis cum
ramulo ulterius excresecente, solitarii uniflori pollicari hispido.

Calyx subnudo. Lobis calycina radio parum breviora lanceolata, ciliata f. s. b.
Radix subrotunda corollae tridentata, ~~ramis~~ purpureo nervosa.
Petalis oblongis apice subangulata nervosa flexilibus facies Helian-
thi.

10 nobilis Anthemis foliis pinnato compositis linearibus acutis subvillosis L. S. V. p. 77 6

Parthenium ad nobilis Chamomilla Træg.

Chamomelum odoratum Dod. pempt. 270.

~~Chamomelum nobile~~

Anthemis seu Leucanthemis odoratus Lob.

Chamomelum nobile seu odoratum Bauh. Pin. 135.

fl. plerumq. Leucanthemum niveum Anglorum flore multiplici Lob. icon.

Chamomelum romanum, flore multiplici Cam. epit. 646.

Habitat in Europa paucis apricis &

Caulis decumbens ramosus. Rami ascendentes teretes subvillosi, virgati. Folia. Folia bipinnata, linearia, acuta. Pedunculi elongati suboppositi sub flore cæcespori

nobile B secund. Synon. Tournef in herb. Vaillant alia planta est.

Caules plures ascendentes purpurascens, subramosi, striati villosi. Receptaculum paleaceum.

1802.

vetenius describenda cum varietate minoris speciei qua diversa videtur corollulis basi dilatatis.

11 Seneca Anthemis tomentosa foliis pinnatis linearibus, caule ramofo diffuso.

Anthemis facta in ali. Boiss. Cat. plant. Egypt n. 457

Habitat in Egypto

Folia tomentosa perniciana Caulis ramofus diffusus striatus. Folia petiolata, pinnata
pinnis linearibus obtusifolia, integra supremo interdum extrosum denticulo. pedun-
culi ramo et ramulo terminant solitarii uniflori saepe pollicares saepe apiculi
apice parum crassiores. Flores magnitudine cotulae, foliola calycina lanceolata
concolora. Tubus corollae aequalis feminae apice membrana tenuissima. Paleae hyalinae
flexiles lanceolatae.

12. *Compositae* Anthemis foliis bipinnatis lineariis planis glabris, paleis setaceis seminibus nudis
Anthemis ^{parvensis?} ~~arvensis~~ Forst. C. pl. Egypt. n. 455.

Habitat in Egypto

Caulis ascendens debilis ramosis glaberrimis reliqua planta, fruticosa. ^{obovata} folia ^{versis}

pinnae bipinnatis
triflorae.

modica, bipinnata pinnae lineares, acutae, planae petiolis communis foliaceis planis
Pedunculi terminales pollicares. folia calycina tenera, linearia. Pappus setaceus
longitudine flosculorum. Flores duplo minores Anth. arvensis habitus arvensis

13. arvensis Anthemis receptaculis conicis: paleis flaccis, seminibus coronato marginatis Fl. Suec. 768. p.

S. V. p. 776

Cotula Brunfels.

Anthemis Chrysanthemum herbaceum L.

Chamomelum inodorum Bauh. Pin. 135.

Habitat in Europa. S.

Canescens. Caulis diffusus, ~~foiatus~~ a *Cotula* distinguitur pedunculis striis pauciori-
bus 4. s. Folia magis canes inodora. Squamulis interioribus calycis apice dilatatis mem-
branaceis. Paleis lanceolatis. Apice seminum margine tetragono corollatis.
Lin Fl. Suec. L. c.

Descript. Foliorum desideratus et spec: mel. nus herb.

peregna Antkemi ha D. x

Mejoro

punctata ~~Anthemis~~

14 ^{Triumfetti}
~~ae~~ ^{ae} ~~naica~~ ^{naica}

^{Capparis Cupridoti}

Anthemis receptaculis conicis: paleis oblongis mucronatis, feminibus nudis, foliis bipinnatis
Lanuginosis villosis Gaerq. & Auct. t. 44. l. 5. p. 776

Habita

Taraxacum montanum tenuifolium flore candido Boic. mus. p. 2. p. 33. t. 25.

Buphthalmum taraxaci minoris folio exotium Pluk. alm. 73.

Buphthalmum alpinum flore candido Triumf. off. 79

Chrysanthemum taraxaci folio, flore albo montanum Barrel. t. 466

Chamomelum triumfetti All. 686 ^{ol. Ped.}

Anthemis caustriaca Gaerq. pl. Auct. t. 44 &

Habita in apicis

Anthemis tridentata B. Lin. Sp. pl. p. 1263 *

Habita in apicis saxosis, et passim collium &

Similis Ant. tinct. folia latiora superiora pennata. pennis pennatis pedis serratis
mucrone albo terminatis. omnia robustiora. Pedunculi breviores. Paleae an
quiterae lineares seta rigida longitudine paleae terminato. Radix albus bup
flavescens

off. ~~antem~~

19 Cotula Anthemis receptaculis conicis: paleis setaceis, fimbriis nudis L. S. V. p. 116.

Cotula fetida Parthenii 4. speciei Brunf

Cotula fetida Lob. Dod.

Chamomelum fetidum Bauh. Pin. 135

Chamomelum fetidum s. Cotula fetida Bauh. h. B. p. 36

~~Habitat~~
Habitat in Europa meridionali prope in Lirano ©

Tenuior quam in versis specie Chamomelle. Caulis absque canescentia. Caulis erectus striatus. Folia bipinnata pinnis linearis setaceis. Pedunculi nonnulli ad apicem subradiaphylli apice parum in vas fati villosa subniana. Paleis minutissimis setaceis. Semina absque corona

16 *pyrethrum* Anthemidis caulis simplicibus unifloris decumbentibus; foliis pennatis multifidis
L. Sp. pl. pag. 1262. * L. p. 776. Mell. fig. t. 30

Pyrethrum Baumf.

Pyrethrum officinarum Col.

Pyrethrum flore Bellidis Bauh. Pin. 148.

Chamomelum fucosiflore, radice longa ferrida Shaw aff. aff. 138.

Habitat in Arabia, Syria, Creta, Apulia, Thuringia, Bohemia, Montpelii, Apennini

no 4
Caulis plures, prostrati, simplicis uniflori, rarius ramosi. Radius floris albus subtus
purpureus. Radix coarsa, sapore Polygalae Senega. L. Sp. 1. c.

Austriaca Anthemis

17 repanda Anthemis foliis simplicibus ovato-lanceolatis repando-crenatis. L. Spec. pl. pag. 1262 *
L. V. pag. 776.

Chrysanthemum parvum f. pellis lutea parva latifolia Bauh. h. 3. p. 105

Chrysanthemum lusitanicum, aegerati folio Tournef. ~~Cond.~~ F. R. H. p. 492.

Habitat in Lusitania, Hispania.

Caules simplicissimi, erecti. Folia ovato-oblonga, repando-crenata, petiolata, alterna, obtusa vix villosa. Flores terminales subsolitarii globosi; Calyx minus imbricatus. Radius angustus; Discus convexus flavus. Semina tetragona, coronata squamis quatuor, quarum duae in partem desinent L. Spec. l. c.

non vid.

repens A foliis simplicibus ovato lanceolatis obsolete serratis, caule a
pende Walt. f. Carol. prog. 211.
Habitat in Carolina

non vid.

10 trinnervia Anthemis foliis ovatis serratis trinerviis oppositis petiolatis, receptaculo conico Lin
Suppl. sub nom: Anth. americana pag. 370 S. V. p. 777

Habitat in America meridionali.

Caules erecti, subpubescentes, simpliciter. Folia opposita, petiolata, ovata, serrata, glabra,
discolora, trinervia. Pedunculus terminalis pubescens, involucratu uniflorus. Flo. radii
et disci luteae. Radius ovato-oblongus, obtusus, indeget quinqueflorus. Discus alvatus
paleaceus: flosculis quinquefidis. Stamina radii et disci obovata hereditaria
verniceosa, absque Pappo. L. Suppl. l. c.

19 Americana ^{anthemum} foliis ternatis, pedunculis terminalibus ramo longioribus. ^{Bot. Cliff. 414.} S. V. pag. 777. Sp. pl. p. 895.

Chrysanthemum humile, ranunculifolium Plum. Spec. ic. 86. f. 2.

Chrysanthemum palustre minus numquam repens, apicifolium Sloan Jam. 126. h. 1. p. 263. t. 153. f. 2.

Raji suppl. 215.

Bupthalamum foliis ternatis, p.

Bidens apicifolia Am. acad. 5. p. 405.

Verbesina mutica foliis trifido laciniatis serratis, caule repente L. Spec. pl. p. 1277.

Habitat in America meridionali ☉

Calyx *Bidentis* semina *mutica*, ad diversum genus forte spectat.

odorata Anth. foliis apice pinnatifidis, pedunculis elongatis, calycibus membranaceis, radio
sterili Hort. kew. 3. p. 230
Habitat in Cap. b. Jui 7

non vidi

20 tinctoria *Arthemisia folis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso* L. Spec. pl. pag.
1263. V. p. 777. 8. L. Dan. t. 74.

Buphthalmum Trag. Lab.

Buphthalmum vulgare Pluf.

Buphthalmum Sieffoides Bauh. Pin. 134

Chrysanthemum foliis tanacetii Coef. Bouf. 47. t. 9.

β. *Chamomelum asjoides* All. fl. Ped. 681.

Santolina flava Torr. Desf. pag. Cat. pl. fl. Coef. n. 356

Habitat in vacis, germania apud praesidia. β. in Italia Europa australi &

caulis erectus, purpureo raris striatus, villosus. folia superiora pinnata: pinnis linearibus argute serratis. Peduncululi et apice ramulorum elongati uniflori solitarii aphylli. Calyx pubescens. Paleae oblongae setae rigidae flavae longitudine glaberrimae terminatae. varietas β. differt modo defectu radiorum.

absque radiis
Tanacetifolium La Mart. herb. L. M.

Vindonia Anthemis ^{anthe mis} foliis bipinnatis serratis, subtus tomentosus. caule corymbose
L. S. V. pag. 777.

Santolina flava Torst. Catal. Syst. fl. Const. pag XXXI. no 356.

Hall fl.

Chamomillum discoidium ~~fl.~~ ^{anthe mis} Padumont. Tom. 1. pag. 100 no 681

Defectus radicis non sufficit pro specie distinguenda, non raro enim
eadem aeternae observatur in quam plurimis spec. Chryf. Matricenis
Anth. ^{anthe mis} affinitus

21 arabia *Arthemis* caule decomposito, calycibus ramiferis L. S. V. p. 777. Hort. Cliff. 413. t. 24. Hort. Ups.

264

Athenicus annuus - *Triantophonus croffai* arabicus dicitur Shaw afr. 50. t. 36. fig. 50.

Habitat in Arabia ☉ ☉

globosa *Antennaria folio bipinnatis*: pennis decurrentibus pin-
nulis multifidis: pedunculis dichotomis Ortega dei. pl.
nov. pag 46.

Habitat in Regno mexicano.

Herbaceus. pilosus. Caules plures erecti, teretes, ramosis.
Folia orbem laciniis lineares. Pedunculi terminalis-
uniflori, longi. Squaræ interiores calycis auctæ. Corolla
lutea. Corollula radii bifida. Paleæ semibus longior

non vid.

21. *Vindonia* A. foliis inferioribus bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule ~~complanato~~

22. ^{bofo} *arabica* A. ~~caule prostrato~~, caule decomposito, calycibus ramiferis

1 *Chamaemelum alpinum abrotanifolium* Tournef. 9. v. h.

2 - Barrel. c. 529.

folia simplicia pennata

3 - *Chamaemelum abrotanifolium austriacum* foliis argenteis

4 - Barrel. 4i. 457.

antheris squamis margine nigris, caule villosis

5 anonyma

Chamaemelum alpinum abrotanifolium
folia et caulis ex apice radicis ramofi.

hab
maj
red
resp