

Anthericum

undulatum Anthemicum

Habitat. herb. Ausf.

Folia duo radicalia, spatulata, glabra, lineana. Scapis filiformis, polli-  
canis?, simplex, superne pilosus. Flos approximati 2-10. Bractea membra-  
nacea, attenuata, in setam, canaliculata. Pedicelli capillares, hirti, uti  
colla extus, fere pollicares, bractea dimidio longior.

manducium Anthemicum.

Pseudo-*Asphodelus* aconifolius luteus manducium Roy hist 3. p. 560  
*Asphodelus* albus flondanus gramineis foliis, floribus parvis et herbaceo  
pallidioribus Plukn. a malth. 48.

Habitat in manducaria herb. Guss.

Folia plurima radicalia, ensiformia, vix semina quam lata, semi-pedalia,  
nervosa, acuta, duo in caule, remota, basi vaginantis. Scapus teres, sesqui-  
pedalis, glaber, inter flores flexuosus, villosus. Flores racemosi, distincti  
parvi: pedicelli quatuor simul, villosuli. Petala lanceolata, Stamina  
aequalia. Stylus unicus.

marginetum Aeth foliis oblongis obtusis marginatis sicapo simpliciter breviori  
bus, rariore <sup>umbellato</sup> ~~subradiato~~ Thunberg prodr. pag. 63.  
Habitat in Cap. b. p. i.

non vidi

macrophyllum Anthericum foliis lato lanceolatis, racemo cylindrico longissimo

Habitat in cap. b. p. 2

Folia altitudine scapi <sup>loquipedalia</sup> ~~crassitie~~ pennis cygneis pollicibus b. lato  
et ultra. Scapus crassitie pennis cygneis. Racemus floribus numero  
si parvis bracteis linearibus longitudine pedicellorum minime albi  
filamenta glabra

est 1880

ex floribus Hort. Vew.

Corypholobos Amaryllid. spatha multiflora, corollis campanulatis equalibus, genitalibus  
declinatis, scapo compresso longitudine umbellae Lin. S. V. p. 310.

Liliaceae africanum humile, longifolium foliis, polyanthos saturato colore puppa  
rasens Herm. parad. 195. t. 195.

Habitat in Africa

brevifolium A. foliis canaliculatis brevissimis, floribus remotissimis

Thunb. prod. pag 62.

Habitat in Q. b. p. n.

non vidi

*Pellaea* Anth. filamentis glabris foliis sublancoeolatis planis utraque polo  
lis ciliatis, pappo simpliciter glabro Saeg. coll. 5. *Pi. var.*  
Tab. 416.

non vidi



Ursellum autem filamentis lanceolatis glabris, foliis lanceolato-linearibus  
planis nitidis, scapo simpliciter racemo corymbose terque. coll. 5  
7. rar. tab. 417.

non vid.

*brachycaulis* Anth. filamentis glabris radice fasciculata foliis lanceo-  
latis linearibus carinatis, sicis racemosis simplicibus, bracteis subbifloris  
Jacq. coll. 5. Ic. rar. tab. 410

non vidi

flexifolium Athenicum foliis subulatis glabris flexuosis<sup>4</sup> Lin. Suppl. pag. 201. S. V. pag.  
331.

Habitat in Cap. b. spei.

scapo ramoso  
longioribus

non vidi

canaliculatum Anthericum foliis subcarneosis pilosis ensiformi Inquetris latere  
angustiori canaliculatis, si apo simplicii Hort. kew. t. p. 448. \*

Habitat in P. bono pui 2,

Caputares, pilosus. Racemus multiflorus. Pedunculi teretes glabris  
viciales. Bractea lanceolata acuminata, sub anthesi pedun-  
culo breviores, glabris. Petala patula, alba, dorso sordide vireo <sup>centa</sup>  
semiunicata. Filamenta subulata, petalis breviora, hippidiuscula  
una alterna breviora, minus hippida. Stylus longitudine filamentum  
Hort. kew. l. c.

an hesperum Thunb. non vidi

*Salicatum* Anth foliis ensiformibus salicatis glabris, scapo ramoso thuiat  
nostr. n<sup>o</sup> 63.  
Habitat in Cap. b-pai

Lin Suppl

michi non notum

ciliatum Anthenicum foliis exiformibus carnosis subtriquetris ciliatis scapo simplici,  
ratemo longissimo Lin. Suppl. p. 202. P. V. pag. 331.

Habitat in Cap. bono spei 2

Folia longissima carnosula

non vid.

*Cat. folium Anthericum foliis carnosis lato ensiformibus; racemo longissimo, paucifloro*  
Linn. Suppl. pag. 202. S. V. p. 331.

Habitat in Cap. b. per

Caulis glaber teres. Folia caulium amplectentia, lato lanceolata, attenuata, 3-4 pollicaria. Racemi axillares & terminales compositi. Pedicelli alterni basi folio lanceolato. Pedicelli gemini, uniflori. Corolae nutantes. Petala oblonga, unguicularia, apice petala duo divergentes herb. Mus.

an eadem cum floribundo nunc hanc not

~~fructuoso~~  
~~fructuoso~~  
~~fructuoso~~  
Anthemicum foliis carnosis ~~subulato~~ ~~serotibus~~ ~~fructu~~  
~~fructuoso~~ caule ~~fructuoso~~ Lin. V. p. 330.  
Phacelum capense caule ~~sero~~, foliis ~~capitis~~ ~~fructuoso~~ D. M. Edth. 340. L. 231.

fig. 298.  
Habitat in Q. bono fructu

~~fructuoso~~ ~~marginata~~ ~~aperta~~ ~~dos~~ ~~aperta~~ ~~at~~ ~~fructuoso~~  
~~caulis~~ ~~serotibus~~ ~~com~~  
Caulis fruticosus carnosus. Folia alterna amplexicaulia approximata  
teretia valde attenuata pedalia. Racemus lateralis, semipedalis  
~~ante~~ ~~fructificationem~~ ~~mutans~~ pedicellis parvis superne confertis  
Bractea cordata subulata longitudine fere pedicellorum.

fructuoso Anth. foliis carnosis subulato serotibus caule fruticoso

~~specimen herbarii botanici fructuoso non recedo~~



aloides arthenticum foliis lanceolato-subulatis carnosis planiusculis Lin. l. v.

noy 330

Chalargum capense sepile, foliis alve formibus pulposi Dill. leth. 372.

L. 232. fig. 300.

Bulbacea aulis Hort. Cliff. 123.

Habitat ad C. bonospei 4

Folia perithamoa valde attenuata sepe duplo breviora. Capitulum  
pedalis simpliciter fructus racemus simpliciter apice nutans. Pedicel-  
li sparsi patentissimi. Petala fulva canna obfusa. filamenta  
Corolla breviora apice hispida. Stylus longior in corolla

*Sarcophum anthericum* floribus flavis pedicellis longitudine bracteatum

Habita in cap. b. p. p. i.

*Sarcophum* Anth. foliis carnosis semiteretibus. Stipulis brevibus, racemo  
erecto. Longissimo. Thunb. prodr. pag 63

filamenta glabra

specimen imperfectum

adest adhuc in herbario a luid. anther. incompletum ignotum

Specimen Pinum

*Asphodeloides Anthemicum* foliis carnosis subulatis semiteretibus fistulosis. L.V. p. 331.

Habitat in Othoua 4

Folia pithamosa sicca latiora supra graminum plana. Scapus erectus  
fistulosus. Pedicelli remoti. Flores nutantes. Bractea  
ovata acuminata pedicello quadruple minor. Flores flavi

*Gnatepennis Anthenicum* foliis carnosis teretibus, caule fruticoso Lin. I. V. p. 330

*Bulbine caulescens* Hort. Cliff. 122.

*Phalangium capense* caulescens, foliis oppositis succosis Dill. Elth. 310. t. 251.

fig. 298.

Habitat in C. bono p. 1/2

annuam. Anthemicum foliis carnosis subulatis & ~~et~~ trifidiis, siapo subracemoso  
Lin. S. V. pag. 331. Hort. Ups. 834

Habitat in C. bono pei ☉

~~Folia e radice numerosa, fere pedalia~~  
procedenti simillima, sed primo anno floens, caule et foliis venenosis  
ut in capite li.

micurum Anth. foliis carnosi trigonis micurvis brevissimis, radicibus  
elongatis cernuis Thunb. prodr. pag 62.  
Habitat in Cap. b. pra.

non vidi

municatum antheicum foliis carnosis compressis mucronatis serratis Lin. Suppl. pag. 202.

P. V. p. 331.

Habitat in P. boracpei

Folia longa scaberrima. Scapus bipedalis, hirsutus prosterior ramosis Lin. l. c.

non ad:



hispidum Anthenicum foliis linearibus dispersis scapo <sup>simplicissimo</sup> hirsuto longioribus  
Anthenicum hispidum: foliis carnosius compressis hispidis Lin. Spec. pl. pag. 446  
\* L. V. pag. 331.

Habitat in Cap. b. spec. 7

Radix descendens. Caulis utraque attenuata basi pilosa. Scapus pedicellatus  
pedunculis interdum frithambusculis superne hispidus. Racemi terminalis  
pedunculati conferti, inferiori primam florat, superioribus longioribus. Brac-  
tea lanceolata, hyalina carnata valde attenuata longioribus pedicellato  
rim. Corolla pilosa. Petala linearia, <sup>alba</sup> dorso linea viridi

Anth. hispidum filamentis mucatis acule foliis hispidis pulpa  
su; scapo hispido Jacq. coll. 5. 72. var. Tub. 409

planifolium Anthemicum foliis planis, scapo ramoso, filamentis lanatis  
Pseudo-sphodelus luteus pinnatus Ches. herb. 190.

Centunculum planifolium? foliis planis, scapo filamentisque lanatis  
in mans. 2247 s. v. p. 330

Habitat in Lusitania, Asturia. Barnades.

Radix crassa, oblonga flavescens. Folia radicalia scapo altiora  
basi vaginantis, glabra, striata, subinnata. Scapus superne  
parum flexuosus ramosus. Bractea lanceolata. Pedunculi sub  
racemosi. Flores exili subis, magnitudine Ant. ramosi, intus flavescens.  
Filamenta lanata alba, basi apicque rufa. Stylus staminibus  
brevis

*Arundum A. scapo paniculato, foliis lanceolatis, filamentis separatis*  
*to Forst. prod. fl. Austr. p 24*

non vidi

adenanther

nutans Anth. filamentis barbatis aciculae radice diversa, foliis suberiformi  
bus planis pulposi patulis Gaëqu. Coll. 5. f. c. var. tab. 407

non di.

promosum Anth. acaule filamentis barbatis radice difformi promota foliis  
subtriquetris supra sulcatis basi vaginantibus dissectis pulposis  
Jacq. coll. 5. 4c. var. Tab 406

non di.

Corysacum Anth filamentis barbatis caulibus fruticosi bracteosis, foliis  
subulatis semiteretibus pulposi foeci qu. coll. S.

400 rar: tab 404

non vidi

rugosa forma Anth. sicula filamentis barbati radice foliis <sup>pulposi</sup> ~~crispis~~ pubula  
tis supra sulcatis apice dentibus saepe coll. 5  
7 con var. 6.405

non vidi



rostratum Anth filamentis barbatis, caule fruticoso radice ante brevissimo, foliis  
subulatis venetibus pulposi haecqu. coll. s. 4c. var. pag 403

non vidi

apheylum *Ant. radice bulbosa Forst.*  
Habitat in Arabia

Ant. ignota