

Anthemium

Phalangium canadense non iam opem lili convalle folio 2. d. 2.

Anthemium Adenanthem est
Diantha ex horto parisi. ~~et~~ Dianella

Anthemium reflexum Cavon. off. ^{no} pag. 174

Japonicum Anthemicum foliis exiformibus convolutis glabris, scapo ramofo
angulato, floribus micropis cernuis Thunb. fl. Jap. 1304

Habitat in Japonia, China, Java

Folia subradicalia, apice valde attenuata, glabra, coriacea erecta
pedalia. Scapus angulatus ramofo, bracteatus, flexuosus
erectus, glaber, longitudine foliorum. Flores in ramulis et ramis
seape, cernui, albi, decidui. Filamento subulato brevifloro
Thunb. l.c.

reflexum Athenicum, Atheni con nato Caran. fi. vol. 3

pag. 21. Tab 241

Habitat 4

non vidi

os sefragum Anthericum foliis ensiformibus, scapo simplicii squamoso ascendente

Apphodelus luteus palustris Sad. pempt 200

Pseudo apphodelus palustris anglicus Bauh. Pin. 29.

Narthecium Moench. in Act. N. C. 1742. p. 309. t. 5. fig. 1.

Anther

Anthericum os sefragum foliis ensiformibus, filamentis lanatis. L. V.
p. 330 Gmel. Sib. 1. p. 73. t. 10 fig. 2.

Habitat in Europa borealis uelignosis

Radix repens. Folia striata, scapo dimidio breviora. Scapus ^{ascendens} spitha-
mosus sphaeris squamis lanceolatis aridis inferne vaginantibus
3-7. Racemus terminalis, pollicaris. pedicelli erecti longitudine
florum, bractea longitudine pedicelli. Petala lanceolata. fila-
menta lanata

japonicum A. folus convoluti glabris, stipis ramis angulatis, foliis
micropis cernuis. Thunb. fl. japon.

Habitat in Japonia

non vid.

Jacquinii S. floribus racemosis nutantibus, bracteis ^{bracteis} inequalibus, petalis
alternis angustioribus. Jacq. coll. 1. p. 64.

non vidi

subtrigynum. ~~Anthemium~~^{Anthemium}

Anthemium subtrigynum Gaerq. coll. 3. pag. 273.

Habitat in Carolina

totoglabr. Caulis semipedalis erectus vix supra folia squami foliacei spatii
Folia caulina canaliculato-eripiformia, acuta integerrima angusta
caule breviora, sparsa. Racemus terminalis erectus. Bractea subro-
tunda parva feminea. Pedunculi numerosi, femineales. Pata-
la pallide virentia. Germen unguiculatum ad 3 stylos attenuatum.
Gaerq.

non vidi

Compositum Aeth. foliis ensiformibus glabris, scapo saepe comoso. Thunb
prodr. pag. 63.
Habitat in Cap. b. Spei.

non ed.

contortum Anthericum foliis planis exiformibus, caule ramoso, floribus remotissimis
Lec. S. V. pag. Suppl. pag. 202. S. V. pag. 330.

Habitat in Cap. b. h. e.

Folia linearia spithamea. Caulis et rami filiformes. Pedicelli inferiores
terminales gemini superiores solitarii. corollae cernuis contortis.
filamento glabra

an. fastigiatum Ges. h. e.
an. d. d. h. in herb. adhuc exortum

cauda felis Anthericum foliis canaliculatoconfiformibus, ligapo simplicii, racemo oblongo

Lin. Suppl. p. 202. L. V. pag. 31.

Habitat in Cap. bono spec

sed dubito num specimen herbari vel huius
vel ad Layonum pertinet

nauciflorum Anth-folus copiformibus canaliculatis flosculis brevibus,
bracteis oblongis erectis Thunb prodr pag. 63.
Habitat in Cap. 6. p. 1.

nauciflorum

mutans A. foliis linearibus - ensiformibus canaliculatis si apote
ricibus, in cano ovato cernuo Thunb prod. p. 63.
Habitat in Cap. 6. p. 63.

non vidi

undulatum Auth. foliis capiformibus falcatis undulatis sicapo longiori
bus Thunb. prodr. pag. 63.
Habitat in Cap. 6-mei

non vidi

Limbratur Anth. foliis linearibus corymbis glabris marginibus mucronatis,
sicaps ramis glabris Thunb prod. pag 63.
Habitat in Cap. b. pra.

non ord.

Bulbiferum Anthemicum foliis caespitibus ^{canaliculatis} apice bulbiferis

Habitat in India orientali
glabra

prospitum basi

Folia palmata utrinque attenuata, apice truncata plerumque terminata
bulbo carnoso, oblongo transv. et apice longitudine foliorum a medio
ad apicem florens. Pedicelli prospitum unguiculari postea sum florem
persistentes recurvi. Flores parvi conici. Filamenta glabra.

Lagopus A. foliis linearibus caespitiformibus siliis simplicibus brevioribus,
radice erecta longissima Thunb. prodr. pag 63.
Habitat in Cap. b. pra

mihi non satis nota

Anthericum foliis canaliculato ensiformibus, racemo tereti Congo.

Habitat in Cap. bono spei

Planta pedalis folia plura 3 lineas lata, spithamea. Racemus palmaris
e floribus numerosis erectis. pedicelli filiformes. Bractea canaliculato
pedunculo longitudine pedicellorum.
filamenta glabra

~~anthericum folio lanceolatis~~ an *A. lagopus* Thunb

Aster amurensis spatha multiflora, bracteis sequalibus campanulatis, lina foliis dyctis
inimpendentibus lina supra p. 95. L.V. p. 320
Habitat in C. b.

elatum Anthericum foliis planis, scapo ramofo, peduncululis aggregatis corollae
planis Hort. kew. 1. p. 446.

Apphodelus foliis planis, caule ramofo, floribus spais Mill. 4c.

30. 56.

Habitat in C. b. spei 4

non vidi

Triflorum Anthemicum foliis canaliculato-ensiformibus, scapo simpliciter, bracteis remo
to trifloris Hort. Kew. 1. p. 440.
Habitat in Cap. bono spei 2

michi non notum

albucoides Anthenium foliis lanceolatis canaliculatis glabris margine Castilagineis,
capo simplici Hort. kew. 1. p. 449 *

Habitat in Cap. b. p. 4

Capus semipetalis. Flores rariore distantes. Bractea lanceolata attenuata
to purpureo-ferbis margine albidis, pedicello dimidio breviores. Pedicelli
peltatis. Petala alba canna lata purpureo-ferbis vel lutea canna
crudi; apice fornicatis. Petalorum patula filamenta supra basin
non complicata ut in Albuca

Lilium anthericum foliis planis scapo simplicissimo, corollis campanulatis stamini-
bus declinatis L. S. V. pag 330

Phalangium Calchamp. hist. 152.

Phalangium allobrogium alterum Clus. eur. post. app. alt.

Phalangium magno flore Bauh. Pin. 29

Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogibus &

Folia ^{laevigata} ensiformia, laetiora quam in precedente scapo breviora. Stipulae
pedalis. Flores ~~terminales~~ ^{terminales} versus apicem alterni & b. pedicellati nitenti-
ss. lili albi, sequipolliares. Bractea subulata membranacea
pedicellis duplo longioribus

Planta spontanea pedalis foliis subulatis angustifolia sub filiformi
m. lili

Lilago Anthemicum foliis planis, scapo simplicissimo, corollis planis, nisi tello dente
nato Lin. S.V. pag. 330 *Paquet. hort. t. 23. Pl. Dan. 616*

Phalangium non ramosum Lobel. Ic. 40.

Phalangium parvo flore, non ramosum Bauh. Pin. 29. Monf. hist. 2. p. 333. f. 24.
D. 1. fig. 10.

Habitat in Helvetia germania Gallia &c.

Folia

Scapus erectus sulcatus. Racemus ^{terminalis} ~~terminalis~~ ^{frithanous}. Pedunculi
erecti pollicares, inferius reliquis longior multiflorus. Bractea
subulata, vixis pedicello longior. ~~petalis~~. Petala linear-lanceolata
acuta. Flores copiosius 3 pl. minoribus quam in sequente

differt a sequente racemo multifloro, floribus erectis patentibus 3 pl. minoribus

græcum Anthenicum foliis planis scapo simplici, floribus cymboſiſ filamentis
lanatis Læ. ſpec. puz 444* L. f. p. 330

Bulbocodium græcum, myofotis flore Tournef. Corol. 50.

Habitat in oriente ~~in~~ ad D. Desfont. herb. Tournef.

Bulbus. Tollea linearia, glabra, longitudine ſeſe ſcapo. Scapus ſimplex
foliis 3. ſ. 4. brevibus. Corymbus terminalis, ſubſequens florus:
pedunculo intermedio unifloro; lateralibus bifloris. Corolla alba
ant. ramiſi. Stamina corolla breviora et ſtylus ſtaminibus brevior
Læ.
Paulis fili formis erectis, ſape ſpithameis, ſimplex. Folia radicalia linearia,
caule parum breviora; caulina ſubulata. Flores terminaliter 1. 2. 3.
pedunculati. Petala unguiculata linearia, obtuſiſcula

floribundum Anthonium foliis planis glabris linearis lanceolatis acutis, basi
simpliciter, racemo fruct. floro cylindrico compacto, petalis patentibus,
filamentis glabris Hort. Kew. 1. p. 447.
Habitat in C-bono pui 4

ramosum Anthericum foliis linearifolulatis planis, scapo ramoso, pedunculis solita
nis, corollis planis, pistello recto Hort. Vrew. 1. p. 447.

Phalangium majus Camer. Epit. 500.

Phalangium parvo flore ramosum Bauh. Pin. 29.

Anthericum ramosum. foliis planis, corollis planis deciduis H. Gottl. 1784
Flor. Suec. 204

Anthericum ramosum foliis planis scapo ramoso corollis planis, pistello
recto Len. S. V. p. 330

Habitata Europa australis regionibus calcareis 4

Folia frata, scapo breviora. Scapus pedalis vel ultra ramosus
rami ^{impendenti} alterni, remoti, fruticatosi, patentes, Coleolum subulatum
ramo brevior, pedicelli ramosi breves, alterni distantes, squamula
sub pugulo - Corolla minor quam in inflorescentibus brev

exuviatum Clath filamentis glabris, radice bulbosa, foliis subulatis extus
convexis intus concavis basi vaginosa mucosa intus, scapo simpliciter
Taequ. Coll. 9. p. 70. var. Tab. 415.

Aspidium Auth. foliis lineari-lanceolatis, saepe ramosis brevioribus, ra-
cemo longissimo Thunb. prodr. pag 69.
Habitat in C. b. pei

undulatum. Anth. filamentis glabris rudis fasciulae, foliis lineari-
carinatis prope ramulo petalis alternis undulatis. Colles
#c. var. tab 411.

non vidi

Squamium Anthenicum Scapo squamis membranaceis tumidis imbricatis Lin. Suppl. p. 202.
L. V. p. 331.

Habitat in P. bona spei

Radix tuberosa: tuberosus oblongis, tomentosis, pluribus, filo pendulis. Folium
una radicalia, graminea, palmata in quibusdam transverse plicata.
Scapus pollicaris, brevis, basi undique cinctus paleis membranaceis, dia-
phanis amplexicaulibus, sublanicolatis, laxis. Racemus terminalis,
e paleis scariosis hyalinis, acutis finis. Pedunculi inter singulos paleas
foliariis, pubescentes, filiformes, longit. ut in palearum, uniflori
Corolla infundibuliformis, etius subpubescens, sexpartita. Tubus cylin-
dricus. Limbus acutus carinatus, longitudine pedunculis: carina
nuda. Stamina limbo dimidio breviora. Stigma simplex. Capsula
globosa carnea. Media planta inter Hyacinthos, Ornithogala
O Anthenea. Radix tuberosa idem non ornithogalum, Hyacinthus
vel scilla. var. sicut folius hesperis et glabris l. l. c.

non vidi

Sedum Anthemicum folis planiusculis, scapo unifloro Lin. Mart. 365. S. V. pag
330 Fauci. Auct. vol. 7. 30

Pseudonaris foliis gramineo foliis Bauh. Prodr. 27. P. 51.

Bulbocodium alpinum junifolium, flore unico intus albo extus squalide rubente
Raj. angl. 3. p. 374. t. 17. fig. 1.

Habitat in Alpibus Angliae, Helvetiae, Tauerni Tyrolensibus, Wallibus &
radix oblonga, obducta squamis namentatis. Folio fere nulla. Scapus
digitalis, squamis aridis basi vaginatus, superne foliolis lanceolatis & binis
alco pedicellato infra florem. Petala oblonga, obtusa, ^{extus} lineis nigris, unguibus
flavis. Filamenta glabra

filiiforme Anthemium foliis filiiformibus verticillatis subsessilibus, filamentis
glabris, petalis lanceolatis Hort. Kew. 1. p. 451. *

Habitat in P. bonoppei 2

Scapus filiiformis, pedalis, foliis brevior, basi reflexis; maculis pallidis.

Petala 3. exteriora intus alba, extus viridia; 3 interiora alba, extus linea
viridi Hort. Kew. l. c.

non vidi

minor *Albucia foliis subulatis* Lin. S. V. p. 326.

Ornithogalum africanum flore viridi, altero alteri innato Herm. parad. bot.

209. t. 209.

Habitat ad Cap. b. p. p. 24

felifolium Ait. filamenti glabri, foliis feliformibus - flexuosis glabri, siapo
simplici flexuoso. Sauc. coll. 5. Gc. rar. 414

non vidi

Thunbergii
Feli-folium

Anth. folis feli-formibus siapo erecto brevioribus

Thunb. prodr. pag 62.

Habitat in C. b. pra

non vidi

1
Ficabrum Anthemicum foliis Inguetis serrulatis, caule ramoso latio, pedunculis
fructiferis recurvis lin. suppl. p. 202. l. v. p. 331
Habitat in C. bono spec

non sic

revolutum Anther foliis trigonis scabris, racis ramoso, corollis revolutis Lin. S. V. pag
330. Murr. 8l. Golt. 214

Phalangium aethiopicum ramosum floribus albis, petalis reflexis Comm.
hort. 1. p. 67. t. 34.

Appodeles foliis compressis oppositis, caule pedicelo Tournef. G. R. 4. 343.

Habitat — — 4

revolutum ~~Appodeles~~

non vidi

Congifolium Anthe filamentis glabris radice fasciculata, foliis subtriangulis
lineariibus utraque glabris ciliatis, scapis axillaribus ramosis flexuo-
sis prostratis saepe coll. 5. 40. var. Tab. 413

non vidi

triquetrum Anthericum foliis filiformibus triquetris scapo simpliciter brevioribus, racemo
oblongo, bracteis pedicello brevioribus
anthericum triquetrum foliis filiformibus triquetris scapo simpliciter brevioribus,
racemo ovato Lin. Suppl. p. 802. S. V. pag 331

Habitat in P. b. p. c.

Folia spithamea. Scapus foliis duplo altior. Racemus saepe sesqui polli-
cans bracteis minutis. Pedicelli unguiculati. Corolla ante evolutio-
nem ovata acuta, cum in filiformi obovata obtusa filamenta
glabra

Ant. triquetrum foliis filiformibus triquetris racemo ovato brevioribus. Thunb.
prodr. pag 62

Aliam an diversa a Thunbergia musa? ~~idem~~

Folii setaceis triquetris rigidiusculis, bracteis sabulatis a basi lato membrana-
eae longitudine pedicellorum. corollis obovatis, obtusis, Petalis oblongis
~~pet. extensioribus ext. viridibus perispermatis~~

~~Stenobrya~~
filiiforme
elongatum

Anth. foliis linearifiliiformibus, sicapo ramis brevibus
racemi elongati Thunb. prodr. p. 62.

Habitat in Cap. b. p. ei

on eadem cum junioro

Juncus Anthemidum Capoffiale Lin Mant. 320 224* L. V. p. 330.

Habitat in locis glareosis sub monte Leonis C. b. spec. 7

Foliorum indumenta papum inferne vagrantia. Radix bulbosa. Scapus palmatis,

filiformis, spinulis contractis, apiculatus, subquadrisflorus; nonnihil scandens.

Pedunculi proprii recti, floribus triplo longioribus. Bractea minuta ovata. Flo-
res 3. 4. magnitudine Polygoni avicularis ex apice caulis Lin.

Anthemidum spiritum foliis tereti filiformibus flexuosis scapo flexuo-
so longi venombus Theob. prod. pag. 62

junceifolium Anthericium foliis teretibus rigidis altitudine scapi subramosi
floribus distantibus remotis

Habitat in C. bono speciei

Folia spithamea filiformia substriata. Scapi inferne ramosi
vel altero. Pedicelli inferos gemini vel terni superos solita-
rii flores cernui. filamenta glabra
Semel contorta, diversa foliis teretibus.

filiformi Clathrum foliis petalis nigris, ^{hab. d. s.} pediculis brevibus
racemo ovato, bracteis longioribus pedicellorum

in specum Anth. foliis ellipticis crispis ciliatis, scapo ramoso. Thunb prodr
pag. 62.

Habitat in Pap. b. spei

non vid.

Phytolacca Anth. filamentis glabris, foliis oblongis planis lucidis erectis, racemo
simplici racemo corymbose. Jacq. coll. 5. 1 fr. var.
Tab. 410

non vidi